



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Մետակարպ
Metacarpus

Փոքր
Phalanges.

Patkerazard bnakan patmut'iwn

Gabriël Mēnēvishean

11. Tibia

12. Talus

13. Tarsus

14. Digits



ՊԵՏԱԾՐԱԶԱՐԳ

ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Ա.

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ԵՒ ԳԻՄՆԱԶՆՈՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ի


Հ. ԳԱՐՐԻԷԼ Վ.Է ՄԵՆԵՎԻՇԵԱՆ

ՄԻՒԹ. ՈՒԽՏԷ

Եւ ասաց Աստուած, Հանցե երկիր շուծի կենդանի ըստ ազգի յոր-քոսանի, եւ սպառնա, եւ գաղանա երկրի ըստ ազգի: Եւ եղև այնպէս: (Ենն. Ա. 24.)

480 պատկերներով զարդարուած:

ՀԱՍՏԱՏԵԱԼ ՅՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ



ՎԻՆՆԵՆ

ՄԻՒԹ. ԱՐԵՆՆ ՏՊԱՐԱՆ

1897.

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES

GOAD

BEEN

2732

v. 1

Buhr

Ամենայն իրաւունք պէրապահեալ :

GRAP
EKEY.
9-132
C. 10. 69.
✓ 19 Թ-յի 1897

ՊԱՏՐԱՐԱՐԱՐԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԿԱՍՏԱՆԻՆՈՒՊՈԼԻՍ

ՌԻՍՏՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԱՅԿԱՅԻՆ ԿԵԴՐԱՆ. ՎԱՐՁՈՒԹԵՐ

ԹԻՒ 67.

ՎԱՐՁՈՒԹԵՐ

Այսպիսի կերպով՝ Վարչական Ոստիկանության:

Այսպիսի կերպով՝ Վարչական Ոստիկանության Խորհրդայն առաջարկության՝ Վիեննայի Միջկարեւան ժամանակվա պարտքի Հայր Վաթիկեյ Վարդապետ Միջկարեւանի յօրինած *Բնական Պատմություն* երեսնամյա դասագիրքը, եւ խորհրդայն ղին պարտքային գինովեան, գրաւ զայն ըստ ամենայնի դիւրացի եւ օգտակար է պէտք Հայ հանդիսայն. ապի եւ այն պաշտօնագրով կարծեւ եւ իւր յանձնարարէ յիշեալ դասագիրքին գործածութիւնն յազգային Վարժարանս:

Ոստիկանության Խորհրդայն

Արեւելի

Ստեփան Բաղդասարյան



Արեւելի

Կոչու Գ. Գրիգորյան

Ոստիկանության Խորհրդայն որոշման ու յանձնարարութիւնը եւ իւր կնիքն ու դիմումն պարագրութիւնները իւր ձաւերացնեմ:

20 Թ-յի 1897

Պարտքի Կ. Պարտք

Ստեփան Բաղդասարյան



GRAD
EREN
2732
110198

Յ Ա Ռ Ա Ջ Ա Բ Ա Ն

„So spricht die Natur zu be-
kannten, verkannten, unbekannten
Sinnen, so spricht sie mit sich
selbst und zu uns durch tausend
Erscheinungen; dem Aufmerk-
samen bleibt sie nirgends todt,
noch stumm. —“ (Göthe.)

Գրքերն ալ ունին իրենց հրատարակութեան պատմութիւնը:
1883ին՝ Բն. Պատմութեան ուսուցիչ գրուելով՝ յօրինուա-
ծական Բնական պատմութեան մը պակասութիւնը ստիպած էր
գրքիս յօրինողը՝ եւրոպական լաւագոյն դասագիրքերու օգնութեան
դիմելու: Եւ նոյն ատենները — ինչպէս նաեւ հիմայ իսկ — միջ-
նակարգ դպրոցներու մէջ՝ Աւստրիա եւ Գերմանիա՝ կը գործածուէր
A. Pokornyի յօրինած դասագիրքը. Illustrierte Natur-
geschichte, I. Thierreich, II. Pflanzenreich, III. Minera-
logie, եւ բազմութիւ տպագրութեանց արժանացած էր իւր՝
Բնականին լեռնին լըծած ճիշդ «սորագրող»-ի-նէրոյն եւ յար-
մարտը պարիւններով, եւ թարգմանուած էր շատ մը եւրո-
պական լեզուներու: Պատշաճ դատեցինք մեր առանձնական գործա-
ծութեան համար թարգմանել այս գիրքը հայերէնի, որ եւ 1¹/₂
տարւան մէջ կատարուեցաւ. նոյն միջոցին կ'ուզէինք տպագրութեան
տալ, սակայն յարմար համարուեցաւ ժամանակ մը յետաձգել
հրատարակութիւնը, որպէս զի փորձէինք մեր դասագիրքն արտա-
քին դպրոցներու մէջ ալ, եւ ասով տալ կարենայինք մեր դասա-
գրքին կարեւոր սրբագրութիւններն, եւ նոյն իսկ մեթոդի փոփո-
խութիւնը՝ եթէ հարկ տեսնէինք. այսպէս ալ եղաւ: 1889էն
1890 ի Կ. Պոլս, 1890—2 ի Զմիւռնիա, եւ դարձեալ 1892—5
ի Կ. Պոլս՝ մեր դասասիրտութեանց ժամանակ իրապէս համոզուե-
ցանք, որ հարկ էր տպագրութեան վրայ մտածել, քանի որ մեր

*

գործածած տպագրեալ հայերէն դասագրքերը զուրկ էին Բն. Պատմութենէ մը պահանջեալ յատկութիւններէն՝ դժբախտաբար: Նախ՝ անհնարին է գիտնական պահանջում ընել գասագրքէ մը, ուր կը պակսին լատինեցէն անունները: — Նշեցրէ՛ք՝ պատկերազարդ Բնական պատմութիւն մը՝ ա. պիտի պատկերացընէ աշակերտաց աչքին առջեւ կենդանի-ոյն կամ Կենդանի-Ջիւղ-Ջիւղ չափը. Բ. պատկերներն այնպէս որոշ պիտի ըլլան, որ աշակերտը տեսնելուն պէս կարենայ զանազանել եւ իրապէս ճանչնալ. Գ. ընդհանուր տեսակին յատկացեալ անո՞ւմբ՝ բնական է՝ չեն կրնար որոշուիլ տեսակին անհատները: — Նշեցրէ՛ք՝ հայերէն անունակոչութեան մէջ կատարեալ անիշխանութիւն երբ տիրէ, ի զուր է սպասել որ աշակերտներուն մտաց մէջ Բնական պատմութեան ծանօթութեանց պաշարը զարգանայ: Այս երեք կէտերուն վրայ կ'աւելնար չորրորդ մը, որ է՝ ընդունուած յօրինուածութեան մը (système) պակասութիւնը:

Ուստի 1883էն մինչեւ 1895 շատ կարեւոր փոփոխութիւններ կրած էր Բնական Պատմութիւնը, թէ՛ դասակարգութեան եւ թէ՛ մանաւանդ բնապատմական հետազոտութեանց եւ ծանօթութեանց կողմանէ: Ստիպուեցանք կարեւոր ծանօթութիւններն յաւելուլ մեր գրքին մէջ, օգտուելով գրեթէ 12 տարւան մէջ մեր նշանակած գիտողութիւններէն, եւ մանաւանդ ուրիշ Բնական պատմութիւններէն¹: Իսկ 1895ին հարկ տեսանք մեթոդին մէջ իսկ

¹ Այս մասին ընդարձակ պիտի խօսինք Բ. Հատորին վերջը:

² Նշանակենք համառօտիւ հոս թէ՛ բնագիտ. եւ թէ՛ պատկերազարդ համար մեր գործածած աղբիւրները:

1. Pokorny's Naturgeschichte des Thierreiches... 23 տպ. Վիեննա, Պրագ, 1894:

2. Lehrbuch der Zoologie für Gymnasien, Realgymnasien, ևւն., von Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé, 6 տպ. Բրաունշվայգ, 1895:

3. Lehrbuch für den Unterricht in der Zoologie, 2 տպ., von Dr. M. Krass ևւ Dr. H. Landois, Ֆրայբուրգ, 1888:

4. Illustrierte Naturgeschichte der Thiere... von Philipp Leopold Martin, 4 Հատոր. 1882 Լայպցիգ, (Բրոկհաուզ):

5. Wegweiser durch die drei Reiche der Natur... von Eduard Teller. 1875, Լայպցիգ. (Օտտո Սպամեր):

6. Leitfaden für den Unterricht in der Naturgeschichte, von Karl Koppe, 8 տպ. 1891. Էսսէն:

փոփոխութիւններ ընել¹, որպէս զի Բն. Պատմութեան Ժամանակակից գիտութեան մէջ՝ եւրոպական ուրիշ գրքերու հետ կանոնար միջիլ հայերէն դասագիրք մըն ալ:

Հարկ էր ականայ զոհել մեր մէկ նպատակը. — այսինքն կը բաղձայինք Գոռնաոյ պատկերներով հրատարակել մեր գիրքը, որ նոր է իւր դասակարգութեամբը, նոր պիտի ըլլար եւ պատկերներովը. բայց վերջին տարիներու դէպքերն ոչնչացուցին մեր անկալութիւնը, քանի որ յոյս չունէինք թէ ազգային մանկտին պիտի կարենար այսպիսի գունաւոր դասագիրք մը հայթայթել իւր գործածութեան համար: Եւրոպական հրատարակչական տուն մը յանձն առած էր ամենայն զեջողութեամբ մեր խնդիրը, բայց յամենայն դէպս անկարող եղանք առաջին համարձակիլ այսպիսի հրատարակութեան մը. եւ բաւական համարեցանք նոյն իսկ սեւ պատկերները՝ ջանալով որ նոր ըլլան եւ գերազանցեն ցարդ հրատարակուածները: Թէ յաջողեցանք, ուսուցիչը ու ուսանողն պիտի վկայեն, եթէ կարճ համեմատութիւն մ'ընելու յոժարին: Ոչ թէ միայն բոլորովին նոր են մեր պատկերները, այլ նաեւ մասնաւորապէս այս Բնական պատմութեան համար պատրաստուած: Իւրաքանչիւր պատկերին տակ անասնոյն մեծութեան համեմատական չափը նշանակեցինք. (Հմմտ. Պտկ. 26, 27 եւ այլն, եւն:)
Շատ պատկերներու տակ ա, Բ, Գով իւրաքանչիւր մասերը մեկնեցինք՝ աշակերտին դիւրութեան համար. (տ. Պտկ. 332 եւն.)²

7. Leitfaden der Zoologie ... von Dr. Johann N. Woldich. 4 տպ. 1882:

8. Specielle Zoologie ... von Dr. W. Hess, 1889, Շտուտտգարա. եւն:

9. E. Bouant: Dictionnaire-manuel-illustré des Sciences usuelles, Paris 1895 (Armand Collin).

¹ Տեղադրութիւն եւ Գոռնաոյ վրայ՝ առանց համառօտ տեղեկութիւն տալու, յանկարծ մասնական կենդանիէ մը սկսիլ՝ մեծ դժուարութիւն կը պատճառէ աշակերտին, եւ կը ստիպուի ամէն անգամ դասերուն վերջն աւելցուած ընդհանուր գիտելիք բանալ եւ կարդալ, որպէս զի ընդհանրին վրայ գաղափար մը կազմէ: Առանց բացառութեան ա՛յն ուղիքով ինչ հանգիստ այս դժուարութեան. ուստի ընդհանրէն մասնաւորին իջնալու մեթոդն ընտրեցինք, ըստ որում՝ գիտելիքներն երկու մասի բաժնեցինք. իւրաքանչիւր դասին սկիզբը՝ դասին եւրոպական ծանօթելիք, ինչ եւն. աւելցուցինք, իսկ դասին վերջը՝ համառօտ քաղուած մը գրինք՝ ընդհանուր գիտելիք անուամբ՝ ամփոփելով դասին մէջ ցանուցիր բոլորածը:

² Այս կէտը գլխաւորաբար Բ. Հատորին մէջ, աւելի գրաւեց մեր ուշադրութիւնը, վասն զի առանց ասոր ի զուր է տնկի մը ընդհանուր ձեւեր կայացընել եւ անօգուտ:

եւ ընդհանրապէս այն մասը՝ զոր տեսնելու, դիտելու եւ քննելու աւելի յաճախ առիթ ունի աշակերտը — այսինքն միջատներու բաժինը — աւելի առատ պատկերներով ներկայացուցինք. վասն զի մեր 12ամեայ փորձառութիւնն է վկայ, թէ աշակերտներուն ամենէն օգտակար եւ հետաքրքրական մասը՝ ճճիներն ու թիթեռներն են, քանի որ այս բաժինն՝ իւր առատութեամբ, օգտակար կամ ֆնասակար ըլլալով, աւելի ուշադրութիւն կը հրաւիրէ, եւ որսալն ու պահելն ալ աւելի դիւրին է։¹ — Անուններու լարիւրինթոսէն ազատելու համար՝ ջանացինք գործածութեան մէջ եղած բառերը պահել եւ աշխատիլ որ գոնէ այս բառերու միօրինակութեան փոքր ինչ նպաստաւոր ըլլայ մեր դասագիրքը. պակաս անուններն՝ լրացուցինք լտ.է կամ գելմ.է թարգմանելով։ Ուր որ սխալման յայտնի վտանգի մէջ իյնալու երկիւղ չունէինք, հետեւեցանք սովորական գործածութեան, օգտուելով մեր բառերու քաղուածոյքէն, եւ Պր. Նորայր Բիւզանդացոյ բառարանէն.² բայց ուր անճիշդ անուն մը տեսանք, կամ հարցական (° ?) նշան մը աւելցուցինք, եւ կամ մեր յարմարադոյն դատածը դրինք՝ կերպով մը նշանակելով։

Յուսանք — եւ այս էր մեր նպատակը — թէ դասագիրքս իւր 3 հատորներովը՝ իբր ամբողջ մը՝ պիտի նպաստէ Բնական պատմութեան ծանօթութեանց զարգացման մեր ազգային դպրոցներու մէջ եւ պիտի կարենանք Գէօթէին հետ ըսել. «Այսպէս կը խօսի բնութիւնը՝ ծանօթ, չճանչցուած, անծանօթ էակներու. այսպէս կը խօսի բնութիւնն հազար ու մէկ երեւոյթներով իրեն հետ եւ մեզի հետ. մտադիր եղողին երբեք մեռեալ չի մնար, եւ ոչ ալ

¹ Իւրաքանչիւր կենդանւոյն նկարագրութիւնը 2—3 մասի բաժնած ենք, եւ տարբեր տպագրական գիր գործածած։ Էական յարկն էր որոնք իբր դաս պիտի պահանջուին, մեծ գրով. երկրորդականները (այսինքն կենդանւոյն գտնուած տիւղ, ալիւտ — Իգանիւ եւն.) աւելի մանր գրով. իսկ այնպիսի յատկութիւններ՝ որոնք դասագրքին ամբողջութեան համար հարկ էր նշանակել, երրորդ տեսակ մանր գրով (Petit բուլաժով) տպեցինք. այս վերջինս կրնայ առանց գրքին ամբողջութեան ֆնասելու, զանց առնուիլ։ — Ամենակարեւոր մասին (Դասագիրք — Բնական) համար գործածեցինք աստիճանեալ գրեր, որպէս զի աչքն ալ նպաստէ աշակերտին յիշողութեան։

² Որուն մէջ թէպէտ շատ բառ պակաս է, սակայն եղածներուն մէջ աշխատած է հեղինակը բառերու միօրինակութեան, զոր կը յիշատակենք անգամ մըն ալ մտադիր ընելու համար Պր. Նորայրի բառագրքին օգտակարութեան։

մունջ — „: Վասն զի բնութիւնը ճանչնալը խելամուտ կ'ընէ բնութեան հետ կապուած այլեւայլ խնդիրներու, որոնց առարկայական պատասխանը պիտի տայ դարձեալ ինքը բնութիւնը: Եթէ հարցընենք այս խնդիրներու պատասխանը, շատ անգամ ապահովապէս կ'առնունք բնութենէն, վասն զի «մեռեալ չէ, եւ ոչ ալ՝ մունջ», իսկ եթէ չհարցընենք՝ մենք կը մնանք «մեռեալ եւ կամ մունջ» երբ առ տգիտութեան կարգալ չենք գիտեր այն ընդարձակ մատեանը, զոր բնութեան Արարիչը բացած է մեր առջեւ, կարդալու անոր մէջ «Հազար ու մէկ երեւոյթներն», որոնցմով Արարիչը բնութեան բերնով կը խօսի մեզի հետ:

Ձեռք կրնար հրապարակաւ իսկ չյայտնել Ազգային Ուսումնական խորհրդոյ կենդրոնական Վարչութեան մեր շնորհակալութիւնն, որ հաճեցաւ «արտօնել» եւ «յանձնարարել» եռահասորոգ դասագրքիս գործածութիւնն ազգային վարժարաններու մէջ:

Մեր վերջին խօսքը թող ըլլայ շնորհակալութիւն նոյնպէս առ Վսեմ. Ասպետն Զունդ, որ բանիւ եւ գրով յորդորած էր զմեզ այս դասագրոց հրատարակութեան եւ իւր 1896 Յունիս 15 նամակաւ կը գրէր. «Ձեր . . . երկասիրութեան մասին անմասն չմնալու համար, յուսամ որ ապախտ չէք ընել 250 Ֆրանքը ընդունել . . .» եւն:

Ծանօթութիւն: Չափերու համար ընտրած ենք Գրեյսի ֆուտ, բայց որովհետեւ գերմանական դասագրքերը կը գրեն՝ օր. աղ. 60—70 cm = սանտիմէտր, իսկ գաղղիականները՝ 0.60 (այսինքն 0 մէտր, 60 սանտիմէտր), այս երկուքը միաբանելով՝ միօրինակեալ չափ մ'ունենալու համար, կը նշանակենք 0,60 հր. (այսինքն 0 = մէտր, 60 հրեւրոգրաֆի. կամ 0,002 հր. (այսինքն 0 = մէտր, 002 հրեւրոգրաֆի. = միլիմէտր.) 0ն միշտ Գրեյս ցոյց կու տայ, ուր իրապէս թուով նշանակուած չէ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

	Էջ
Ներածութիւն	1
Անասնոց յօրինուածական դասաւորութիւնը	2
Մարդկային մարմնոյն նկարագիրը	3
Ուկր	5
Մասն	7
Ջեղ	9
Զգացում (եւ զգայարանք)	11
Սիրտ	14
Թոքեր	15
Մարսողութեան գործարան	16
Մարդկային ցեղերը	18

Անասնոց մարմնոյն ընդհանուր նկարագիրը	23
Ա. Անասնոց մարմնոյն արտաքին ձեւը	23
Բ. Անասնոց մարմնոյն ներքին կազմութիւնը	26
Անանոց սերելուն, օգտակարութեան եւայլն վրայ քանի մը խօսք	30
Դասականութեան ծրագիր	34
Օգնական տետր	34
Անասնոց տեսակաց ստորագրութիւնը	35

ՏԻՊԱՐ 1. ՈՂՆԱՅԱՐԱՅՈՒՆՆԵՐ (VERTEBRATA) 35

ԴԱՍ Ա. ԿԱԹՆԱՏՈՒ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ (MAMMALIA) 35

Կարգ 1. Կապիկներ (<i>Simiæ</i>)	35
Ցեղ Ա. Նրբաքիթ կապիկներ (<i>Catarrhinida</i>)	35
Ցեղ Բ. Տափաքիթ „ (<i>Platyrrhinida</i>)	40
Ցեղ Գ. Կիսակապիկներ (<i>Prosimiida</i>)	41

	Է
	42
Կարգ 2. Չղջիկներ (<i>Cheiroptera</i>)	42
Ցեղ Ա. Պողպակեր չղջիկներ (<i>Carpophaga</i>)	42
Ցեղ Բ. Մեջատակեր „ (<i>Entomophaga</i>)	43
Կարգ 3. Ծճեկերներ (<i>Insectivora</i>)	44
Ցեղ Ա. Ողնիներ (<i>Erinaceida</i>)	45
Ցեղ Բ. Խուլբներ (<i>Talpida</i>)	45
Ցեղ Գ. Սրնչակներ (<i>Soricida</i>)	46
Կարգ 4. Մսակերներ կամ Գազաններ (<i>Carnivora</i>)	47
Ցեղ Ա. Շնագգիներ (<i>Canina</i>)	47
Ցեղ Բ. Կզաքիներ (<i>Mustelina</i>)	52
Ցեղ Գ. Կատուազգիներ (<i>Felida</i>)	56
Ցեղ Դ. Բորեաններ (<i>Hyaenina</i>)	61
Ցեղ Ե. Բեշ Մշկոներ (<i>Viverrina</i>)	62
Ցեղ Ջ. Արջեր (<i>Ursina</i>)	62
Կարգ 5. Տոնոտեանք (<i>Pinnipedia</i>)	64
Ցեղ Ա. Փոկեր (<i>Phocina</i>)	64
Ցեղ Բ. Ծավաղեր (<i>Trichechina</i>)	65
Կարգ 6. Կրծողներ (<i>Glires</i>)	66
Ցեղ Ա. Սկիւռներ (<i>Sciurina</i>)	66
Ցեղ Բ. Կաշաղդիք (<i>Castorida</i>)	68
Ցեղ Գ. Մկներ (<i>Murina</i>)	69
Ցեղ Դ. Փշոտ խոզուկներ (<i>Aculeata</i>)	70
Ցեղ Ե. Նապաստակներ (<i>Leporina</i>)	71
Կարգ 7. Պատիճաւոր Կենդանիներ (<i>Proboscidea</i>)	73
Ցեղ Փղեր (<i>Elephantina</i>)	73
Կարգ 8. Դարասմբակներ (<i>Artiodactyla</i>)	74
Ա. Չորոճող դարասմբակներ (<i>Art. non ruminantia</i>)	75
Ցեղ Ա. Խոզեր (<i>Suida</i>)	75
Ցեղ Բ. Ձիազետիներ (<i>Hippopotama</i>)	76
Բ. Սրոճողներ (<i>A. ruminantia</i>)	77
Ցեղ Ա. Մնամէջ եղջերաւորներ (<i>Cavicornia</i>)	78
Ցեղ Բ. Եղջերուներ (<i>Cervida</i>)	84
Ցեղ Գ. Ուղտեր (<i>Camelida</i>)	87
Ցեղ Դ. Ընձուղտներ (<i>Camelopardalida</i>)	89

<i>Կարգ 3. Մագլող թռչուններ (Scansores)</i>	126
867 Ա. Կկուներ (Cuculidae)	126
867 Բ. Փայտփորներ (Picidae)	127
867 Գ. Պապկաներ (Psittacidae)	128
<i>Կարգ 4. Դիշատող թռչուններ (Rapaces)</i>	130
867 Ա. Բուեր (Strigidae)	130
867 Բ. Անդղներ (Vulturini)	132
867 Գ. Բաղէներ (Falconidae)	134
<i>Կարգ 5. Աղանիներ (Columbae)</i>	137
<i>Կարգ 6. Հաւազգի թռչուններ (Gallinae)</i>	138
867 Ա. Բուհ Հաւեր (Phasianidae)	139
867 Բ. Կաքաւներ (Perdicidae)	142
867 Գ. Անտառահաւեր (Tetraonidae)	144
<i>Կարգ 7. Մօրակաւն թռչուններ (Grallatores)</i>	145
867 Ա. Արագիւններ (Ciconiae կամ Ardeidae)	145
867 Բ. Եղերաբնակներ (Litorales կամ Charadriidae)	148
867 Գ. Կոցարներ (Scolopacidae)	149
867 Դ. Զրահաւեր (Rallidae)	149
<i>Կարգ 8. Լողացող թռչուններ (Natatores)</i>	151
867 Ա. Բադեր (Anatidae)	151
867 Բ. Մաշկոտեաններ (Steganopodes)	154
867 Գ. Ուրբներ (Laridae)	156
867 Դ. Մրդկահաւեր (Procellaridae)	157
867 Ե. Խորասողիներ (Colymbidae)	158
867 Զ. Թանձրահաւեր (Alcidae)	159
867 Է. Պինգուիններ (Impennes)	159
<i>Կարգ 9. Վազող թռչուններ (Cursores)</i>	160
867 Ա. Երկմանեան Զայլեամներ (Strutheonida)	160
867 Բ. Երեքմանեան Զայլեամներ (Rheidae)	161
867 Գ. Կասուարներ (Casuaridae)	161
867 Դ. Կոցաւոր Զայլեամներ (Apterygidae)	162
867 Ե. Արօսներ (Otidae)	162
Թուշի Լուս Էնդհանուր Գիտելի	163

ԴԱՍ Գ. ՍՈՂՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ԶԵՌՈՒՆՆԵՐ (REPTILIA)	165
<i>Կարգ 1. Կրիաներ (Testudines)</i>	165
8եղ Ա. Ժաննային Կրիաներ (Emyda)	166
8եղ Բ. Ծավակրաններ (Chelonida)	166
8եղ Գ. Ցամաքի Կրիաներ (Chersida)	167
<i>Կարգ 2. Նհանգիներ (Crocodylina)</i>	168
<i>Կարգ 3. Օճեր (Ophidia)</i>	169
8եղ Ա. Թունաւոր Օճեր (Venenosa)	170
8եղ Բ. Անթոյն Օճեր (Innocua)	173
<i>Կարգ 4. Մողէզներ (Sauria)</i>	175
8եղ Ա. Հերձալեզուներ (Fissilinguia)	175
8եղ Բ. Թանձրալեզուներ (Crassilinguia)	176
8եղ Գ. Նրբալեզուներ (Vermilinguia)	178
8եղ Դ. Կարճալեզուներ (Brevilinguia)	178
Սղաղ ինքնակերպ լըյ ընդհանուր գիտելիք	179
ԴԱՍ Դ. ԵՐԿԱԿԵՆՑԱՂՆԵՐ (AMPHIBIA)	180
<i>Կարգ 1. Պոչատ երկակենցաղներ (Batrachia)</i>	180
8եղ Ա. Գորտազգիներ (Ranida)	180
8եղ Բ. Արջնադորտեր (Bombinatorida)	182
8եղ Գ. Դողոշներ (Bufonida)	183
<i>Կարգ 2. Պոչաւոր երկակենցաղներ (Caudata)</i>	184
8եղ Ա. Սալամանդրներ (Tritonida)	184
8եղ Բ. Անոտն երկակենցաղներ (Apoda)	185
Երկ-ինչ-անէր- լըյ ընդհանուր գիտելիք	185
ԴԱՍ Ե. ՉԿԵՐ (PISCES)	187
<i>Կարգ 1. Կրկնաշունչք (Dipnoi)</i>	187
<i>Կարգ 2. Ոսկրոտ ձկեր (Teleostei)</i>	188
Ա. Մտորարածական փշաթեւեր (Acanthopteri)	188
8եղ Ա. Պերկէսներ (Percoidei)	188
8եղ Բ. Վերտաւորներ (Cataphracti)	190
8եղ Գ. Թիւնիկներ (Scomberoidei)	191

<i>Ֆ. Ստորաբաժանող՝ Կակիյաթեներ (Anacanthini)</i>	194
867 Ա. Փրփրուկներ (Gadoidei)	195
867 Բ. Տափակաձկեր (Pleuronectae)	195
867 Գ. Շաբութներ (Siluroidei)	196
867 Դ. Ծածաններ (Cyprinoidei)	197
867 Ե. Լողիկներ (Salmones)	198
867 Ջ. Կռկաձկեր (Esoces)	200
867 Է. Տառեխներ (Clupeidi)	200
<i>Դ. Ստորաբաժանող՝ Անոտեաններ (Apoda)</i>	202
867 Ա. Թմբկեցուցիչներ (Gymnotini)	202
867 Բ. Օձաձկեր (Murenoidei)	203
Թառեղաձ	204
<i>Կարգ 3. Ծարպաթեի ձկեր (Ganoidei)</i>	205
867 Ա. Ոսկրոտ ծարպաթեիեր	205
867 Բ. Կռճիկաւոր ծարպաթեիեր	205
<i>Կարգ 4. Աճառուտ ձկեր (Chondracanthi)</i>	206
867 Ա. Շանաձկեր (Squalidi)	207
867 Բ. Շքթակներ (Rajae)	208
867 Գ. Բոլորաբերան ձկեր (Cyclostomi)	210
867 Դ. Նրբասրտեր (Leptocardii)	210
211-ը իր-ը ընդհանուր գլուխ	211

ՏԻՊԱԲ 2. ԿԱԿՂԱՄՈՐԹՆԵՐ ԿԱՄ ԹՈՒԼՏԱՐՐՆԵՐ (MOLLUSCA) . 212

ԴԱՍ Ա. ԳԼՈՏԱՆԻՆԵՐ (CEPHALOPODA) 212

Կարգ 1. Երկխոնիկեաններ (*Dibranchiata*) . . . 212

Կարգ 2. Քառախոնդներ (*Tetrabanchiata*) . . 215

ԴԱՍ Բ. ՓՈՐՈՏԱՆԻՆԵՐ (GASTEROPODA) 216

Կարգ 1. Թոքաւոր խողունջներ (*Pulmonata*) . . 216

Կարգ 2. Բառաչախիկ խողունջներ (Prosobranchia) 218

ԴԱՍ Գ. ԹԵՐԹԱԽՈՒԿՆԵՐ (LAMELLIBRANCHIATA) . . . 223

Կարգ 1: Միադնդերներ (*Monomya*) 223

Ցեղ Բ. երկայնաբողկուկներ (Longicornia)	261
Ցեղ Գ. կրծողներ (Corrodentia)	263
Կարգ 4. Ուղղաթևեր (Orthoptera)	264
Ցեղ Ա. Ցատկողներ (Saltatoria)	265
Ցեղ Բ. Քալողներ (Gressoria)	269
Ցեղ Գ. Վաղողներ (Cursoria)	269
Կարգ 5. Թեփաթևեր (Lepidoptera)	270
Ցեղ Ա. Սեպաբողկուկ թիթեռներ (Rhopalocera)	270
Ցեղ Բ. Սփինքսներ (Sphingida)	276
Ցեղ Գ. Փայտփոր թիթեռներ (Xylotropha)	279
Ցեղ Դ. Մանողներ (Bombycida)	280
Ցեղ Ե. Բուսաթիթեռներ (Noctuida)	285
Ցեղ Ջ. Երկրաշափներ (Geometridae)	286
Ցեղ Է. Գալարողներ (Tortricida)	287
Ցեղ Ը. Ցեցեր (Tineida)	288
Ցեղ Թ. Փետրաւորներ (Pteriphorida)	290
Կարգ 6. Երկթևեաններ (Diptera)	290
Ցեղ Ա. Բուն ճանճեր (Muscida)	290
Ցեղ Բ. Մոծողներ (Culicida)	294
Ցեղ Գ. Ոչնաճանճեր (Coriacea)	296
Ցեղ Դ. Լուեր (Palicida)	296
Կարգ 7. Կիսաթևեր (Hemiptera)	297
Ցեղ Ա. Երկրամուկներ (Geocorida)	297
Ցեղ Բ. Ջրամուկներ (Hydrocorida)	299
Ցեղ Գ. Ճպուռներ (Cicadida)	299
Ցեղ Դ. Տերեւամուկներ (Aphidida)	301
Ցեղ Ե. Վահանաւոր մուկներ (Coccida)	303
Ցեղ Ջ. Ոջիւներ (Pediculida)	304
ԴԱՍ Բ. ՍԱՐԴԱԶԳԻՆԵՐ (ARACHNOIDEA)	305
Կարգ 1. Կարիճներ (Scorpionida)	305
Կարգ 2. Սարդեր (Araneida)	306
Կարգ 3. Փաղանձներ (Opilionida)	310
Կարգ 4. Բաշխեր (Acarina)	310

	Էջ
ԴԱՍ Գ. ՀԱՋԱՐՈՏԵԱՆՆԵՐ (MYRIAPODA)	312
Կարգ 1. Օճասանդրներ (<i>Chilognatha</i>)	312
Կարգ 2. Հազարոտուիներ (<i>Chilopoda</i>)	313
ԴԱՍ Դ. ԽԵՑԵՄՈՐԹՆԵՐ (CRUSTACEA)	314
Կարգ 1. Տասնոտեաններ (<i>Decapoda</i>)	314
Ցեղ Ա. Երկայնագիներ (<i>Macrura</i>)	314
Ցեղ Բ. Կիսագիներ (<i>Anomura</i>)	316
Ցեղ Գ. Կարճագիներ (<i>Brachyura</i>)	317
Կարգ 2. Սրագիներ (<i>Xiphura</i>)	319
Կարգ 3. Օղակաւորներ (<i>Arthrostraca</i>)	319
Կարգ 4. Անոտեաններ (<i>Apoda</i>)	320
Կարգ 5. Փնջոտեաններ (<i>Cirripedia</i>)	320
Կարգ 6. Հերձոտուկներ (<i>Copepoda</i>)	321
ՏԻՊԱՐ 4. ՈՐԴԵՐ (VERMES)	322
ԴԱՍ Ա. ՕՂԱԿԱՒՈՐ ՈՐԴԵՐ (ANNULATA)	322
Կարգ 1. Խոզանաւոր Որդեր (<i>Chaetopoda</i>)	322
Կարգ 2. Տզրուկներ (<i>Hirudinoidea</i>)	323
ԴԱՍ Բ. ԲՈՂՈՐԱԿ ՈՐԴԵՐ (NEMATELMIA)	325
Կարգ 1. Թելորդուկներ (<i>Nematodes</i>)	325
ԴԱՍ Գ. ՏԱՓԱԿ ՈՐԴԵՐ (PLATYELMINTHES)	326
Կարգ 1. Երկզորդեր (<i>Cestodes</i>)	326
ԴԱՍ Դ. ՄԱՄՈՒԱՉԵՒ ՈՐԴԵՐ (BRYOZOA)	327
ՈՐԴԵՐ ԼԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԳԵՂԵՔ	327
ՏԻՊԱՐ 5. ՓՈՇՄՈՐԹՆԵՐ (ECHINODERMATA)	328
ԴԱՍ Ա. ԾՈՎԱԳԻԼԱՆՆԵՐ (HOLOTHURIOIDEA)	328
ԴԱՍ Բ. ԾՈՎՈՋՆԻՆԵՐ (ECHINOIDEA)	328

ԴԱՍ Գ. ԾՈՎԱՍՏՂՆԵՐ (ASTEROIDEA)	330
ԴԱՍ Դ. ՁԱՐԱՍՏՂՆԵՐ (CRINOIDEA)	331
Փշուղնեղներու իւր ընդհանուր գիշերէի	331
ՏԻՊԱՐ 6. ՏՎԸՆԳԻՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՆՈՂԻՔ (COELENTERATA)	332
ԴԱՍ Ա. ԾՈՎԱՄԱՅՐՆԵՐ (MEDUSAE)	332
ԴԱՍ Բ. ՊՈՂԻՊՆԵՐ (POLYPI)	336
ԴԱՍ Գ. ՍՊՆԳԻԱԶԳԻՔ (SPONGIAE)	340
ՏՆԸԴԵՐՆԵՐՈՒ ԻՐ ընդհանուր գիշերէի	340
ՏԻՊԱՐ 7. ՆԱԽԱԿՆԵՐԱՆԻՔ (PROTOZOA)	341
ԴԱՍ Ա. ՀԵՂԱԿԱՆՆԵՐ ԿԱՄ ԶՐԱԾԻՆՆԵՐ (INFUSORIA)	341
ԴԱՍ Բ. ԱՐՄԱՏՈՏԱՆԻՔ (RHIZOPODA)	343
Կենդանութեան ընդհանուր գիշերէի	345
Համառոտական տախտակ	348
Ցանկ հայերէն անուններու	349
Ցանկ լատիներէն անուններու	359



ԴԱՍԱԳՐՔԻՍ ԾԷՋ ՍՊՐԻՆԺ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐՈՒ ԶԱՆԻ ԾԸ ԿԱՐՆԻՈՐՆԵՐԸ

Վրիպակ	Ուղիղ
էջ	
1 Systematique	գերմ. Systematik
30 Գրգռեն	Գրգռեն
48 Աղխասալուն	Աղխասալուն
78 Ընձուղրի	Ընձուղրի
81 Խոպոպի	Խոպոպի
82 Վիթ (1/2)	Վիթ (1/2)
90 Այլամբակներ	Այլամբակներ
92 Մատալ ձի	Մատալ ձի
94 Քիչ ձի	Քիչ ձի
129 Ջրիկակ	Ջրիկակ
148 Ճահահահահ	Ճահահահահ
158 Ուղղորդ	Ուղղորդ
170 Առանձնական	Առանձնական
272 Փողկի	Փողկի

Ն Ե Ր Ա Մ Ո Ւ Թ Ի Ի Ն

Բնական պատմութիւնը բնական մարմնոց վրայ կը խօսի:

Բնական պատմութիւնը՝ կը սորվեցընէ բնութեան բերքերն իրենց էական ծանուցիչներով իրարմէ զանազանել, անոնց գլխաւոր գործարանները ճանչնալ, արտաքին ձեւերն որոշել, եւ այս մասը կը կոչուի Զեւաբանութիւն (Morphologie). կը սորվեցընէ դարձեալ բնական մարմնոց վրայ տեսնուած կենսական երեւոյթները մեկնել, եւ այս մասը կը կոչուի Բնաբանութիւն (Physiologie). ասոնց մանրադիտական կազմութեան վրայ կը խօսի Հիստալոգիան (Histologie): Վերջապէս բնական մարմնոց անուններ դնել, ստորագրել եւ դասաւորել՝ կը սորվեցընէ Թերթիկաբանութիւնը (Systematique):

Բնութեան մարմինները երկու կը բաժնուին. կենդանի (գործարանաւոր) եւ անկենդան (անգործարանաւոր) մարմիններ:

Բնութեան կենդանի մարմիններն երկու տեսակ են, այսինքն, ընասուններ ու Տնկեր:

1. Ընասունները (animalia) զգացում եւ ազատ շարժում ունեցող կենդանի մարմիններ են. կը սնանկն ու կը սերնդն: Ասոնք բոլորը միատեսակ կը կացողացանեն կենդանական պէտքոսութիւնը:

2. Տնկերն (plantae, vegetabilia) ոչ զգացում ունին եւ ոչ կամաւոր շարժում: Ասոնք կը կազմեն Տնկոց կամ Բոսոց պէտքոսութիւնը:

3. Իսկ Հանքերը (mineralia) Բնութեան անկենդան (անգործարանաւոր) մարմիններն են. Հանքային պէտքոսութեան կը վերաբերին: Բնական պատմութիւնն երեք առանձին մաս ունի, այսինքն՝

1. Ընասնոց Պետութեան պատմութիւն կամ Դննդամաքամութիւն (Zoologie).

2. Տնկոց Պետութեան պատմութիւն կամ Բուսաքամութիւն (Botanique).

3. Հանքերու Պետութեան պատմութիւն կամ Հանքաքամութիւն (Minéralogie).

Անասնոց յօրինուածական դասաւորութիւնը կ'ըլլայ հետեւեալ կերպով.

1. Պետութիւն կամ Թագաւորութիւն (Regnum).

2. Տիպար (Typus).

3. Դաս (Classis).

4. Կարգ (Ordo).

5. Ցեղ (Familia).

6. Սեռ (Genus).

7. Տեսակ (Species).

Օրինակ. Ընդամենի կատու (Felis domestica).

1. ԿԵՆԴԱՆԻՔ (Animalia).

2. ՏԻՊԱՐ. = Ողնայարաւոր կենդանիք (Vertebrata).

3. ԴԱՍ. = Կաթնատու կենդ. (Mammalia).

4. ԿԱՐԳ. = Գաղաններ (Carnivora).

5. ՑԵՂ. = Կատուազգիներ (Felida).

6. ՍԵՐ. = Կատու (Felis).

7. ՏԵՍԱԿ. = Ընդամենի կատու (Felis domestica) եւն եւն:

Տես ընդարձակ գրքին վերջը, եւ համեմատէ. Բ. Հատորը, Բաժնաւորութիւն:


Առանձինն գլխով կը խօսինք նախ Մարդոց կազմածքին վրայ:

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆՈՅՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

1. Արարչութեան պսակն է Մարդը (Homo sapiens)․ բոլոր երկրիս վրայ գտնուող կենդանի էակներուն՝ ամենագեղեցիկ ու ամենանշանաւոր էակն է։ Թէպէտ մարմնոյն կազմաձքովը՝ բարձրագոյն կաթնատու կենդանեաց կը նմանի, սակայն կը զանազանուի ասոնցմէ, 1. իւր մտաւոր կարողութիւններովը, 2. իւր խօսելու յարմարութեամբը, 3. իւր կանգուն քալուածքովը, ազատ վար կախուած եւ պզտ շարժող թեւերովը, որոնց ծայրը գտնուած ձեռքերն ամէն տեսակ ճարտարութիւններու կը գործածուին, 4. իւր ողորկ, կակուղ մորթովը, որուն ամէն կողմը ամենամանր շօշափումն իսկ կը զգայ եւ ամէնէն աւելի՝ 5. իւր հոգւոյն բարձր ու վեհ կարողութիւններովը։ Այս զանազանութիւնն այնպէս զգալի է, որ թէ՛ մարմնոյ եւ թէ՛ հոգւոյ ամենայնտիւն աստիճանի կատարելութիւն ունեցող անկիրթ մարդու, եւ ամենակատարեալ կենդանեաց՝ այսինքն մարդանման մեծ պոչատ կապիկներու մէջ ալ, զգալի տարբերութիւն կայ. ուստի եւ իրաւամբ «կենդանի էակաց թագաւոր», կ'անուանուի։ Մարդուս մարմնոյն մէջ երկու գլխաւոր կաղմիչ մասունք կը զանազանենք, որոնք զանազան պաշտօններ ունին եւ փոքր-թաքանիւ կը կազմեն. Ուղեղն ու Միտքը։

2. Ուղեղն իրենց վերաբերեալ մասունքներով (այսինքն կեղծիւնէրով ու նեւրոքներով) հաստատուն ուղեղայն կազմած (կախ) մը կը կազմեն, որուն իրարու հետ կցած ամէն մէկ մասը շատ շարժական է, եւ նեցուկն է մնացած գործարաններու եւ մարմնոյն մեծամեծ խողովներուն (փառքի, կրծոց եւ փոքի խողովներուն) մէջ բովանդակուած կակուղ մասանց (փոքրփոք) ընդարձակ մտօք առեալ)։


Ուղեղներէն զատ մարմնոյն ամէն մասանց մէջ կը գտնուին Միտքը կամ Միտքը (միտք), դարձեալ հաստ կամ նուրբ խողովակներէ կազմուած ցանց մը (Անթիւն) եւ ճերմակ թելերէ կազմուած ցանց մը (Զգական դերմէն)։ Իսկ մարմնոյն արտաքին երեսը պատած է արտաքին ճերմէն. ներքին խողովներուն պատերը յոյնալուսնային ծածկուած են, իւրաքանչիւր գործարան առաւել կամ նուազ Անթիւնով մը կամ Թափայիկէն Հիպոֆիզով պատած կ'ըլլայ։ Խօսինք նախ ուղեղներու վրայ։



Պատկեր 1. Մարդու կմախք:

Ոսկր (Os):

3. Մարդո՞ւ կմախոն 240 հատ առանձին առանձին ոսկրներէ կազմուած է: Ասոնք իրարու հետ կամ հաստատուն եւ անշարժ կերպով միացած են (կցուածքով, կռճիկով, կամ իրարու մէջ միուելով), եւ կամ շարժական կերպով՝ խաղաղքներով: Իրենց ձեւէն առեալ կը



Պտկ. 2. Մարդուս գանգը:

- | | | |
|----------------|----------------|--------------------|
| ա. քթոսկր, | դ. ծործորոսկր, | զ. ձախակողմնան գա- |
| բ. վերին կզակ, | է. ձախակողմնան | գաթոսկր, |
| գ. վարի կզակ, | ը. քռնքոսկր, | է. ճակատոսկր: |


զանազանուին՝ Կաթալի եւ խողովակայէն ոսկրներ: Գանգի ոսկրներն ի մասնաւորի՝ տափակ եւ անշարժական են, իսկ իրանի եւ անդամներուն ոսկրները՝ Գլանայէն ու շարժական: Չափահաս մարդու մը ոսկրները՝ չորացած վիճակի մէջ 8—10 քիլոգրամ կը կշռեն: Ոսկրներու բաղադրիչ մասունքն են 30—50 % ոսկրեայ կռճիկ, որ օսկրանիւնին խաւ խաւ կազմուելովը կը կարծրանայ: Իսկ ոսկրանիւթին բաղադրութիւնը կախում ունի մարդուն տարիքէն, անդեան տեսակէն, եւայլն եւայլն.

սակայն գլխաւոր մասը կը կացուցանէ միշտ *կալիկոն-փոփաթ* ըսուածը. իսկ *կալիկոն-աթիապ*, *ճափնէսիո-ճ-փոփաթ* քիչ քանակութեամբ կը գտնուի: Եթէ ոսկրանիւթն առատ ըլլայ, ոսկրները դիւրաբեկ եւ փխուր կ'ըլլան (ինչպէս ծերութեան ատեն), իսկ եթէ շատ պակսի՝ անգղիական *Տիւանդուլիւն* (Rhachitis) յառաջ կու գայ:

Մարդուն 240 ոսկրներու գլխաւորները հետեւեալներն են՝

13 Գանգի ոսկրներ (Ճակատոսկր, 2 հատ գագաթոսկր, ելուստ, 2 քունքոսկր, որոնց ամէն մէկը 3 հատ ականջոսկրիկներ ունի, մաղոսկր.) 15 Երէնաց ոսկրներ (վերի կզակոսկրին 2 մասերը՝ ամէն մէկը 8 ականներով, 2 քմոսկր, 2 այտոսկր, 2 արտասուաց ոսկրներ, 2 քթոսկր, 2 քթի դնդերոսկր, խոփ, վարի կզակոսկր՝ 16 ականներով, լեզուոսկր): Ողնայայրէ կամ Ողնաշարի 26 ոսկրներ (7 վզի՝ 12 կուրծքի՝ 5 մէջքի՝ 5 ողեր, սրբանոսկր, զստոսկր): Կոշիւ 25 ոսկրէ կազմուած է, (այսինքն կրծոսկր եւ 12 զոյգ կող): Կոնք 2 ոսկրէ կազմուած: Բազիկոսկր (2 անգամ 34, այսինքն անրակ, ուսոսկր, տիգք, ճանանչոսկր եւ արմկոսկր, 8 հատ դաստակի՝ 5 հատ ափի՝ եւ 14 մատի ոսկրներ, 2 շուշմ ոսկր): Սրտանի ոսկրներ (2 անգամ 32, այսինքն բարձ, աքեաց եւ ոլոք, կողովոց, 7 հատ՝ ոտնարմատի, 5 հատ՝ ոտնամիջի եւ 14 հատ՝ մատօղներու ոսկրներ):

4. Անոններն ալ ոսկրներու կարգը կը դասուին. մէկ կամ շատ արմատներով՝ կզակի մէջ ամուր մխուած են, եւ իրենց գրից ու պսա-




Պատկ. 3. Մարդուն ականները:

ա. կտրող ականներ, բ. անկեան ակոյայ, գ. աղօրիք:

կին (ակոյայի վրայի մասին) կազմութեան նայելով կը բաժնուին, առջեւի կամ իտրող, անկեան կամ շնակեան, եւ քառակուսի կամ աղօրիքներ: Առջեւի քսան հատ ականները (կաթի ականները) կը փոխուին: Բոլոր ականները ճարպի նման խիստ կարծր զանգուածով մը (գրականտիկոնով) պատած են: Չափահաս մարդը 32 ական ունի, այսինքն վերը եւ վարը չորս չորսական կտրող ականներ, եւ երկու ծնօտ-

դուրս կը դարձնեն: Փակէլ մկուկները օղակի մը կը նմանին եւ բերանն ու աչուկները կը գոցեն: — Կամայական շարժում յառաջ բերող մկուկները՝ որոնք 500 ի չափ կան, թխակարմիր են, եւ մազ-



Պատկ. 5. Մարմնային մկուկներ:


ա. կրծոսկրի վըպ,
բ. անրակի վըպ՝ կապուած գլխու ծուխ մկուկին ծայրը,
գ. ուսոց մկուկը,
դ. կուրծքի մեծ մկուկը,
ե. երկգլխեան բազկի-մ.,

զ. բազկին՝ երեքգլխեան տարածիչ մ.,
է. երկայն շրջանակիչ մ.,
ը. բոլորակ ձգիչ (առ-բերող) մ.,
թ. յ. ի. մատանց մեջ տարածուող ձգիչ մ.,

լ. բթամատի դիմադիր մկուկը,
կ. բթամատի ձգիչ մ.,
շ. բթամատի ծգիչ մ.,
չ. բթամատի շրջանակիչ մկուկը,
հ. ցուցամատի ծուխ մ.:

մկուկներ ունին, որոնք խիստ մեծցուած ատեն շեղ գծեր կ'երեւան: Իսկ ականայ շարժում յառաջ բերողները՝ գունատ են եւ շեղ գծեր չունին, ասոնց շարժումը մեր կամքէն անկախ է, ինչպէս սրտի, սրտի առագաստին, շնչառութեան, ստամոքսի եւ աղեաց մկանուկներու շարժումները:


6. Ջիղ (Nervus): Մեանուրի գործողութիւնը կը գիւրացընեն ջղերը: Մարդուն ջղերը կէս մը սպիտակ գերձանի ձեւով, կէս մըն ալ



Պատկ. 6. Մարդուն ջղային դրութիւնը:

Պատկեր 6. ցոյց կու տայ մարդուն ըզեղին ու գլխաւոր ջղաց արմատներու պայտօնն ու գործունէութիւնը.

ա. մեծ ըզեղ, բ. փոքր ըզեղ, գ. ողնածուծ. (տես ընդրձկ. 7 Պատկեր):



Պատկ. 7. Ըզեղ եւ ողնածուծ:


1—12 ըզեղի ջղաց զոյգերը, ա. մեծ ըզեղ, բ. երկայնեալ ծուծ, գ. ողնածուծ, դ. փոքր ըզեղ, ե. բազկաց հիւսուածքը, զ. ազդրներու հիւսուածքը, է. զիստերու մեծ ջիղը:

ձեծամեծ իմպեր եղած (գլխաւորաբար իմպեր ըզեղ, ողնածուծ, եւ ջղագոյն) ամբողջ մարմնոյն մէջ կը գտնուին:

Իրենց գործողութենէն առեալ ջղերը կը զանազանուին, կենդանական ջղեր, որոնք ըզեղէն սկսեալ՝ մարմնոյն առանձին առանձին մա-

սանց վրայ կամաւոր շարժումներ յառաջ կը բերեն, եւ զգայական ջղեր, որոնք արտաքին ազդեցութիւններն ըզբղին կը հաղորդեն եւ ասով ըզեղը կ'իմանայ: Անոր համար ջղաթելերը՝ որոնք դարձեալ արտաքոյ կարգի բարակ, հաւասարաչափ, ջղային մազմզուկներու կծիկներէ (գուղձերէ) կը բաղկանան, շատ իրաւամբ հեռագրի (թէլեգրաֆի) թելերուն կը նմանցընեն, վասն զի կամ ի ներքուստ արտաքս եւ կամ արտաքուստ ի ներքս շարժումներու հաղորդիչ կ'ըլլան: Մեր ըսածը կը հաստատեն Պտկ. 6 եւ 7:

Ըղէղն՝ սպիտակագոյն, տեղիս տեղիս կարմիր մոխրագոյն, կակուղ, ջլաց զանգուած մըն է. գրեթէ 1.5 +իլոգր. ծանր է եւ խորունկ կտրուածքով մը երկու անհաւասար մասերու՝ մէջ ու պղպիլ ըղէղն կը



Պտկ. 8. Ըղեղն՝ ուղղաձիգ կտրուածք:


ա. լծակ ըզեղի, բ. փոքր ըզեղ (կենաց ծառ), գ. ողնածուծ, դ. մեծ ըզեղ:

բաժնուի: Վրայէն նայելով աղիքի կամ օձանման գալարուածքի կը նմանի, իսկ ներսը զանազան ձեւերով ուռեցքներ կամ խորունկ ծակեր (խորուչներ) կը նշմարուին: Մեծ ըզեղը՝ գանգի խորուչին մեծ մասը կը բռնէ եւ կը բաժնուի՝ յառաջակողմեան եւ յետահակողմեան ըղէղ: Ըզեղը՝ վարի կողմանէ երկնստով՝ երկայնեալ ծոծր կը կազմէ, աս ալ՝ Ողնաշոշոռ, որ կարգի ձեւով՝ ամբողջ ողնածուծի խողովակին երկայնութեամբ կը տարածուի, եւ թէ՛ աջ եւ թէ՛ ձախ կողմը՝ ամբողջ ողնայարին երկայնութեամբ 31 զոյգ ջիղ կ'արձակէ:

Զգացում (Sensus):

7. Ըղեղէն ելած մասնաւոր ջղերու միջոցաւ կարելի կ'ըլլայ հինգ-պիսիւնս ապրոս-մէքն զգալ:

Զգացողութեան նիստը՝ արտաքին յորիւն է: Այս մորթը՝ թափանցիկ, տեղոյն մաշկէ մը կը կազմուի որ ամենեւին չի զգար: ասոր տակը գոյնզգոյն լոբնախաւ մը եւ հաստ ու ամուր կաշեմաշկ կայ: Այս վերջինին վրայ շատ մը գործարաններէն զատ՝ (որոնք են Իրարինի Բըրիւնէր, Դալի Գո-լլէր, ճարպահիւսիւն,) կան նաեւ շօշափելեաց պըտ-




Պտկ. 9. Մարմանց ծայրի մորթին միջակտուրը:

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. եղնգախաւ, | 3. պտիկներ. | անցքը եւ պլն), |
| * եղնգախաւին անտափակ բջիջներու վերջին ծայրը, | 4. կաշի, | 7. քրտանց բշտիկներ, |
| 2. լորձնախաւ, | 5. ճարպահիւսիւն, | 8. երակի մը միջակտուրը, |
| | 6. 6' մորթին ծակտիքը (քրտանց բշտիկներու անցքը 20 անգամ մեծցուած): | |

կիկներն, որոնք մորթին վրայ մանր, դուրս ելած բշտիկներ կ'երեւան, ասոնց իւրաքանչիւրին մէջը՝ կայ ջղային մազմզուկի մը ծայրը, եւ ասոնք են որ շօշափման, ճնշման, ցրտութեան եւ ջերմութեան զգացումները կը հաղորդեն: Բայց մորթի ամէն բշտիկը՝ շօշափելեաց բշտիկ չէ, մատուցներուն ծայրը ամէնէն շատ ու բազմաթիւ են: Նոյնպէս լեզուամաշկին վրայի բշտիկներուն մէջն եւ վերին քմաց մէջ՝ կայ զգայութեան ջիղ մը, որ է ճաշակելեաց ջիղը: Նոյնպէս քթին լորձնաթաղանթին մէջն ալ կայ Հոբոտելեաց ջիղը: Որպէս զի ճաշակելեաց եւ հոտոտելեաց զգացումներն իմանանք, հարկ է որ ճաշակելի կամ հոտոտելի նիւթը՝ լորձնաթաղանթին հետ շփուի եւ հոն լուծուի:


8. Ականջը (*Auris*) կամ լսողութեան գործարանն երեք մասէ կազմուած է, այսինքն արտաքին, միջին եւ ներքին մասունքներէ: Առաջինին կը վերաբերի՝ Ականջակոնքը, արտաքին ականջափողն եւ լսականաղան-թիւն, որ նուրբ մաշկ մըն է եւ զասոնք միւս մասերէն կը բաժնէ: Միջին մասը՝ լսականփողը ըսուած խոռոչին մէջ, ոգ կը պարունակէ եւ 3 մանր ոսկրիկներ (*ժուրճ, սալ, ասպարան*), եւ խողովակով մը (*էսպարատեան փող*) երախքին (*բերնի խոռոչին*) հետ հաղորդութիւն ունի: Իսկ ներքին մասին մէջ՝ կայ Բաւիղը (որ ունի դարձեալ գաւիթ, խղունջ եւ 3 հատ կիսաբոլոր անցքեր), ջրով լեցուած է եւ լսելու ջղին տարածուելուն կ'օգնէ: Հընչիւնը՝ թմբկախորչին եւ լսելեաց ոսկրիկներէն անցնելով մինչեւ բաւիղը կը հասնի, այս ջրոյ վրայ կուհակաձեւ շարժումներ կը պատճառէ, եւ աս ջրոյն ալիքը՝ լսելեաց ջղին միջնորդութեամբն ըղեղին մէջ լսելու զգացումներ կը պատճառեն:



Պտկ. 10. Մարդուս ականջը:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ա. ականջակոնք, | ե. թմբկախորչ, |
| բ. ականջափող, | զ. խղունջ, |
| գ. բլթակ, | ն. լսելու ջիղ, |
| դ. վարի կզակի յօդա- | ժ. նախադաւիթ, |
| կապ, | է. բաւիղ եւ կիսաբոլոր |
| ե. թմբկաթաղանթ, | անցքեր, |
| զ. եւստաքեան փող, | ւ. քունքոսկր: |

Լսելու գործարանին միջին եւ ներքին մասունքը՝ քունքոսկրին խորունկ տեղ են, եւ աս ոսկրին քարի պէս ամրութեամբ ամէն տեսակ փնասէ զերծ կը մնան:




- Ա լսելու ջիղ,
Բ խղունջ,
Գ ձուածեւ ծակ.
ա. սալ,
բ. մուրճ,
գ. ոսպնեակ,
դ. ասպարան:

Պտկ. 11. Ականջին Բաւիղը:

9. Աչքին (*Oculus*) գնդակը (*պտուղը*)՝ խոռոչի մը մէջն է: Արտեւանունքով ու կոփքով կը պաշտպանուի, եւ արտասուաց կամ ճարպի բշտիկներով կը մաքրուի:

Աչքի գնդակը՝ սոխի կեղեւներուն պէս զերար պատող երեք մաշկէ կազմուած է, որոնք թափանցիկ մարմնով լեցուած գնդակաձեւ խոռոչը կը պատեն: Ամենէն արտաքին մաշկին առջեւի կողմը ապակեոյ պէս թափանցիկ է եւ Եղջերեայ կ'ըսուի, իսկ միւս կողմերը՝ ճերմակ, հաստ եւ անթափանցիկ են, եւ ծանօթ են՝ ապիպակ լը-ան կամ Կարծրամաշկ աչքայ անուամբ: Երկրորդ շարքը կազմուած է՝ Երակամաշկէ եւ Ծիւ- թանէ: Ծիւթանը զանազան գոյներով է, մէջ-



Պատկ. 12. Բացուած աչքի գնդակ:

- ա. սառնակերպ (ոսպ),
- բ. արտեւանունք,
- գ. ծիւթան,
- դ. բիբ,
- ե. եղջերեայ,
- զ. ապակէհիւթ,
- է. ցանցամաշկ,
- զ. տեսութեան ջիւղ,
- ը. երակամաշկ,
- թ. կարծրամաշկ:


թանէ: Ծիւթանը զանազան գոյներով է, մէջտեղը կը որ ծակ մը (բիբ) կայ, եւ զարմանալի յատկութիւն մ'ունի, այսինքն միջոյ մէջ շատ կ'ամփոփուի եւ ասով բիբն ալ շատ կը տարածուի: Աչքին գոյնը (ծակի, մոխրագոյն, գորշ, սեւ) ծիւթանի (Iris) գոյնէն կ'ախուժուի: Երակամաշկը շատ մը անօթներ ունի եւ սեւ է, աչքի գնդակին ներքին կողմը կը պատէ: Երրորդ կամ ամենէն ներքին մաշկը՝ Երակամաշկէն վրայ կը հանգչի, տեսութեան բարակ ու թափանցիկ ջիւղէ կազմուած է: Ասոր համար Յանցամաշկ (retina) կ'անուանուի:

Ծիւթանի մաշկին միջնորդութեամբն աչքի գնդակը՝ 2 շատ անհասար մասանց կը բաժնուի, որ են յառաջակողմեան եւ յետսակողմեան ակնախորշեր: Յառաջակողմեան ակնախորշին մէջ միայն ջուր կայ, իսկ յետսակողմեան խորշն՝ ըստ մեծի մասին՝ թափանցիկ եւ կէս մը հաստատուն ապակեայ հիւթով լեցուն է, եւ անմիջապէս բիբն ետեւը՝ աչքի սառնակերպով (կամ ոսպով) լեցուած է: Անոր համար լուսոյ ճառագայթները կրնան եղջերային եւ յառաջակողմեան ակնախորշին ջրէն ու բրէն անցնելով՝ սառնակերպին հասնիլ, անկէ ալ ապակեայ հիւթին ձեռօքը, աչքի ցանցամաշկին վրայ թափանցել: Սակայն լուսոյ ճառագայթները՝ գլխաւորաբար ոսպին մէջէն անցած ատեն, իրենց ուղղութենէն այնպէս կը խոտորին, որ լուսանկարի (ֆոթոգրաֆի) ծաւ- ակնակ ըսուածին պէս՝ հոս ալ առարկաները գլխիվայր եւ մանր կը պատկերանան եւ աչքին ցանցամաշկին վրայ տեսութեան զգացում յառաջ կը բերեն:

10. Ինչպէս բարձրագոյն կենդանեաց նոյնպէս մարդու աչքան առնչեալն ալ խողովակներու ցանց մը կը կազմեն, որ մէկ կողմանէ պարզ աչօք անտեսանելի խողովակիներու կը բաժնուին, իսկ միւս կողմանէ իրենց գլխաւոր գործարանին, որ է սրաին մէջ, իրենց գլխաւոր ձիւղերու հետ կը միանան:

Սիրտ (Cor):

11. Մարդուն Սիրտը՝ կուրծքի խոռոչին կենդրոնը երկու Բոսիւրո-
 չլիւսիւրոն մէջտեղն է, բայց քիչ մը դէպ ի ձախ կողմը: Երկայնա-
 ձեւ բոլորակ մնային պարկ (սնամէջ մնան) մըն է, եւ ամփոփուած է բա-
 րակ մաշկէ քսակի մը մէջ (որ Սրտիպարկ կ'անուանուի): Ուղղաձիգ Մի-
 ջնորժով մը սիրտն երկուքի կը բաժնուի, մէյ մը աջ, մէյ մ'ալ յախ-
 ասոնցմէ ամէն մէկն ալ դարձեալ նեղ բաժանմամբ մը երկու մասի կը
 բաժնուի, որոնք Նախասիրտ
 եւ Սրտասիրտ կ'անուանուին:
 Աջակողմեան նախասիրտին մէջ
 2 մեծ (արեան երակներու,
 Սնամէջ Երակներո) բերան-
 ներ կան, որոնցմով՝ ամբողջ
 մարմնոյն մէջէն արիւնը սիրտը
 կը դառնայ: Աջակողմեան սր-
 տասիրտէն կը բղխէ Թոքոց ա-
 րիւններակը, որ արիւնը Թո-
 քերուն կը տանի: Չախակող-
 մեան նախասիրտին մէջ 4 Թո-
 քերակներուն բերանը կայ, ո-
 րոնք արիւնը Թոքերէն սիրտը
 կը բերեն. ձախ սրտասիր-
 տէն ալ մարմնոյ ամենամեծ ե-
 րակը (ԱւագԵրակը կամ Ա-
 ըիւնաճոռի արոն) կը բղխէ,
 որ դարձեալ արիւնը կ'անու-
 եւ ամբողջ մարմնոյն մէջ կը
 տարածէ: Ուստի եւ այս պատ-
 ճառաւ արիւնն երկու շրջան
 կ'ընէ. մէյ մը սրտէն դէպ ի
 Թոքը եւ ասկէ ալ դարձեալ
 սիրտը կը դառնայ (եւ կ'ըսուի
 Փոփր շրջան), մէյ մըն ալ սրտէն ամբողջ մարմինը կը տարածուի, ասկէ
 ալ սիրտը կը դառնայ (եւ կ'ըսուի Մեծ շրջան): Սիրտը ուժգին ամփո-
 փուելով՝ արիւնը ճնշմամբ մը սրտէն շնչերակը կ'երթայ, եւ սրտի կամ
 բազկի զարկէ ըսուածն աս արեան ճնշումն է: Շնչերակին ամենաբարակ
 ճիւղերը՝ մազակերպ անօթներու ցանց մը կը կազմեն, որոնք դարձեալ
 երթալով մեծագոյն անօթներու հետ (որ ճայր կ'անուանուին) կը միա-
 նան, եւ ասոնցմով արիւնը սիրտը կը դառնայ:




Պատկ. 13. Մարդուն սիրտը (առջեւէն նկատուած):

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ա. աջակողմեան սր-
տասիրտը, | ե. աւագերակ, |
| բ. ձախակողմեան սր-
տասիրտը, | զ. Թոքի շնչերակ, |
| գ. աջակողմեան նա-
խասիրտը, | է. զիւսու զարկերակ, |
| դ. ձախակողմեան
նախասիրտը, | զ. վերին սնամէջ ե-
րակ, |
| | ը. Թոքի արիւններակ: |

Թոքեր (*Pulmones*):

12. Անամշ Երակներով սիրտն ետ դարձող մթագոյն (Երակային) արիւնը Թոքերու մէջ՝ օդին գլխաւոր մասերէն մէկուն (Թթուածինի)



ազգեցութեամբը՝ Էական փոփոխութիւն կը կրէ: Ասով արեան մէջ եղած ածխածին մէկ մասը իւրեւ գալ (= ածխածին) ջրածինով եւ ուրիշ անգործածական օդերու հետ միացեալ՝ շնչառութեան ատեն դուրս կ'ելլէ, եւ ասով արիւնը պայծառ գոյն մը եւ ջերմագոյն բարեխառնութիւն մը կ'առնու: Ասով արիւնը Դարձեալ կենսափոփոխութիւն կը ստանայ: Բայց տեսնենք նախ իրարմէ:

13. Խոշակ, խոշակօղջ, որ նաեւ իւրեւ ձայնի գործարան (եւ այն ատեն՝ հափափ կ'անուանուի) մեծ նշանակութիւն ունի, շնչափողին ամէնէն վերի մասն է եւ կոճիկներէ ու մկաններէ կազմուած է: Վզին վրայէն յայտնի կը

Պատկ. 14. Խոշակը (առջեւէն կտրուած):


- | | |
|--|-------------------------|
| ա. քթանցքի ծակը, | ւ. քիմքիներքին սիւները, |
| բ. երակք, բերնի խողով, | է. գեղձերը, |
| գ. Դ. մազուկներն վերին եւ միջին ոսկրիկը, | զ. քիմքի ետեւի սիւն, |
| դ. քթի փողերը, | է. լեզու, |
| է. մազուկներն վարի ոսկրիկը, | զ. վահանակաձիկ, |
| զ. սեպուկը, | է. խաչկի ներքին կողմը, |
| ը. եւստաքեան փողին ծակը, | զ. օղակաձիկ, |
| բ. ոսկրեայ քիմք, | է. վզի օղբը, |
| գ. խաղողիկ, | է. ստուգն, |
| է. քիմքի առաջաստ, | է. լեզուօսկր, |
| | է. կողորդափակ, |
| | է. որկոր, |
| | է. շնչերակ: |

տեսնուի, ներսի կողմը ճեղքուածքի նման ծակ մ'ունի (Չայնաճոփ կամ Չայնաթան), որ կրնայ լայնեալ ու նեղեալ եւ շարժական կոճիկով մը (Կոնյոթափափով) կը գոցուի, եւ առաջգական եզրներ ունի, որոնց ճոճմամբը հնչումներ յառաջ կու գան:

Շնչափողը՝ օղակաձեւ կոճիկներով կը պատասպարուի եւ Չ գլխաւոր ստեղներու կը բաժնուի, որոնք դարձեալ բազմագիմի ճիւղերու կը


բաժնուին, ասոնք ալ վերջապէս՝ թոքի բշտիկներու մէջ կը վերջանան:

Թոքերը կուրծքի խոռոչին մեծագոյն մասը կը լեցընեն եւ սրտին երկու կողմն են: Աջ Թոքը երեւելիէն է, իսկ ձախակողմեանը՝ երկըլթեան: Ասոնք երկայնաձեւ բորբոսի բշտիկներով՝ կակուղ, փափուկ եւ սպընգանման զանգուած (հիսուածք) մը կը կազմեն, օդով կը լեցուին եւ փափուկ՝ մազակերպ անօթներէ շինուած ցանցով մը պատած են: Աս թոքի բշտիկները կամ օդոյ փոփոքը շատ մանր են եւ 1.800 միլիոնէն աւելի են: Օդը՝ իւր հասարակ ճամբաներով, պսիւնքն՝ բերնէն, քթէն, երակքէն, խռչափողէն, շնչափողէն,



Պատկ. 15. Թոքերն ու սիրտը:

Ա. սիրտ, Բ. շնչերակ,
Բ. թոք, Դ. աւազերակ:



Պատկ. 16. Մարսողութեան գործարան:

Ա. ուկոր,	Ե. լեարդ,
Բ. ստամոքս,	Զ. գալարաղիք,
Գ. փորի լորձնա-	Է. նրբաղիք,
գեղձ,	Ը. վարազաղիք
Դ. փայծաղն,	(թափան),
Ե. դռնակ (սոր),	Թ. կուրագի,
Զ. մաղձակալ,	Ճ. ստուարաղի:

եւ ասոնք ճիւղաւորուած մասունքներէն անցնելով մինչեւ թոքի բշտիկները կը հասնի, ասկէ դարձեալ՝ շնչաւումթեան ատեն կուրծքի շարժմունքներով՝ մի եւ նոյն ճամբով ետ կը դառնայ:

Մարսողութեան գործարան:

14. Կուրծքի խոռոչին մէջ կան գլխաւորաբար թոքերն ու սիրտը. իսկ ճարտարաբանական ամենակարեւոր հորջապարանները՝ փորի խոռոչին մէջն են: Մարդուն կուրծքի եւ փորի խոռոչները՝ շեղ տարածուած մէջ մաշկով մը՝ պարփակուած, իրարմէ բաժնուած են: Քիմքի միջնորդութեամբ՝

որոնց մէջտեղէն խաղաղէիլ կը կախուի, կերակուրները բերնէն կոկորդը կ'երթան, ասկէ ալ՝ շնչերակի տակ գտնուած մաշկէ ուրիշն ձեռքը՝ ապահով կ'երթան. որկորին վարի մասը՝ կ'անուանուի ապահով: Ստամոքսն՝ երկայնաձեւ մաշկեղէն պարկ մըն է, որ անմիջապէս ստոծանւոյն եւ սրտին տակ՝ փորի խոռոչին վերի մասին վրայ է եւ ծայրն աղեաց մէջ կը յառաջանայ. աս աղիքին վերի մասը 4—7 մէտր երկայն, բարակ է, իսկ վարի մասը 2 մէտր երկայն մաս մ'ունի, որ զգալի կերպով հաստ է եւ անոր համար այս աղիքը Նիֆաղէ + եւ Սպահանգէ + ալ կ'անուանուի: Ստամոքսին աջ կողմն է՝ գորշ կարմիր գունով տարածուած լեպտը, որուն մէջ՝ լեզն կամ ձաղճ ըսուած մասնաւոր հեղուկ մը կը գոյանայ, որ Մաղակալ կամ լեզապապ անուամբ պարկի մը մէջ ամփոփուած է: Ստամոքսին ձախ կողմը կայ արիւնալից փայծաղը: Փորի խոռոչին ետեւի պատին վրայ, որ է ըսել՝ աղիքներուն ետեւը, թէ աջ եւ թէ ձախ կողմը մահիկի ձեւով երկնաձաւ + մը կայ, որ մէջը կը բաժնէ, եւ աս մէջը ապահովութիւն մէջ կը ժողովուի:

15. Լաւ մարսողութիւն մը սկիզբն է առողջութեան, իսկ առողջութիւնն երկրաւոր բարիքներէն ամենամեծը կրնայ համարուիլ:

Ամէն մարդու պարտքն է իւր առողջութիւնը խնամել, եւ առանց կարօտութեան՝ վտանգներու մէջ չնետել ինք զենքը:

Պահէ իւր մտքին մէջ աշակերտը՝ առողջութեան հետեւեալ կանոնները.

1. Զաւազանց ուտելէ եւ խմելէ եւ ամէն տեսակ շուտութեան զգուշացիր:
2. Անմարսելի կերակուրներէ հրաժարէ:
3. Կեցած տեղդ, գործելու եւ պառկելու սենեակդ միշտ մաքուր օդ գտնուի, ամառը՝ միշտ, իսկ ձմեռը՝ ստեպ պատուհանդ բաց:
4. Յանկարծական ցրտառութեան զգուշացիր:
5. Քրտնած՝ պաղ ջուր մի խմեր:
6. Սաստիկ տաքութեան զգուշացիր:
7. Զգայարանքդ զգուշութեամբ գործածէ: Միտնալու ատեն եւ կամ շատ բարակ աշխատութիւններով աչքդ չափազանց մի յոգնեցրներ:
8. Ուժեղ վեր գործեր ընելէ՝ ծանր իրեր վերցրնելէ, զգուշացիր:
9. Արտաքին վտանգներու, կռիւներու մէջ եւայլն, մի նետուի:
10. Եթէ առողջութիւնդ խանգարի, անյապաղ՝ բժշկի մը դիմէ, եւ անոր խրատին անսա:

Մարդկային ցեղերը:

Մարդուն մարմնոյն նկատմամբ ցարդ ըսուած յատկութիւններն ամենուն համար հաւասարուպէս կ'արժեն: Մարդս ամէն գօտիներու մէջ կ'ապրի եւ ամէն կլիմաներու կը տանի: Նոյնպէս անունդն ալ շատ բազմատեսակ է: Ամէն տեղ ընկերաբար կ'ապրի եւ այս իւր ընկերութեամբն ընտանիք կը կազմէ, որուն մէջ փոքրիկ տէրութեան մը պէս, իւր քաղաքականութեան հիմը կը դնէ: Սակայն օդին ազդեցութեամբը, գտնուած տեղոյն հանգամանքներովն, ապրելու եղանակաւ եւ մանաւանդ շրջապատող պարագայից նպաստելովը՝ կրնանք ընդհանուր մարդկութիւնն այլեւայլ ցեղէրո՝ կամ րիւիւրո՝ բաժնել: Առ այս՝ իբրեւ կարեւոր ծանուցիչներ են՝ մարմնոյ գոյնը, գլխուն կազմութիւնն ու մազերու որակիւթիւնը:



Պտկ. 17. Կովկասեան ցեղ:

Եւրոպացի:

Ըստ Բլումենբախի (Blumenbach) հինգ գլխաւոր ցեղ կը զանազանուի. Կովկասեան, Մոնգոլեան, Խափշիկ (եւթովկեան), Ամերիկեան եւ Մալայեան ցեղ:

1. Կապիտան ցեղը կը կազմեն գրեթէ բոլոր Եւրոպայի, արեւելեան Ասիայի եւ հիւսիսային Ափրիկէի բնակիչները, եւ հասփոյն մորթ մ'ունին: Ասոնց՝ թանձր, երկայն, կակուղ մազը զանազան գոյներ ունի, խարսեալ (գերմանական, սլաւեան), աւ (հայ, իտալացի, հրեայ), գորշ եւայլն եւայլն: Գանգը՝ գնդաձեւ, իսկ ճակատը բարձր: Ձուռձեւ երեսին վրայ քիթը չափակցեալ եւ արծուենման: Կտրող ակուններուն դիրքն է՝ կզակին վրայ ուղղաձիգ. (Համ. Պտկ. 17, 18, 19) Այս ցեղին տակ կ'երթան, հնդեւրոպացի (յաբեթեանք), այսինքն՝ Հայք, Պար-

սիկք, Հռոմայեցիք, Յոյնք, Սլաւք, Ալբանիացիք եւ այլն: Սէմեանք՝ կամ
ասորի-արաբացիք, պոսինքն Արամացիք (Ասորիներ ու Գաղղէացիք), ա-
րաբացիք, հրեայք, եւ հին Ասորեստանցիք ու փինիկեցիք: Քամեանք՝



Պտկ. 18. Կաւկասեան ցեղ:

Գուրիացի.

Հայ.

Քուրդ.

կամ Բերբէր ժողովուրդը. պոսինքն խպտիներ, ուհտուններ (հին եգիպ-
տացիք), արեւմտեան լիւբէացիք, կաքիլներ, տուարէգ, բերբերեանք
հաբէշք եւ այլն եւ այլն:



Պտկ. 19. Կաւկասեան ցեղ:

Վրացի.

Արաբացի.

2. Մոնգոլեան ցեղը կը բնակի Ասիայի միջին եւ արեւելեան կող-
մերը. այս ցեղին կը վերաբերին Ամերիկայի հիւսիսային կողման Էսկիմա-
ցիք, եւ Եւրոպայի Լապտոնացիք ու ֆիններեանք: Ասոնց մարմնոյն գլխաւոր

գոյնն է սպիտակ-դեղին, մազը՝ ցանցառ, պիրկ, խառն ու սեւ: Բոլորակ, մանր գլխուն վրայ լայն կզակաները կողմնակի դուրս կ'երկննան: Մանր քթին պատճառաւ ասոնց կերպարանքը լայն ու տափակ կ'երեւայ, եւ



Պտկ. 20. Մոնգոլեան ցեղ:

Չինացի.



Ճապոնացի.

իրենց նեղածագ, կկոցեալ եւ դէպ ի վար ուղղուած աչքերը՝ «չինական» տեսք մը կու տան ասոնց:



Պտկ. 21. Մոնգոլեան ցեղ:

Ստեպ.

Եւս ցեղին տակ կ'երթան Բուռ մոնգոլներ, տունգուզներ, սամոյէդներ, թաթարներ, թիւրքմէներ, չինացիք, ճապոնցիք, տիբէդներ, եւայլն եւայլն:

3. Սե-ա-հո-ր-ն-ե-ր-ո- (կամ Նե-գ-ր-ն-ե-ր-ո-) ցեղը կը բնակի միջին եւ հարաւային Ափրիկէ, ասոնց մորթին գոյնն է սեւ: Կարճ եւ ետ դար-



Պտկ. 22. Սեւամորթներ:

Ջուլու - Կաֆեր.

Կոնգոյի սեւամորթ.

Սուահիլի.

ձած ճակատ մը, նեղ եւ երկայն գլուխ, որուն վրայ կարճ, թանձր, եւ բրդեայ մաղ մը կայ: Ասոնց դէմքը շատ դուրս ցցուած է: Լայն քիթը դէպ ի վեր դարձած, իսկ շրթունքը՝ թանձր ու մսուտ: Կողմնակի



Պտկ. 23. Ամհրիկացիք:

Տանանցի.

Էսկիմոյ.

ակռաները դէպ ի առջեւ ցցուած են եւ ծուռ, իսկ ծնօտն շատ ետ ծռած է: Այս ծանուցիչները կը նշմարուին ամէն սեւամորթներու վրայ. բայց կայ իրենց մէջ մասնական տարբերութիւններ (տես Պտկ. 22):

Այս ցեղին կը վերաբերին տեղաներ, ֆուլաններ, բուն խափշիկներ, զուլուններ, կաֆէրներ, սուակէլներ, կոնգոյի սեւամորթներ եւ այլն եւայլն:

4. Աֆրիկէան ցեղ: Իրենց պղնձագոյն մորթին համար շատ իրաւամբ կարմրամորթ անուանուած են Ամերիկայի նախնական բնակիչները: Միջին եւ հարաւային Ամերիկայի բնակչաց գոյնը գորշի եւ սեւի կը զարնէ: Ցանցառ, երկայն, պիրկ մազերը վար կախուած են: Ասոնց ճակատը կարճ եւ դէպ ի ետեւ ծռած է, իսկ կերպարանքը՝ լայն: Մանր եւ անկենդան աչքերը խորունկ, իսկ մեծ քթին ետեւի կողմը կոր ու սուր քամակ մը կայ:

Այս ցեղին տակ կը դասուին Կանադացիք, Էսկիմոսացիք (տես Պատկեր 23) մէկ մասը, տակոտներ, սիուներ, պամպաներ, արաւկանեանք եւայլն եւայլն:

5. Մալայէան ցեղը գորշագոյն մորթ մ'ունի, ասոնք Աւստրալիայի մէկ մասը, եւ հարաւային Ովկիանոսի կղզեաց վրայ կը բնակին: Սեւ մազ եւ թանձր գանգուրներ ունին: Չափաւոր նեղ գլխուն վրայ կամա-



Պտկ. 24. Մալայեան ցեղ:

Աւստրալիացի.

Նորգիւնէացի.

Նորկալեդոնեացի.

րաձեւ ուռած ճակատ մը, լայն, հաստ, տափակ ու բութ քիթ մ'ունին: Դուրս երկնցած կզակներն աւելի տձեւութիւն մը կ'առնուն՝ իրենց թանձր ու լայն շրթունքներու պատճառաւ:

Ասոնց կը վերաբերին. Նորգիւնէացիք, Նորկալեդոնեացիք, ալֆուրեաններ, բուսներ, ամբոյինացիք, միկրոնեզեան, պոլինեզեան եւն, Ժողովուրդները: Նորագոյն բաժանմանց համար, ոմանք կողմնակի ակռաներու դիրքը՝ (ուղղատամն եւ շեղատամն) գանգին ձեւը՝ (կարճագլուխ եւ երկայնագլուխ) լեզուաց զանազանութիւնը եւայլն, իբր հիմ կ'առնուն:

ԱՆԱՍՆՈՑՄԱՐՄՆՈՑՆ ԸՆԿՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Ա. Անասնոց մարմնոյն արտաքին ճեւը:

1. Անասուններէն շատերն երեք գլխաւոր արտաքին մաս ունին. Գլուխ, Իրան եւ Անդամ: Անասուններէն ոմանք՝ (ինչպէս օձն ու շատ մը որդեր) անդամ չունին. ոմանք (ինչպէս խեցիներն ու կորաղիոնները) նաեւ գլուխ ալ չունին: Իսկ իրան (բուն)՝ ամէն անասուն ունի: Անասնոց բոլոր մարմինն արտաքուստ մորթով մը պատած է:

2. Գլուխը (caput) մարմնոյն ամէնէն առջեւի եւ ամէնէն վերի մասին վրայ է: Գլուռն վրայ կան՝ բացի Բերնէն, նաեւ ուրիշ ամենակարեւոր զգայարաններն, ինչպէս Աչք, Ախանջ, Քիւն եւ Լեզու: Իսկ ոմանց գլուռն վրայ ասոնցմէ զատ ուրիշ զանազան յաւելուածներ ալ կ'ըլլան, ինչպէս Եղջուր, Վերթակ, Էքոակ, Էոդէու:

3. Կենդանեաց բերնին որպիսութիւնը մասնաւոր մտադրութեան արժանի է, վասն զի անոնց կերակրոյն, ապրելու կերպին եւ ուրիշ կազմութեան հետ սերտ կապակցութիւն ունի: Բարձրագոյն կենդանեաց բերանը կայ՝ անշարժ վերի իջակ մը, եւ շարժական վարի իջակ մը: Երկու կզակներն (= ծամելիք) ալ սովորաբար կամ Ախուս ունին եւ կամ Կոսոց: Ախուսներու կամ կոսոցն մեծութենէն ու ձեւէն՝ ապահովութեամբ կենդանւոյն ինչ ուտելը կ'իմացուի, մասնաւորապէս՝ թէ արդեօք մսակեր անասնոց թէ խոտակերներու կը վերաբերի: Ասկէ զատ ակուաներու գիրքին եւ որպիսութեան նայելով կը զանազանուին. առջեւի (= Կոսոյ)՝ անկէան (= շնական)՝ եւ Թամոյ (= աղբիւր) ախուսներ: Յօդաւոր անասնոց բերանը, մերթ խածնելու յարմար է, եւ մերթ՝ ծծելու: Առաջինը (որոնք ախուս ալ կ'ըսուին)՝ հասարակօրէն կողմնակի շարժող 2 զոյգ արջանի ձեւով կզակներէ կազմուած է, իսկ ընդհակառակն վերջինը՝ (այսինքն ծծող բերանը) զանազան ձեւով կազմուած կնճիթ մըն է:

4. Աչքը՝ տեսողութեան գործարանն է, եւ կենդանին կարող կ'ըլլայ լուսոյ միջնորդութեամբ արտաքին իրերը տեսնել: Մեծամեծ անասնոց աչքի գնդակին վրայ կը տեսնուի դրսանց շատ գիւրաւ՝ առաջըսուածը, այլեւայլ գունով Թիաթանը, որուն մէջ տեղն է՝ բոլորակ կամ

երկայնաձեւ սեւ Բէժը: Աչքի գնդակն առջեւի կողմանէ թափանցիկ մաշկով (որ Եղջերեայ կ'ըսուի) պատած է, ասոր տակը բոլորակաձեւ գոյնզգոյն (կապոյտ, մոխրագոյն, գորշ կամ սեւ) մաշկ մը այսինքն Զիւ-Ժանը (Iris) կայ: Այս մաշկն աչքի մէջ աստղի պէս կ'երեւայ մեզի եւ մէջ տեղը ծակ մը (բիւ) ունի, ուսկից լոյսը կ'անցնի, միջոյ մէջ կը լայն-նայ, իսկ պայծառ լուսին՝ կ'ամփոփուի: — Աչքը հասարակօրէն կրկին է, երբեմն բազմապատիկ բաղադրեալ՝ ինչպէս սարդերուն աչքը, իսկ մի միայն աչք՝ որ շատ քիչ կը պատահի, քանի մը խեցգետնի տեսակներն ունին միայն: Քանի մը կենդանիք, որոնք միշտ մութ տեղեր կ'ապրին, կամ ըստ մասին եւ կամ բոլորովին կոյր են (ինչպէս Պլուտոնը եւ ընդերաց որդերը): Իսկ շատ մը միջատներու եւ խաչափառներու բաղադրեալ աչուքները՝ բոլորովին յատուկ կազմութիւն ունին:

5. Ահանջը՝ լսողութեան գործարանն է եւ հնչման ձեռք արտա-քին տպաւորութիւններն (= ազդեցութիւններն) առնելու կը ծառայէ: Ասոր ամենակարեւոր կազմիչ մասունքը՝ գլխուն ներսի կողմն են (իսկ բարձրագոյն կենդանեաց վրայ՝ քունքոսկրին մէջ), արտաքուստ միայն ծակ մը (ականջափողը) կը տեսնուի, եւ որպէս զի հնչումն սաստկանայ երբեմն ասոր բոլորտիքը ականջակնք մը պատած կ'ըլլայ: Ստորին կեն-դանիներէն շատերը կը լսեն, բայց իրենց լսելու գործարանները չենք գիտեր:

6. Քիթը՝ հոտառութեան գործարանն է, լեղոսն ալ ճաշակելու գործարանը. բարակ լորձնոտ մաշկին միջնորդութեամբն՝ որով այս գոր-ծարանները պատած են, հոտ եւ համ ունեցող իրերն իմանալու կը ծառայեն: Բայց շատ կենդանեաց վրայ այս մասունքը՝ հոտառութեան եւ կամ համ առնելու յարմար չեն. իսկ ոմանց ալ՝ իրենց որսը բռնելու կը ծառայէ (այսպէս օր. աղ. փղերուն՝ պատիճի ձեւով երկնցած քիթը, միջնառիւծներու, փայտփորներու երկայն դուրս երկնցող լեզուն եւայլն):

7. Կենդանեաց Իւրանը (Truncus) արտաքուստ շատ պլեւայլ ձեւով է: Ոմանցը՝ գնդակի պէս բոլորակ է (ծովային ողնի, գնդակա-ձուկ), ոմանցը՝ անկիւնաւոր (ծովային աստղներ), ոմանցը՝ տափարակ (կրիաներ, թմբաձուկեր), կամ երկու կողերէն ներս ճնշուած (ինչպէս շատ ձկեր). բայց հասարակօրէն գլանաձեւ կ'ըլլայ, այս ալ երբեմն շատ երկայն (օձեր) կամ շատ նուրբ եւ թելի պէս (ինչպէս քանի մը որ-դերն ունին): Յօդաւոր անասնոց շատերուն մարմինը՝ արտաքուստ խորունկ կտրուածքով երկու գլխաւոր մասանց (կուրծքի եւ փորի) բաժնուած է:

8. Անդամները (artus) մարմնոյն վրայ արտաքին յաւելուածներն են, եւ կէս մը տեղէ տեղ շարժելու, կէս մըն ալ կերակուրն որսալու եւ յափշտակելու կը ծառայեն: Սովորաբար զոյգ զոյգ՝ եւ մարմնոյն երկու

կողմերն հաւասարապէս բաժնուած կ'ըլլան, շատ քիչ անգամ անզոյգ կ'ըլլան եւ կամ բոլորովին կը պակսին: Ասոնց թիւը շատ անհաւասար է. ոմանք 2՝ մեծ մասը 4 կամ 6՝ իսկ ոմանք 8, 10 եւ կամ աւելի անգամ կ'ունենան: Անդամները կը զանազանուին իրերեւ 2էր֊, Որ֊, Թէ֊, Լողարան եւ Բռնող Բաղնի: 2էր֊ին՝ ազատ շարժող մատուցներ ունի, որոնցմէ մէկ հատը (բթամատը) միւսներուն հակառակ դրից մէջ կրնայ մտնել, որով տեսակ մը աքցան կը կազմուի, եւ այս աքցանը բան մը յափշտակելու եւ հաստատուն բռնելու կը ծառայէ եւ մասնաւորապէս ծառի վրայ ելլելու մեծ գիւրուծիւն կու տայ: Որ֊ին՝ ազատ մատուցներ ունի, բայց բթամատը միւս մատերուն հակառակ դրից մէջ չի կրնայ մտնել եւ գլխաւորաբար գետնի վրայ հաստատուն կոթընցընելով՝ միայն քալելու կամ սողալու կը գործածուի, իսկ շատ քիչ անգամ նաեւ ուրիշ նպատակներու (ինչպէս փորելու, մագլելու, իրերեւ զէնք գործածելու եւայլն եւայլն,) կը ծառայէ: Թէ֊ինն այնպիսի անդամներ են, որ կենդանւոյն օդի մէջ շարժիլը կը դիւրացընեն: Հատերուն թեւերը մի միայն տարածուած մաշկէ կազմուած է, իսկ թուշնոց թուշիլը գլխաւորաբար թուշաթեւերէն կախում ունի: Լողարանները ջրոյ մէջ լողալու (թեւահանելու) կը ծառայեն եւ գլխաւորաբար տարածուած լողամորթէ կազմուած են: Վերջապէս Բաղնի կ'անուանուին քանի մը ջրային կենդանեաց անյօգ անդամներն, որոնք այս կենդանեաց գլխուն վրայ կամ բերնին չորս կողմը կը գտնուին, եւ ջրոյ մէջ շարժելու՝ բայց գլխաւորաբար իրենց որսն յափշտակելու կը ծառայեն:

9. Մարին՝ որ արտաբնուած անասնոց մարմինը կը պատէ, զգայնութեան եւ շօշափելեաց գլխաւոր գործարանն է: Հասարակօրէն ծածկուած կ'ըլլայ մորթը՝ զանազան եղջերեայ կամ ոսկորեայ նիւթերով (ինչպէս մազով, փետուրով, թեփով կամ վահանակով), իսկ երբեմն՝ բոլորովին լերկ կ'ըլլայ: Մազը՝ սնամէջ, թելակերպ նիւթ մըն է, որուն արմատը սոխի կը նմանի եւ մորթին մէջ մտած կ'ըլլայ: Երբեմն շատ մը մազեր միացած կ'աճին, եւ այն ատեն հաստ եւ կարծր խողան կամ միւնչեւ փող կ'ըլլան, եւ անասուններէն ոմանք ասոնցմով ծածկուած են: Փեփփեղէն հասարակօրէն գեղեցիկ ձիւղաւորեալ նիւթեր են, որոնք երբեմն շատ գեղեցիկ գոյներով կը փողփողան, նոյնպէս ասոնք ալ եղջերեայ նիւթէ կազմուած են: Ասոնց կազմիչ մասունքն են, նախ՝ փող, մորթին մէջ մտած մասը, եւ երկրորդ՝ Դրօշ. դարձեալ փետուրները շատ զանազան ձեւեր կ'ունենան: Թէփէրը շատ մը անասնոց մորթին վրայ տարածուած տափակ եղջերեայ մասնիկներ են: Վերջապէս Վահանակ ըստաճները՝ քանի մը անասնոց մորթին մէջ մտած մեծ կամ փոքր ոսկրի կտորներ են, որոնք երբեմն իրարու կցուած կ'ըլլան եւ անթափանցելի զրահ կը կազմեն: Եղջերեայ թեփերն ալ՝ Վահանակ կ'ըսուին:

Բ. Անասնոց մարմնոյն ներքին կազմութիւնը:

10. Կենդանեաց ամենակարեւոր գործարաններն՝ իրենց մարմնոյն մէջ կը գտնուին, եւ արտաքին ձեւին ու ապրելու եղանակին հետ անձուկ կապ ունին: Կենդանեաց ներքին գործարաններով հետեւեալ գործողութիւններն յառաջ կու գան. Զգայո՞ւմ, Շարժո՞ւմ, Սնո՞ւիչ եւ Աճո՞ւմ:

11. Զգայողութեան գործարաններն են ջղերը: Արտաքոյ կարգի բարակ, ճերմակ դերձանի կը նմանին եւ մարմնոյն ամէն կողմը կը պատին. բարձրագոյն կենդանեաց վըայ ասոնք ըղեղնն եւ անոր երկնցած մասին՝ այսինքն ամբողջակի երկայնութեամբը տարածուած ծուծին մէջ՝ (Ողնաշո՞ւք) իրարու հետ կը միանան: Ջղերու ձեռքովն է, որ կենդանիք՝ զգայարանաց վըայ եղած արտաքին ազդեցութիւնն անմիջապէս կ'իմանան, եւ այս հինգ կերպով յառաջ կու գայ. այսինքն տեսողութեամբ, լսողութեամբ, հոտառութեամբ, ճաշակելեօք եւ զգացմամբ: Այս հինգ զգայարանքներէն իւրաքանչիւրն իւր որոշ գործարանն ունի:

12. Կենդանեաց մարմնոյն՝ եւ անոր ազանձին առանձին մասանց շարժո՞ւմը Մկանո՞ւնի ըստածներով կ'ըլլայ, եւ այս մկանունքը բարձրագոյն կենդանեաց մէջ՝ ոսկրներուն վըայ կ'ապած կ'ըլլան: Մկանունքը կենդանեաց միսն է, եւ անոր համար մօտն ալ կ'անուանուին: Ասոնք բարակ զուգահեռական, հաւասարաչափ թելեր են, ջղերու ազդեցութեամբը կ'ամփոփուին, եւ ասով զանազան կամաւոր կամ՝ ակամայ շարժումներ յառաջ կը բերեն:

13. Բարձրագոյն կենդանեաց մարմնոյն մէջ կայ՝ հոոօրօրո՞ւն ոսկորեայ կազմա՞մը, որ Իմօրթ կ'անուանուի, կէս մը ամբողջ մարմնոյն՝ կէս մըն ալ քանի մը գործարաններուն, նեցուկ ըլլալու կը ծառայէ: Ամբողջ մարմնոյն նման՝ կմախքն ալ էրէ՞ք մասի կը բաժնուի, որոնք են գլուխ, բուն (Իրան) եւ անդամ:

14. Գլե՞ր ոսկրներն ըստ մասին մեծ, ամէն կողմանէ գոցուած խոռոչ մը (գանգի խոռոչը) կը կազմեն, որուն մէջ կայ ըղեղն: Այս ոսկրները Գանգո՞րթ կ'անուանուին, իսկ այս ոսկրներէ կազմուած գլխուն թէ՛ վերի եւ թէ՛ վարի կողմն ալ, Գանգ կը կոչուի: Գլխուն միւս ոսկրները՝ գլխուն առջեւի եւ ետեւի կողման վըայ են, եւ կը կազմեն Երէ՞ր կամ Դե՞մք: Այս երէթի ոսկրներէն (գիմոսկր) ամենակարեւորներն են երկու կղակները (կամ ծամելիքները), ասոնք մահիկի ձեւով ոսկրներ են, որոնք շատ անգամ ակռաներ ալ կուենան, բայց սովորաբար միայն վարի-կզակն ազատ կը շարժի:

15. Բո՞ւնը կամ Իրանը կը պարունակէ Ողնայա՞րի ոսկրներն, եւ ասոնց կցուած զանազան ոսկրներ ալ, որոնք բունն եւ անդամներն իրա-

րու հետ կը կապեն: Նոյն իսկ Ողնայարն կամ Ողնաշարը շատ մը առանձին օղակաձև ոսկրներէ (Ողն[օղ]երէ) կազմուած է, ասոնք այնպէս մը շարուած են իրարու վրայ, որ մէջտեղը միշտ ծակ կը մնայ, եւ ողնաթոռ-թի խողովակ կ'ըսուի, եւ ողնածուծն ասոր մէջ կ'ըլլայ: Իրենց գտնուած դիրքին նայելով օղակները կը բաժնուին՝ վզի, կուրծքի, բարձի, կոնքի եւ տոնոյ օղակներ: — Կուրծքի օղակներուն վրայ երկու կողմանէ բարակ, նեղ, կիսաբոլոր ոսկրներ կցուած են, որոնք հոլ կամ պոստալ կ'ըսուին, եւ դէպ ի առջեւի կողմն տափակ ոսկրի մը վրայ՝ որ Երթոսկը կամ Տախտակ կ'ըսուի, իրարու հետ միացած են: — Առջեւի անդամներն եւ բունը կցուած են իրարու լիկոն-տով (կամ ոստով), իսկ ետեւի անդամներն եւ բունը կցուած են՝ Կոնտով: Թիկոնտով կազմուած է կոնտակի վրայ եղած տափակ, երեք-անկիւնի ոսկրով մը (ոստակով), իսկ այն ամէն անասնոց թիկոնտով որոնց առջեւի անդամները չէ թէ միայն քալելու, այլ նաեւ փորելու, մագլելու, թռչելու եւ լողալու կը գործածուին, բարակ եւ տպագիր օ ի ձեւով ծուած ոսկրէ մը կազմուած է, որ անոսկ կ'ըսուի: Կոնտով կազմուած է շատ մը տափակ, լայն, ճուղած ոսկրներէ. կոնքի օղակներով այս ոսկրներն իրարու հետ միանալով մէկ ոսկր կը կազմեն եւ այս ոսկրը կը կոչուի Երթոսկ, թէ դէպ ի վար եւ թէ դէպ ի ետեւը վերջին մասն են:

16. Անդամոց ոսկրները խողովակաձև են, եւ շատ մը խաղալիքներով իրարու հետ միացած յօդուածներ կը կազմեն: Վերէն սկսեալ դէպ ի վար թեւի վրայ եղած յօդուածներն ասոնք են, Բապոն կամ Տիգտ, Ծղէտ, Դաստակ, Ափ կամ Ափոս եւ Մաստոններ. իսկ սրունքներուն ոսկրներն են՝ Զեպո կամ Բաք կամ Աղդը, Ատեպ, Որնարմապ, Որնարմը եւ Մաստոններ: Դարձեալ մատուրներն ալ երեք յօդուածներէ կազմուած են, ի բաց առեալ բթամատը, որ երկու յօդուած ունի: Տիգն ու ազդը միայն մէկ ոսկր ունին, իսկ ծղիքն ու աքեացը՝ երկու ոսկր: Ծղիքը (վարի բազուկը) կազմուած է Ծղոսկը եւ Ծանանկոսկը ըսուածներէ. իսկ վերջինը (աքեացը)՝ ոլո կամ Խոստոնցտ եւ Խուլակոնտ ըսուած ոսկրներէ: Բազկին եւ ծղիքին մէջ եղած խաղալիքը՝ Արմա կ'անուանուի, իսկ ազդեր եւ աքեացի մէջ եղածը՝ Գոն կամ Թոնի: Ծնկան վրայ դարձեալ բոլորակ ոսկր մը կայ, որ Խողովակ կ'անուանուի: Դաստակը՝ 8, իսկ ոտնարմատը՝ 7 մանր ոսկրներ ունի, որոնք երկու կարգ շարուած են: Ափը եւ ոտնամէջն իրենց ունեցած մատուրներուն չափ, մէկ կարգի մէջ շարուած ոսկրներ ունին:

17. Անասնոց անանիլը՝ կերակուր կամ սնունդ առնելով կ'ըլլայ: Այս սնունդը յատուկ գործարանի ձեռք կը փոխուի եւ կենաց պահանջներէ կը գործածուի: Այս կ'ըլլայ մարսողութեան, արեան լիւծանի եւ շնչառութեան գործարաններով:

18. Տնկական կամ կենդանական նիւթերէ առնուած սնունդը մարտոյդ-լեւան Գործարանին ձեռքը՝ կը փոխուի, եւ կենաց պահպանութեան համար գործածելի սնուցիչ հիւթն ասոնցմէ կը բաժնուի եւ մասնաւոր հեղուկի կը փոխարկի (անոյցիւ հիւթ կամ մամալ)։ Մարտողութեան գործարանը՝ Բէրնէն կը սկսի, կերակուրը՝ որչորէն (եւ արո-գէն) անցնելով քսակաձեւ պարկը՝ Սթամբուլ կ'երթայ, եւ հոս փոխուելէն ետքը երկայն աղէք կամ ընդերքէ կ'իջնայ։ Աղեաց մէջ լճափայտ կամ Ժծակ անուամբ մասնաւոր անօթներ կան, սնուցիչ հիւթը կը ծծեն. իսկ սննդեան անգործածական մասուկը մարմնէն դուրս կ'երևն։

19. Ծծուած մամալը՝ արեան անօթներու մէջ կ'երթայ, հոն արեան հետ կը խառնուի, եւ արեան հետ միացեալ՝ սիրտը կ'երթայ։ Սիրտն առանց մկանուկի պարկ մըն է, եւ միջնորմով 4 խորշերու բաժնուած է, որոնք փոփոխակի կ'ամփոփուին եւ կը տարածուին։ Մամալին հետ խառնուած մութ (երակային) արիւնն ասկէ դուրս կ'երլէ եւ շնչառութեան գործարանները կ'երթայ, եւ հոս օդին ազդեցութեամբը տեսակ մը փոփոխութիւն կրելով՝ իրրեւ մաքուր լրծակարմիր (փողերային) արիւն, սիրտը ետ կը դառնայ, ասկէ ալ մասնաւոր խողովակաձեւ արեան անօթներու միջնորդութեամբ՝ որոնք շնչափայտ կամ զար-լիքափայտ կ'անուանուին, մարմնոյն ամէն կողմը կը տարածուի։ Այս կերպով արիւնն ամէն գործարաններ կ'երթայ, ասոնց աճման կամ սնանելուն կարեւոր եղածը հոն կը թողու, եւ հոս եղած պլեւալլա աւելորդ եւ զտուած նիւթերը կ'առնու եւ նորէն աղիքներէն ծծած հիւթերուն հետ խառնուելով՝ Արեան Երակներո- ձեռք սիրտը կը դառնայ։ Որովհետեւ արիւնը սրտէն ամբողջ մարմնոյն մասանցը՝ ասոնցմէ ալ դարձեալ սիրտը կը դառնայ եւ տեսակ մը շրջան ընելով կը հոսէ, անոր համար այս շարժումը՝ արեան շրջան կ'ըսուի, եւ ասոր գործակից գործարաններն ալ (սիրտ, շնչերակ եւ արիւններակ) շրջանի Գործարաններ կ'ըսուին։

20. Շնչառ-լեւան Գործարաններն՝ որոնք կենաց պահպանութեան համար անյարմար մութ (երակային) արիւնը՝ օդին ազդեցութեամբը լրծակարմիր կը փոխեն, բարձրագոյն կենդանեաց վրայ այնպէս կազմուած են, որ կամ միայն ջրոյ եւ կամ միայն օդի մէջ շունչ կրնան առնուլ։ Բարձրագոյն կենդանեաց՝ օդի մէջ շունչ առնելու ծառայող գործարանները թոք կ'անուանուին, իրանին ներքսակողմը սրտին երկու կողմերն են, եւ շնչառութեան համար մի միայն խողովակով (շնչափողով)՝ օդի հետ հաղորդակցութիւն ունին։ — Բարձրագոյն կենդանեաց՝ ջրոյ մէջ շունչ առնելու ծառայող գործարանները խոփի կ'ըսուին, այնպիսի դրից մէջ են, որ միշտ օդով լի ջուրը զստնը կ'ողողէ

(կը թրջէ): — Միջատներու շնչառութիւնը մասնաւոր յատուկ եղանակաւ կ'ըլլայ, վասն զի շնչառութեան յատուկ խողովակներով (= շնչառութեան կամ շնչահան) շունչ կ'առնուն, այս խողովակները մարմնոյ օղակներուն երկու կողմը մանր ծակեր ունին եւ ամբողջ մարմնոյն մէջ կը ճիւղաւորուին ու կը տարածուին:

21. Անասնոց մեծագոյն մասին աճումը՝ յուելով կամ հասնելով կ'ըլլայ, իսկ կենդանի ձագ բերելով աճողները շատ քիչ են: Ոմանց հաւկիթները՝ կարծրակեղեւ են (ինչպէս թռչնոց հաւկիթները), ոմանցը՝ կակուղ (ինչպէս՝ երկակենցաղներուն ձուերը), եւ շատ անգամ շատ մանր (ինչպէս շատ մը ձկներու եւ միջատներու ձուերը): Թռչնոց կարծրակեղեւ հաւկիթները՝ նոյն կենդանեաց մարմնոյն ջերմութեամբը կը թխսին: Իսկ բոլոր ուրիշ ձու ածող կենդանեաց ձագերը՝ արեգական ջերմութեան կենդանացուցիչ ազդեցութեամբը կ'ելլեն: Ստուգիւ զարմանալի է այն հոգն ու խնամքը՝ որով կենդանիք իրենց ձագերուն պահպանութիւնը կը խնամեն. դարձեալ զարմանալի է բնութեան այն սքանչելիքը՝ որ ամէնէն աւելի վտանգեալ կենդանիներն ամէնէն առատ կը բազմանան:

Անասնոց սերնդուն, օգոսկարութեան և վնասակարութեան, զսնոնք որսալու և պահելու վրայ քունի մը խօսք:

(Ընթերցողածոյ մաս:)

Երկէր, օր եւ Ընդ Հաւասարդէս զանազան դէպքով առանց բնական
 ինչ եւ: Ցամաք երկիրը բնակարան է շատ մը անասնոց, որոնք իրենց
 մեծութեամբ, ձեւովն ու ապրելու եղանակաւ մեր մտադրութիւնը
 կը գողեն. Բայց աւելի բազմաթիւ են այն անասնանքի փոքրիկ
 կենդանիներն, որոնք ծածկուած ըլլալով՝ թէ մասնաւոր մտա-
 դրութիւն չընենք շատ դիւրաւ անտես կ'ըլլան: Օգի մէջ կը խաղան
 գեղեցիկ գոյնզգոյն թռչնոց երամներ, եւ միջատներու անթիւ ու ան-
 Համար խմբեր: Բայց ամենէն աւելի բազմաթիւ են ծովական անասուն-
 ները: Զույ մէջ կը գտնուին անասնոց արտաքոյ կարգի ձեւերը, թէ
 մեծ եւ թէ փոքր, եւ այն ալ՝ այնչափ բազմութեամբ, որ չեն կրնար
 համարուիլ, եւ ցամաքի կենդանեաց թիւը շատ կը գերազանցեն:

Ահա երկէր իւր սեղանիս առանձնելն ունի: Որչափ տարբեր են տաք
 դաւառներու անասունները ցուրտ երկիրներու անասուններէն: Ստոյգ
 է ամենքն ալ՝ փղերու, ռնգեղջիւրներու, ուղտերու, ընձուղտներու,
 առիւծներու, վագրներու, Զայլամներու, կոկորդիլոսներու եւ վիշապա-
 ձկներու վրայ շատ բան լրած են, եւ կամ գտնեայ տաք դօտիններու նշա-
 նաւոր անասունները նկարուած տեսած են. ո՞վ կարողացած չէ, թէ
 քնչպէս հոն անտառները՝ արագաշարժ կապիկներու տեսակներով, եւ
 կարկաշտ գոյնզգոյն պապկաներու խմբերովը լեցուած են, մինչ ան-
 դին ամենափեղեցիկ եւ ամենամանր թռչունները, մեղրածուծները
 կամ տրոքիղոսները, պատուական քարերու պէս արեւուն պայծառու-
 թեամբն օդի մէջ կը շողան, եւ շքեղազարդ մեծամեծ թիթեռներ՝
 հազարաւոր բազմափայլ միջատներու հետ մէկտեղ այն տեղերը կը
 ծփան: Բայց ծանօթ է միանգամայն թէ նոյն երկիրները շատ մը գի-
 շատիչ եւ թունաւոր կենդանիներ կան, եւ թէ շատ անգամ նոյն իսկ
 մանր կենդանիներ ալ շարաշար նեղութիւն կը պատճառեն: — Ընդ
 հակառակն երկրիս ցուրտ օդաբաժիններու մէջ, ո՞չ այնչափ բազմա-
 տեսակ եւ ո՞չ ալ այնչափ նշանաւոր անասուններ կան, սակայն հոս ալ
 շատ մը յատուկ կենդանիներ կը գտնուին. զոր օր. յարգի մուշտա-
 կաւոր անասուններ, ինչպէս սամոյր եւ կնգոււմ, վարդեղներ կամ արա-
 դոտն եղջերուներ, սպիտակ արջեր, փոկեր, կէտեր եւայլն եւայլն:

Մէկ կողմանէ կենդանիներու ամբաւ զանազանութիւնը՝ զանոնք
 ճշդիւ ճանչնալու յօժարութիւնը կը գրգռէ, մէկալ կողմանէ ալ, նոյն
 իսկ հին ատեններն ալ մարդուն մտադրութիւնն իրենց գրաւած էին,
 մէյ մը իրենց արգասիք իւրիւր զգալու օգուտը, եւ երկրորդ՝ թէ մար-
 դուն եւ թէ իւր ստացուածքին տուած զանազան ու լաւութիւն:

Հին ատեններէ սկսեալ մարդիկ ընտանեցուցած են անասուններէն
 քանի մը հատը, որոնք թէ գործածական են, թէ դիւրաւ կը պա-
 հուին, թէ շատ կը բազմանան եւ թէ մարդուս յարում մ'ունին, եւ
 ըստին առանձն անունը առած են: Ասոնցմէ շատերն իրենց զօրու-
 թեամբը՝ հեծնալու, բեւ կրելու, կառք քաշելու, եւ ուրիշ շատ բա-

ներու կը ծառայեն. քանի մը հատը՝ որսի, մարդուս կեանքն ու ստացուածքը պահպանելու ու պաշտպանելու, շատերը՝ փաստակար անասունները ջնջելու, ոմանք ալ զուարճութեան ու զբօսանքի համար են: Հատերը նոյն իսկ կենդանութեան ատեն օգտակար նիւթեր կը մատակարարեն, ինչպէս, կաթ, ձու, մսմ, մեղր, բուրդ, փետուր եւ այլն, բայց մեծ մասը իրենց մահուինէ ետքը կը դարձածուին: Առանձին կերպով կերակրեղինաց եւ զգեստեղինաց մեծագոյն մասն իրենք կը մատակարարեն: Ընտանի անասուններէն զատ՝ շատ մ'ուրիշ օգտակար անասուններ կան, ինչպէս՝ երէներու զանազան տեսակներ, բազմաթիւ ուտելի ձկեր, խեցիներ ու խեցեմորթներ եւ այլն. դարձեալ այն անասունները, որոնք մասնաւոր պիտանացու նիւթ մը կը մատակարարեն, կամ փաստակար կենդանիները կը ջնջեն կը սպառեն: — Ասիկէ կը տեսնուի թէ անասուններն՝ իրեւ անասնաբուծութեան, որսի եւ ձկնորսութեան նիւթեր, ինչ նշանակութիւն ունին մարդկային տընտեսութեան համար: Այլեւայլ ազգերու համար անասնոց քանի մը տեսակներն՝ անհրաժեշտ կարեւոր են, զօր. Լապլանտացոց՝ վարդեղը կամ արագոտն եղջերուն, Գրէօնլանդացոց՝ փոկը, Արարացոց՝ ուղտը:

Որչափ ալ անասուններէն շատերը մարդուս պիտանացու եւ օգտակար են, նոյնչափ ալ ոմանք ձեռակար: Ամենէն աւելի գիշատիչ գաղաններն իրենց ուժգնութեամբ, եւ թունաւորներն՝ իրենց փաստակարութեամբ մարդուս թշնամիներն են: Ասոր համար ամէն տեղ զատիկ սպառելու եւ բնաջինջ ընելու կռիւ մը կայ, եւ արդէն բազմամարդ ու շէն տեղեր բնաջինջ եղած են կամ շատ ցանցաւ կը գրանուին: Բայց սովորաբար մի եւ նոյն յաջող ելքը չունի մարդուս՝ քանի մը մանր կենդանեաց դէմ ըրած պատերազմը. ասոնք շատ անգամ իւր կերակրոյ մթերքներուն կամ ուրիշ ստացուածոցը վրայ կը յարձակին ու կ'ապականեն, նաեւ բնակարանները կու գան կը մտնեն, եւ նաեւ երբեմն զարհուրելի հարուած կ'ըլլան, թէ մարդուն եւ թէ ընտանի անասնոց: Որպէս զի մարդ ինք զինքն այս անշուն՝ բայց շատ վտանգաւոր կենդանեաց ահագին բազմութենէն պաշտպանէ, շատ անգամ անոնց ապրելու եղանակը ճշգիւ գիտնալը միայն բաւական է, որովհետեւ միայն ասով կրնանք ջնջել: Եթէ մտածենք, թէ այս կերպ կենդանիները բոլոր արմտեաց մթերանոցներ, հօտերու անդեաներ, ընդարձակ անտառներ, նաեւ երբեմն երկրի մը բոլոր բոյսերը կրնան ապականել ու ոչնչացընել, շուտով կը համոզուինք, թէ ինչպէս կարեւոր է, գլխաւորաբար աս անասնիկներուն ամենաճիշդ կերպով մտադիր ըլլալ:

Ամենէն աւելի լուրջ ծանցողն անասուններն, եթէ մեկը առիւն ունենայ շնորհ ինքնալի գիտել: Այս առիթը՝ ըստ բաւականի կ'ունենայ՝ մտադիր ուսումնաւոր բնաջինի պատանեակ մը: Այսպիսի պատանի մը իւր մտադրութիւնը կ'ուղղէ նախ եւ յառաջ այն անասնոց վրայ, որոնք կամ օգտի եւ կամ զուարճութեան համար կը պահուին: Քիչ ատենէն ընտանի անասնոց, տեսակ տեսակ երգեցիկ թռչնոց, նաեւ քանի մը մտադրամտի անասնոց արտաբերի տեսքն ու ապրելու կերպը ճշգիւ կը ծանչնայ: Մասնաւոր մտադրութիւն կ'ընէ զանազան անասնոց վրայ, որոնք կամ կերակրոյ եւ կամ ուրիշ վախճաններու կը ծառայեն, եւ որսորդութեան կամ ձկնորսութեան նիւթ են, եւ սիրով այն տեղերը

կ'երթայ, ուր ասանկ կենդանեաց տեսակներու մեծ բազմութիւն կը բնակուի: Գառազեղներու, արգելոցներու (Ménagerie) մէջ՝ թէ՛ տեղացի եւ թէ՛ օտարերկրեայ նշանաւոր կենդանիները՝ կենդանի տեսնելու յարմար առիթը շատ դիւրաւ զանց չ'առնուր: Բայց եւանդնոտ բնազդին պատանայ մը մտադրութիւնը միայն մեծ ու նշանաւոր անասնոց վրայ չի մնար:

Ըստ մը կը տեսնէ թէ մանր կենդանիներն ո՛չ թէ միայն բազմութիւն, այլ նաեւ ամենէն աւելի մտադրութեան արժանի են: Ուստի ամէն անգամ զբօսանքի ելած ատեն զատուց կ'որոտայ, եւ շատ սիրով երկայն տարբեր ապրելու կերպերուն մտադիր կ'ըլլայ, եւ շատ սիրով երկայն ատեն զատուց կենդանի եղած ատեն կը դիտէ: Եւ այս գործողութիւնն աւելի կանոնաւոր եւ յարմար կերպով ընելու համար, շատ լաւ կ'ըլլայ եթէ քանի մը հասն ողջ սղջ տուն բերէ եւ սնուցանէ: Այս կերպով դիւրութեամբ կ'ունենայ փոքրիկ արգելոց (Ménagerie) մը, որ շատ քիչ տեղ կը բռնէ, քիչ ծախք կը պատճառէ եւ շատ զուարճութիւն ու տեղեկութիւններ կը մատակարարէ:

Ծանօթ է թէ Եւրոպայ շատ տեղեր մասնաւոր պարտէզներ կան՝ ուսանողաց դիւրութեան համար. այս կողմանէ շատ բարեբախտ են եւրոպացի ուսանողները: Բայց արեւելք ուսանող մը շատ աւելի յաճախ առիթ կ'ունենայ թռչնոց, ձկներու եւ ձօններու ահագին բազմութիւն մը տեսնելու. զորոնք բնդհակառակն եւրոպացի ուսանողը շատ անգամ միայն անուամբ կը ճանչնայ եւ կամ նկարին վրայէն: Ուստի եւ ուր որ մեծամեծ ժողովածոյքներ պակսին՝ գեղեցիկ նկարներ ու պատկերներ տեսնել ու դիտելը շատ օգտակար կ'ըլլայ: Բաց ասկից յօժարութիւն ունեցողին համար բնութիւնը բաց կեցած է, եւ ամէն տեղ՝ դիտողութիւններ ընելու եւ սորվելու համար՝ բնութիւնն անսպառ նիւթ կը մատակարարէ:

Կենդանիներն «բաւոյ» եւ «պահու» նկատմամբ հետեւեալ գիտողութեանց միտ դնելու է: Մեծամեծ անասուններ որոշ ու սպաննելը շատ մը դժուարութիւններով կապուած է, եւ ասոնք բուն որոտողութեան կը վերաբերին: Սովորաբար մեծ անասունները հրացանով կը զարնուին եւ կամ փռերով, կափուխներով, վարմերով, ցանցերով եւ ոստղներով (Խոփ, սոսնձապատ ոգորներով) կ'որոտուին: Փոքրիկ կենդանիները մասամբ ձեռքով կ'որոտուին, եւ ըստ մասին մասնաւոր շինուած ցանցերով: Ասոնք բարակ, սովորաբար կանանչ շղաշատեւէ շինուած են, եւ գլխաւորաբար թիթեռներ կամ ուրիշ թեւաւոր միջատներ բռնելու կը գործածուին, երբեմն ալ կտաւէ կը շինուին, եւ այն ատեն ջրային միջատներ բռնելու կը ծառայեն: Գանցերը հասարակօրէն գաւազանի մը ծայրը բեւեռապինդ կը հաստատուին:

Երբեմն թիթեռն ցանցի տեղ՝ տափակ քառակուսի, վրան շղաշատեւ պրկուած՝ տեսակ մը մկրատ կը գործածուի, որ վրայէ վրայ գալու ատեն՝ լաւ մը կը գոցուի: Գանցով կամ մկրատով բռնուած միջատներն (թիթեռներ, ցանցաթեւեր, ճանճեր եւ քանի մը ուղղաթեւեր), անմիջապէս մասնաւոր պատրաստուած ասեղներու կ'անցուին, եւ անոնց կուրծքի օդերը՝ կողբէն ճնշելով կը մեղցուին, եւ տուփի մը մէջ կը դրուին: Պատենութեւնը եւ շատ մ'ուրիշ մանրկէկ ձօններն ամէնէն լաւ կ'ըլլայ, եթէ զինչոյ ոգիով կամ ծծմբոյ թեւերով լեցուած շիշերու կամ ապակիէ խողովակներու մէջ դրուին: Մողեցներ, օձեր, գորտեր, ջրոյ մեծ կենդանիներ եւ այլն եւ այլն, որոշ ուղղով, կրնայ մեծկակ թիթեռէ պէր կամ պարկ մ'ունենայ: Գետոյ ամէն մէկ անասունը պէտք է իրանէ բաժնէ եւ փոքրիկ դարակներու, արկղիկներու եւ կամ տփիկներու, Լյուքսեմբուրգ շիշերու եւ նման ամաններու մէջ պահել: Նոյնը պէտք է ընել, եթէ պզտիկ պզտիկ կենդա-

նիներ (ինչպէս թրթուրներ) ողջ ողջ տուն բերել կ'ուզուի: Մասնաւորապէս յափշտակող կենդանիներ (օրինակի աղագաւ՝ սարդեր, մսկեր բզէզներ եւայլն եւայլն) ողջ ողջ միեւնոյն տեղը պէտք չէ փակել: — Կենդանիներն որտալու ատեն զգուշութիւն ընելու է, որ չըլլայ թէ մարդուն փաս մը հասնի: Մողէզներն ու գորտերը կրնան աներկիւզ նստել ձեռք ալ բռնուիլ. բայց գետնագորտերն ու սալամանտրներն այս կերպով բռնելը՝ աղէկ չէ, վասն զի զգուշիկ հիւթ մը գտնուի կու տան: Օձերն այն ատեն միայն առանց մասնաւոր կազմածներու կը բռնուին, երբ ամենայն ճշգրտութեամբ կրնանք գիտնալ թէ բոլորովին անվնաս են, ապա թէ ոչ՝ փասակար թեթեւամտութիւն կամ տարածամ քաջութիւն է, եւ՝ ինչպէս շատ դժբախտ դէպքեր կը վկայեն, շատերը չարաչար պատժուեցան: Ասկէ զատ պէտք է նսեւ խայթող միջատներէն ալ զգուշանալ: Եթէ ճարտարութեամբ մարմնոյն մէջտեղէն բռնենք, չեն կրնար փնսսել: Եւ թէպէտեւ իրենց խայթուածը ջուր կը պատճառէ, բայց վտանգաւոր չէ, եւ վրան զովացուցիչ նիւթեր դնելով ջուր կը մեղմանայ:

Կենդանիները տուն բերուելէն ետքը, կրնանք կամ ողջ պահել եւ կամ ստակած: Ամենն աւելի պէտք է լաւ հոգալ թիթեռներու թրթուրները մինչեւ իրենց կծկելու ատենը: Ասոր համար պէտք է լաւ միտ դնել թէ թրթուրներն որ տնկին վրայ գտնուեցան, որպէս զի ամէն օր կարենանք նոյն տնկին թարմ մասերովը կերակրել: Թրթուրներն հոգով ու խնամքով եւ համբերութեամբ մեծցնելէն ետքը, մեծ հաճութիւն կը պատճառէ տեսնելը, թէ ինչպէս վերջապէս բոժոժ կը շինեն եւ կը կծկին, եւ գամբարն մը մէջ գտնուելուն պէս հանգիստ կը հանգչին, որպէս որ (շատ անգամ միասնէր անցնելէն ետքը) իրենց համար յարութեան օրը ծագի: Ով որ անգամ մը միայն տեսած է թէ ինչպէս տեղը որդ մը կամաց կամաց գոյնզգոյն թիթեռան կը փոխուի, ստուգիւ բնական պատմութեան ուսման պատասխելու կը վառի ու կը բորբոքի:

Եթէ անասունները ստակելէն ետքն ալ պահել կ'ուզուի, հարկ է մեծ մասը կառաջողներէ պատրաստել: Մեծկակ անասունները սովորաբար մորթազերծ կ'ըլլան, այսինքն մորթը՝ մազերով, փետուրներով կամ թեփերով կը սկրթուի կը հանուի, եւ չորացնելէն եւ սնդկի օճառով բոտ պատշաճի ծեփելէն ետքը կը լեցուի: Հասարակ հաւաքողներու համար ամէնէն աւելի երգեցիկ թռչնոց եւ մանր կենդանեաց՝ ինչպէս սկիւռներու, արխններու, խուրդներու (եւայլն անասնոց) լեցուիլը հարկաւոր է, ինչպէս նաեւ առանձինն մասեր պահելը, զօր. գանգեր, ակաւներ, ոտքեր, եղջիւրներ եւ ձուեր (զորոնք պէտք է նախ եւ յառաջ պարպել ու դարտրկնել): Մողէզներն, օձերն ու ձկներն ալ կրնան լեցուիլ, բայց որովհետեւ իրենց բնական տեսքը կը կորսուի, անոր համար սովորաբար գինւոյ ոգւոյ մէջ կը պահուին: Կապաւորթ կենդանիներ՝ որոնք կրնան խորշոմիլ ու ապականիլ, պահելու գրելաւոր եւ ամէնալաւ միջոցը՝ գինւոյ ոգին է: — Միջատներն՝ հաւասար բարձրութիւն ունեցող, բարակ կամ հաստ բնորոշներն՝ վրայ կը խոթուին, եւ այս ընելու ատեն պէտք է իրենց բողկուկն, բերնի մասուկը, ստուրներն, իսկ թիթեռներուն, ցանցաթեւերուն եւ քանի մ'ուղղաթեւերուն նսեւ թեւերն ալ բոտ պատշաճի տարածելու ջանայ: Թեւերու տարածումը՝ ամէն նէն աւելի լաւ կը յաջողի արեւոյ (տաքածելու գործիք) ըսուած տախտակներու վրայ, որ երկու գլուխակաւան փայտի շերտերէն կը կազմուի: Երկու շերտերուն մէջտեղը միջոց մը կայ, որուն մէջ՝ տարածուած միջատին մարմինը կը հանգչի: Ետքը տարածուած թեւերը թղթէ շերտերով եւ գնդաձեղնեղով փայտեղուն շերտերուն վրայ կը հաստատուին: Միջատը մինչեւ որ բարձրովն շարնայ՝ պրկոցին վրայ թող կը տրուի, անկէ հանուելէն ետքը իւր տարածուած գիւրքին մէջ կը մնայ:

Մեծ ու մանր միջատներու համար ունենալու է մասնաւոր պրկոցներ, որոնք միջատին մարմնոյն ու թեւերուն լայնութեան յարմարին: — Այսպէս պատրաստուած միջատները կը պահուին ձգոցաւոր դարաններու մէջ, որոնց յատարակ սունիով կամ կակուզ փայտով եւ կամ սառ նման կակուզ բանով մը ծածկուած պիտի ըլլայ, որպէս զի գնդաձեղնէր գիւրաւ խոթուին: Այսպիսի ժողովածոյք մը ստեղծ ստեղծ քննելու է որ ծճինքէր չապականի:

Գ Ը Ս Ը Ի Ը Ն Գ Ա Ի Թ Ն Ը Ն Ժ Ի Ը Գ Ի Ի Բ

Իւրաքանչիւր կենդանւոյն վրայ խօսուած ատեն աշակերտը պէտք է հետեւեալ ծրագիրն աչքի առջեւ ունենալ եւ ըստ այսմ սորվիլ իւր դասը. ասով թէ դիւրաւ կը սորվի եւ թէ մշտատեւ կը մնայ միտքը:

1. Մարմինը. Ա. Բեթո-լի-նը.

Բ. Գլուխը. ա. գագաթը.

բ. ճակատը.

գ. աչուրները.

դ. ականջները.

է. քիթը, բերանը, (ցուկը, կնճիթը) ակունքները.

զ. իրանը եւ պոչը.

Դ. Անդամները, (ձիւրանները, մագիլները) եւ քալուածքը.

Ե. Մարմնոյն հոլերը.

Ջ. Գոյնը.

2. Բնակութեան տեղը, ապրելու կերպը.

3. Սնունդը.

4. Օգտակարութիւնը կամ վնասակարութիւնը.

5. Ձագերը, բոյնը (մորին, եւայն).

6. Առանձինն նշանները, մարդուս նկատմամբ ունեցած յարաբերութիւնը (ընտանիք է, կ'ընտանենայ...).

7. Թշնամիները, որսորդութիւնը եւայն եւայն:

Օգնական տետր:

Անասնոց մասնական տեսակներուն ստորագրութիւնը սորված ատեն, աշակերտք պիտի ունենան գծագրութեան տետրակ մը, որուն մէջ պիտի գծագրեն գունաւոր մատիտով կամ գոյներով՝ իրենց դասագրքին մէջ եղած այն ամէն կենդանիներն, որ սորվելու համար որոշուած են: Մարմնոյն իւրաքանչիւր մասին ինչ գոյն ունենալը կը գտնեն իրենց դասագրքին մէջ:

Ուրիշ երրորդական եւ չորրորդական դիւրացուցիչ միջոցներն ուսուցչին խոհեմութեան եւ գիտութեան կը յանձնուի: Յամբնայն դէպք աշակերտներն հաւասարաթոյսերը կազմելու են:



ԱՆՆԱՄՆՈՑ ՏԵՍԱԿԱՑ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

ՏԻՊԱՐ 1. ՈՂՆԱՅԱՐԱԴՈՐՆԵՐ (Vertebrata)

Կենդանաբանութեան առաջին տիպարին տակ դացող կենդանիներն հաստատուն ոսկրեայ կմախք մ'ունին, եւ ամենակատարեալ անասուններն են. 5 դասի կը բաժնուին:

ԴԱՍ Ա. ԿԱԹՆԱՏՈՒ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ (Mammalia)

Առաջին դասը կը կազմեն կաթնատուները: Մինչեւ հիմայ 2500 տեսակ գտնուած է ասոնցմէ. 13 կարգերու կը բաժնուին:

Կ Ա Ր Գ 1. Կ Ա Պ Ի Կ Ն Ե Ր (Simiae)

Կապիկները կաթնատու կենդանեաց առաջին կարգը կը կացուցանեն, 4 ձեռք ունին, թէպէտ ետեւի անդամներուն վըայ կոճեր ունին, բայց շիտակ չեն կրնար քալել: Իբե՛ + գլխաւոր ցեղերու կը բաժնուին:

ՑԵՂ Ա. ՆՐԱՐԻԹԻ ԿԱՊԻԿՆԵՐ (Catarrhinida)

Նրբաւոր կապիկներն՝ որ հին աշխարհի կապիկներ ալ կ'անուանուին, քթի նեղ միջնորմ մ'ունին, եւ անոր համար քթափողերն իրարու շատ մօտ են: Ասոնց ատամնաշարը կը կազմուի $\frac{4}{4} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{5}{5}$ ակռաներէ. ականջները՝ լերկ են, իսկ մատանց ծայրը տափակ եղունգ ունին. ըստ մասին պոչաւոր, եւ ըստ մասին առանց պոչի են, բայց երբեք կեռ կամ փաթթելու պոչ չունին, գալարատուտն չեն: Ոմանք այտի պարկեր ունին եւ յետոյքի վըայ՝ փապարներ:



Պտկ. 25. Նրբա-
թի գլուխ:

Հասարակ ծովա-
կուղ կամ մա-
կակոյ (Macacus
cynomologus).

1. Օրանգ-Ուտան կամ Այծամարդ կապիկ (Pithecus Satyrus): Բոլոր կապիկներու մէջէն՝ մարդու նմանութիւն ունեցողն է, բայց որչափ հասակն առնու, նոյնչափ այս նմանութիւնն ալ կ'անհետանայ, ի մասնաւորի տափակ քթին, կըր ու մերկ ականջները շատ կը նմանին մարդու քթին ու ականջին: Կզակը դուրս ցցուած եւ թանձր ու հաստ

շրթունքներ ունի. 1 մ. 30 հրժ. բարձր է, մարմինը երկայն ու խարտեաշ մազերով ծածկուած: Առջեւի ձեռուները շատ երկայն են, եւ գրեթէ մինչեւ. դարչապարները կը հասնին: Ետեւի ոտուներու վրայ ալ շարժական ըթամատ մ'ունի, որուն՝ ուղած ատեն միւս մատերուն հակադիր



Պտկ. 26. Օրանգ - Ուտան (քնական մեծութեան 1/6ը):

ուղղութիւն մը կու տայ: Դէմքն ու ձեռուները լերկ են: Չեռաց մատուներն առանձին շարժել չի կրնար, եղունգները տափակ են: Պոչ չունի:

Խաղաղասէր կապիկ մըն է, Բոռնէո կղզոյն ծառախիտ անտառներն առանձին կ'ապրի եւ տեսակ մը բոյն կը շինէ խուռներէ ու ծիւղերէ: Աս կապիկը դանդաղաշարժ եւ զգուշաւոր է, միայն հարկաւորութեան տանն՝ իւր երկայն բազուկներովն ու սուր խածուածքովն ինք զինքը

կը պաշտպանէ. կերակուրն է ծառերու բողբոջ, տերեւ եւ թռչնոց հաւ-
կիթ: Գեանի վրայ շատ դանդաղ կը շարժի, վառն զի միշտ իւր ձեռքին
վրայ կը կռթնի, իսկ ընդհակառակն ծառի վրայ շատ արագաշարժ է:
Օրանգ-Ուտանի շատ նման են Հնդկաստանի կղզեաց Գիբբոնները կամ
Երկն-Քաղ-Կապիները (Gibbon, Hylobates Lar), բայց անկէ շատ
պզտիկ են: Վերոյիշեալ կապիկներուն պէս ասոնք ալ ոչ պոչ ունին
եւ ոչ ալ այտի պարկ:



Պտկ. 27. Գորիլլա (Բ. մ. Դը):

2. Գորիլլան (Troglodytes Gorilla) բոլոր կապիկներու մէջէն ամե-
նամեծն եւ ամենազորաւորն է: Գլուխը շատ մեծ ու ծանր է, ուստի եւ
այս ծանրութեան համեմատութեամբ հաստ վիզ մ'ունի, որուն օ-
ղերն զորաւոր յաւելուածներ ունին: Գորիլլային աչքերու իրարմէ հե-

ռաւորութիւնը շատ քիչ է, ասով գաղանային կերպարանք մ'ունի: 1 մէտր 70՝ մարձը է եւ սեւ մազերով ծածկուած արտաքոյ կարգի զօրաւոր մարմին մ'ունի: Ականջներն իւր գլխուն համեմատութեամբ շատ մանր են: Գագաթին վրայ մազէ սանդղ մ'ունի, զոր կրնայ վեր



Պտկ. 28. Շիմպանս (Ք. մ. 1/3):

տնկել: Գանգը ցած, կերպարանքը դուրս ցցուած եւ քիթը տափակ է: Իւր զարհուրելի ատամնաշարը՝ նշանաւոր է դուրս երկնցած կողմնական մեծ ակռաներով: Առջեւի ձեռուրները մինչեւ ծնկուրները կը հասնին, եւ թէ՛ ասոնք եւ թէ՛ ետեւի ոտուրները զօրաւոր եւ մեծ մատուրներ ունին:

Գորիլլան՝ Գուինեայի Գաբոն գետին քովը կ'ապրի (Ափրիկէյի արեւ-մտեան եզերքը): Հիներուն ծանօթ էր այս կապիկը, իսկ նորագոյն

ժամանակները՝ հազիւ 1846ի յայտնուեցաւ։ Առաջին գտնողներն եղան ամերիկացի Վիլան, Սափաժ եւ մանուսանգ՝ Գիւ Շէլլիւ։ Թանձրախուռն անտառներու մէջ ծառերու վրայ կ'ապրի, եւ նոյն ծառերու պտղովը կը սնանի։ Այնպէս արուաքոյ կարգի գիւրաթեքութիւն մ'ունի եւ դնդերքն այնպէս զօրաւոր են, որ նաեւ ինձերու, առիւծներու եւ փղերու փնասկար կ'ըլլայ եւ շատ անգամ ստուգուած է առիւծին յաղթուիլը։ Ուստի իրաւամբ սեւամորթներն ասկէ շատ կը վախնան եւ անընտել կը համարին։ Որոշ չի գիտցուիր թէ այս կապիկն որչափ կ'ապրի. յամենայն գէպս 80—90 տարիէն աւելի չէ։ Սեւամորթները շատ մը առասպելական չափազանցութիւններ կը պատմեն այս նկատմամբ, բայց ապահով տեղեկութիւններ դեռ կը պակսին։ Ասոր կը նմանի Շէֆֆօնը կամ սորֆնակ կոչիլը (Trogodytes niger), բայց քիչ մը փոքր ու տկար է, եւ բազմութեամբ Ափրիկէի արեւմտեան ափունքը անտառներու մէջ ընկերաբար կ'ապրի, եւ ծառերու վրայ՝ կտրուած ճիւղերով ու ստերով բոյն կը շինէ։ Գորիլլային պէս կատաղի ու վայրաք չէ. պղտիկութեան ատենը գիւրաւ կը զգօնանայ, եւ շատ անգամ ողջ ողջ Եւրոպա կը բերուի։

3. Հասարակ կամ Տաճկական կապիկը (Macacus Inuus ecaudatus)՝ 0.70 հրժ. բարձր, եւ մոխրագոյն դեղին մագերով պոչաւ կապիկ մըն է։ Այտի պարկեր, կլորեկ գլուխ, եւ տժգոյն կերպարանք մ'ունի։



Պտկ. 29. Հասարակ կապիկ (1/4):

Հիւսիսային Ափրիկէ, ինչպէս նաեւ Գիբրալտարի ապառաժներու վրայ կը գտնուի։ Սեպաձեւ եւ ժայռուտ զառիվայրերու վրայ կը բնակի, եւ պասուղներով եւ քարերու տակ գտած որդերով ու միջատներով կ'ապրի։ Պղտիկութեան ատենը շատ հապիտ ու խեղկատակ է, իսկ ընդհակառակն ծերութեան ատենը՝ ուրիշ բոլոր կապիկներու պէս, չարամիտ ու խածատող է։ Ծանօթ է իւր ամէն բան նմանցընելու

բաղձանքը, խաբէութիւններն եւ գողնալու ունեցած հակումը, ինչպէս նաեւ իւր ձագերուն ունեցած չափազանց սէրը: Բարկութեան առեն ակռաներովը կը կափկափէ եւ սպառնական շարժումներ ու ձեւեր կ'ընէ: Գերութեան առենը պտուղներով, բանջարեղէններով եւ միջատներով կը կերակրի:

Ափրիկէի լեւանց ու քարաժայռերու վրայ կ'ապրին նաեւ ահռելի ու գարշելի Շնչ-դէմերը: Մեծամեծ այսի քսակներ ունին, եւ մարմնոյն յետսկողմը մերկ՝ գոց կարմիր եւ կապոյտ գունով կաշիացեալ փապարներ: Ասոնց կը վերաբերի Շնչ-դէմ-ի համադրիտը (*Cynocephalus Hamadryas*). ծայրը շոգ-որ պոչ մ'ունի: Դոյնպէս Անտառ-դէմ-ը կամ շնչ-դէմ-ի մարմնի (*Cynocephalus mormon*), որ ծիրանեգոյն կարմիր քիթ մը՝ երկայն ու մեծ քսակ եւ կարծ պոչ մ'ունի: Շատ իրաւամբ «Անտառագեւ», անունը տրուած է, վասն զի իւր գարշ ու զազիր կերպարանքովը, եւ մանաւանդ կատաղութեամբ սարսափ ազդած է տեղացւոց վրայ:

Ափրիկէի կապիկներու ուրիշ մէկ տեսակն ալ Երեւոյնի իւր-դէմերը կը կայուն ցանեն. ինչպէս Սէնզալի կռն-իւր-դէմ (*Cercopithecus saba-cus*) եւ երկայնամազ իւր-դէմերը (*Colobus*), որոնց փայլուն սեւ, նաեւ երբեմն ճերմակ, ու մետաքսանման մորթը թանկազին մուշտակ կ'ըլլայ, զոր Աբիսինիայի Տիւր-դէմ (*Colobus guereza*) մորթը:



Պտմ. 30. Անտառագեւ (1/2):

ՑԵՂ Բ. ՏՈՓՈՔԻԹ ԿՈՒ ՄԵՐԻԿՈՅԻ ԿՈՊԻԿՆԵՐ (Platyrrhinida)



Պտմ. 31. Տափաքթի գլուխը:

Մօրուածնօթ (*Cebus capucinus*.)

Ի լաջ առնելով, ամէն ալ փոքրամարմին կենդանիներ են: Անտառներու մէջ բազմութեամբ կ'ապրին:

Տափաքթի կապիկներն՝ որ նոր աշխարհի կապիկներ ալ կ'անուանուին, լերկ դէմք, տափակ եղունգ եւ քիթ լայն միջնորմ մը եւ կողմնակի քթափողեր ունին: Ասոնց ատամնաշարը կը կազմուի $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{1}$, $\frac{6}{6}$ ակռաներէ. այսի պարկ կամ նստելու փապար չունին: Ասոնց երկայն պոչը բռնելու կամ փաթթելու յարմար է (գալարատուտն են): Առաջին ցեղի կապիկներէն կը տարբերին ուրեմն նախ՝ իրենց պոչովը. երկրորդ՝ իրենց մեծութեամբը. վասն զի մէկ երկու տեսակներն ի լաջ առնելով, ամէն ալ փոքրամարմին կենդանիներ են: Անտառներու մէջ բազմութեամբ կ'ապրին:

4. Կարճիկ հանկապիկը (*Mycetes seniculus*) 0-60 հրժ. բարձր կ'ըլլայ. խոչափողին վրայ փամփշտի նման ոսկրէ յաւելուածներ ունի,



Պտկ. 32. Կոնչակապիկ ($\frac{1}{12}$):



Պտկ. 33. Լալկան կապիկ ($\frac{1}{10}$):

որոնցմով ձայնը կը զօրանայ, իսկ վիզը՝ շատ հաստ կ'երեւայ: Չեռքն ու ոտքը գրեթէ նոյն հաստութիւնն ունին. երկայն եւ ծայրը լերկ պոչ մ'ունի (հալարադրոսոսն), որ իբրեւ հինգերորդ անդամ՝ կենալու, ասդին անդին երթեւեկելու եւ բռնելու կը ծառայէ: Այտի պարկեր չունի:

Այս կապիկը հարաւային Ամերիկայի նախնական անտառներու ծառերուն վրայ ընկերաբար տեղեւորով ու պտուղներով կ'ապրի: Զարմանալի է նաեւ ռզրաձայն բայց զօրաւոր կոնչիւնը, զոր երբեմն երբեմն կը հանէ, մանաւանդ գիշեր ատեն անտառներու մէջ շատ հեռու կը լսուի: Ասոր կը նմանի Լալկան կապիկը (*Cebus Apella*): Հնդիկներն ասոր միտը կ'ուտեն:

Ասոնցմէ պատիկ, բայց շատ գեղեցիկ են Ամերիկայի Ալեկո-դիէր, որոնք առջեւը՝ թաթեր, իսկ միայն ետեւի կողմը՝ բութ ըզունգներով ձեռուներ ունին. ինչպէս՝ Ալեկո-դիէր (*Midas rosalia*):

ՅԵՂ Գ. ԿՍՈՒԿԱՊԻԿՆԵՐ (*Prosimiida*)

Կապիկներուն շատ մերձաւոր են Կոնչակապիկները (*Prosimii*), Ալեկո-դիէրը, ուստի իրենց սրածայր գլխուն պատճառաւ առած են իրենց անունն ալ: Միայն ետեւի ձեռքերուն ցուցամատը ճիւղան մ'ունի,

իսկ միւսները՝ առ հասարակ կապիկներու պէս տափակ ըղունդ մ'ունին, գիշերական անասուններ են եւ միայն Մադագասկարի եւ Հնդկաստանի կղզեաց վրայ կը բնակին: Ասոնց կը վերաբերին Մ-լէն (Lemur Catta), Յ-լէի կամ Լ-րէ-ը (Stenops tardigradus):

ԳԱՐԳ 2. ԶՂՋԻԿՆԵՐ (Cheiroptera)

Զղջիկները՝ զարմանալի կաթնատու կենդանիներ են, թռչնոյ կը նմանին. թռչելու յարմար առջեւի անդամներ ունին, եւ զգալի կերպով մեծ կ'երեւան, մինչդեռ մարմինը եւ ետեւի ոտուքները պզտիկ են: Ընդհանրապէս Եւրոպայի չղջիկները բոլորովին անփնաս են, իսկ միջատները ջնջելով արտաքոյ կարգի օգտակար. ամբողջ ձմեռը կը պահուրտին եւ քնանալով կ'անցընեն: Իրենց կերածին նայելով 2 ցեղ կը բաժնուին.

ՑԵՂ Ա. ԳՏՂԱԿՆԻ ԶՂՋԻԿՆԵՐ (Carpophaga)

Հան գլխուն նման երկայնաձեւ է ասոնց գլուխը, ակոսները՝ բութ, աչքը՝ միջակ, ցուցամատը՝ կեռ. հին աշխարհի ջերմ գաւառները կը գտնուին. ասոնց գլխաւորներն են.

5. Թե-սոպ-կը կամ Կալնիքը (Pteropus edulis) ամենամեծ չղջիկն է: Արդէն ակոսներու կաղմութենէն կը ծանցուի իւր սնունդը, որ են պտուղներ: Թեւերուն տարածութիւնը 1 մ. 30—60 հրժ. կը հասնի: Գլուխը շան գլխուն կը նմանի, պարզ ականջները լերկ եւ սրածայր, մարմինը՝ թանձր եւ սեւագորշ մազերով ծածկուած է: Պոչ չունենալուն, ետեւի ոտուքներուն մէջտեղի մորթը նեղ է:




Պտկ. 34. Թեւոտուկ (1/4):

Թեւոտուկները Հնդկաստանի մեծ կղզեաց վրայ շատ յաճախութեամբ կը գտնուին. անտառները կ'ապրին, եւ ցերեկը՝ ետեւի ոտուքներով գլխի վայր կը կախուին ծառերու ճիւղերէն: Իսկ գիշերը հարկաւորներով կը թռչին, սիմիւտրի արտերու եւ պտղատու ծառոց վրայ կը թափին, եւ բոլոր պտուղները կը սպառեն: Եւ ասով անկարկութեան շատ փնասակար են. իսկ աւրիշ կողմանէ բոլորովին անփնաս կենդանիներ են: Ասոնց միւր կ'ուտուի: Գրեթէ մինչեւ հիմայ 65 տեսակ թեւոտուկ ծանցուած է:

ՅԵՂ Բ. ՄԻՋՈՑՈՎԿԵՐ ՉՂԱԻԿՆԵՐ (Entomophaga)

Կարճ եւ բութ դունչ մ'ունին, սրածայր ակունքեր, մանր աչքեր:

6. Հասարակ կամ երկայնական շղթիկը (Vespertilio auritus) տարածուած թեւերով 0.24 հրճ. տարածութիւն ունի: Կարճ մաղերով մկնանման մարմնոյն վերի կողմը մթագոյն գորշ, իսկ փորի կողմը բաց մոխրագոյն է: Արտաքոյ կարգի երկայն՝ ծայրերը ներս ծալուած, գլխէն երկու անգամ մեծ ականջներ ունի, սուր եւ երկայն ականջի ծածկոյթ մը, եւ սրածայր ու ամբողջ ակունքեր: Առջեւի անդամներն՝ ետեւի




Պտկ. 35. Հասարակ շղթիկ, տարածեալ ($1/3$):

ոտքերէն ըստ բաւականի երկայն են, չափազանց երկայն չորս մատուրներ եւ կարճ բթամատ մ'ունին Այս մատուրներուն՝ ինչպէս նաեւ բոլոր անդամներուն մէջ տեղը, լերկ ու բարակ մորթ կայ որ կէս բոլորակաձեւ կը պատէ մարմինը: Նտեւի ոտուրներուն կարճ մատուրներն ազատ են:

Երկայնական շղթիկը բոլոր Եւրոպա տարածուած է, ցերեկը որմածակերու, որմածերպերու մէջ, տանիքներու տակ, անամէջ ծառերու խողովներու եւ քարածերպերու մէջ կ'անցընէ: Յունիսին մէկ կամ 2 ձագ կը բերէ, թռչելու ատեն կռնակին վրայ կը տանի իւր ձագերը: Գիշերը շատ յաջողակութեամբ անտառներու, պարտէզներու եւ հրապարակներու մէջ ասդին անդին կը թռչտի: միջատներ բոլոր գլխաւորաբար ճանճեր ու գիշերուան թիթեռներ որսալու համար: Շատ շատակեր է, անգամ մը 60 մինչեւ 70 ճանճ կերած է: Եթէ զգուշութեամբ խնամուի, գերութեան ատեն ալ կ'ապրի եւ տեսակ մ'ընտանութիւն ցոյց կու տայ: Ճճիները ջնջելով մեծ օգուտ ունի, իսկ քնառ՝ ամենեւին: Ասոր նման բազմաթիւ շղթիկներ կան, մասամբ վերջալուսին, եւ ըստ մասին հազիւ գիշերուան ուշ ատենները դուրս կ'ելլեն: Ստակած գիւղիկներ եւ ճարպ չեն ուտեր: Չղթիկները ձմեռը՝ քուն կը մտնեն, եւ ետեւի ոտուրներով գլխիվայր կը կախուին, եւ իրենց մորթը կ'ամփոփեն:

7. Լանափխ չղջիկ (Rhinolophus ferrum equinum): Թեւերուն տարածութիւնը 0.26 հրճ. է: Քթին վրայ մորթ մ'ունի, որուն տակի կողմը պայտի, իսկ վերի մասը նշտրակի կը նմանի: Չափաւոր մեծ ականջները ծածկամորթ չունին:




Այս չղջիկը յաճախ պրերու մէջ, փրատակներու, աւերակներու, տանիքներու տակ բազմութեամբ կը գտնուի: Երբեմն լսնաքիթները՝ երկայնականջ չղջիկներուն արիւնք կը ծծեն, բայց ասոնք ալ անմիջապէս անոնց վրայ կը յարձակին ու կ'ուտեն:

Պտկ. 36. Լանափխ ($\frac{1}{2}$):

(Phyllostoma Spectrum): Գլխաւորաբար Գուիանա շատ կը գտնուի. քնացող անոնց, զուարակներուն, ձիերուն նաեւ մարդուն ալ արիւնք կը ծծէ, այսինքն շրթունքներովն եւ բոլորածեւ լեզուովը լաւ մը կը ծծէ եւ պզտիկ անգիստ վէրք մը կը պատճառէ: Չիերուն եւ զուարակներուն կռնակը, իսկ մարդուն՝ ալ միայն ոտու-

րները կը վերաւորէ եւ այն շատ քիչ անգամ: Վամպիւրները չէ թէ միայն անոնք, այլ նաեւ միջատներով եւ հիւթեղ պտուղներով կը սնանին:



Պտկ. 37. Վամպիւրի գլուխը:


ԿԱՐԳ 3. ԾՃԵԿԵՐՆԵՐ (Insectivora).

Ծճեկերները կամ Միջատապէրները մանր ծճիներ կ'ուտեն եւ ասկէ առած են իրենց անունը: Պզտիկ գիշերային կաթնատու կենդանիներ են, աւելի գիշերը դուրս կ'ելեն, ստորերկրեայ տեղեր կ'ապրին, եւ կնձթանման սուր երակք մ'ունին եւ կարճ բայց

զօրաւոր փորելու ուղեքեր, որոնց լայն ներքանին վրայ կը կոխեն: Ասոնց մարմինն իրենց բնակութեան յարմար է. գլխաւորաբար մարմնոյն առջեւի կողմը շատ զօրաւոր է. ոմանց մարմինը փուշերով է, ոմանցը՝ թաւշի նման փափուկ: Ասոնց ատամնաշարն ամբողջ է: Անասուններն՝ անրակ (clavicule) ըսուած ոսկրն ալ ունին: Ասոնք 3 ցեղի կը բաժնուին:

ՑԵՂ Ա. ՈՋՆԻՆԵՐ (Erinaceida)

8. ՈՂՆԻՆ (Erinaceus europaeus) սրահոտեց երախ մը եւ կարճ պոչ մ'ունի: Կոնակի վրայ եւ 2 կողմը՝ կարճ փշեր ունի, իսկ փորին կողմը փափուկ եւ խարտեաշ մազեր: Կրնայ իւր մարմինը բոլորակ գընդակի մը պէս ամփոփել, գլուխն ու ոտուկները ներս քաշել եւ կոնակի փշոտ մորթը վրան ծածկել:




Պտկ. 38. Ողնի (1/4):

Ողնին՝ խոնաւ անտառներու մացառներու մէջ կ'ապրի, եւ գիշերային կենդանի մըն է, ցերեկը կը պահուքտի եւ գիշերն իւր սրսը փնտռելու կ'ելլէ: Գորտեր, մկներ, միջատներ եւ խղունջներ կ'ուտէ, բայց պտուղներ ու արմատներ ալ կը սիրէ: Տեսնուած է որ թռչնաւոր օձերէ (ի-ժերէ) խայթուեցաւ եւ զանոնք կերաւ, առանց վնաս մը կրելու: Չմեւը գնդաձեւ կը կլորի եւ ինքնափոր ծակերու մէջ կը քնանայ: Ողնիներն երբեմն տան մէջ ալ կը պահուին, ուր ցեցերն եւ ծղբիղներն եւ ուրիշ տաղտկութիւն պատճառող կենդանիները բռնելով եւ ուտելով օգտակար կ'ըլլան:


ՑԵՂ Բ. ԽԼՈՒՐԴՆԵՐ (Talpa)

9. ԽԼՈՒՐԴՐ (Talpa europaea) գլանաձեւ մարմին մը, եւ թաւիշի պէս կակուղ՝ կապուտագոյն սեւ գունով թաւ մուշտակ մ'ունի: Երկայն, կռճիկոտ եւ շատ զգայուն կնճիթ մ'ունի. առջեւի կարճ, լայն եւ մերկ թաթերը ձեռքի ձեւով են, եւ ետեւի ոտուկներէն շատ աւելի զօրաւոր: Արտաքոյ կարգի մանր աչուկներն, եւ ականջները մուշտակին մէջ ծածկուած են. պոչը կարճ է:



Պտկ. 39. Խլուրդ (1/2):

Խլրդին ամբողջ կազմութիւնն՝ իրեն բնակութեանն ու ապրելու եղանակին շատ յարմար է: Խլրդին՝ ինքնափոր, ընդարձակ, ստորերկրեայ ծակերու մէջ կ'ապրի ու բոտոտներ եւ թրթուրներ կ'սրտայ: Իւր բնակարանը կը բաղկանայ խցէ մը, 2 բլրակաձեւ սրահներէ եւ հաղորդակցութիւն ունի վազելու գեանափորի մը հետ՝ որ շատ անգամ



Պտկ. 40. Խլրդին ինքնափոր ծակն եւ անցքերը:

30 մէտր երկայն կ'ըլլայ, եւ սրտոյ համբարանոցի մը հետ, ուր օրը 3 անգամ այցելութեան կ'ելլէ: Խլրդին այս օգուտն ունի, որ շատուկեր ըլլալով՝ վնասակար անասնոց բաւական բազմութիւն մը կը ջնջէ, բայց պարտեզներու եւ արօտներու մէջ, կ'օգտուի հողաբլրակներ դուրս տալով, շատ նեղութիւն կը պատճառէ: Չմեռն քնանալով չ'անցըներ, այլ աւելի խորունկ կը փորէ գետիներ:

ՑԵՂ Գ. ՍՐԵՃԱԿՆԵՐ (Soricida)

10. Սրնչակը (շրթադիմ ճոկը) (*Sorex pygmaeus*) մետաքսանման մազերով՝ մոխրագորշ գունով մկնանման մարմին մ'ունի, մարմնոյն երկայնութեամբը բարակ մազոտ պոչ մը, սրածայր, շարժական եւ երկայնամազ կնճիթ մը: Զօրաւոր ատամնաշարը կազմուած է կտրող, շնական եւ ծամելու աչուաներով, տեսանելի



Պտկ. 41. Սրնչակը:

աչուրներ ունի, մեծ ու լերկ ականջներ, եւ միաձեւ նուրբ առջեւի ու ետեւի ոտուրներ:

Սրնշակը՝ թէպէտ նրբաքիթ «մուկ», ալ կ'անուանուի, բայց մկանց կարգին տակ չ'երթար: Այսպէս լերանց հիւսիսային կողման ամենափոքր կաթնատու կենդանին է, միայն Միջերկրէն «բնշիւ» (*Sorex saueolens*) փոքրկութեան կողմանէ վերինէն աւելի նշանաւոր է: Այս կենդանին, ինչպէս նաեւ ասոր մերձաւոր տեսակները՝ իրենց պզտիկութեանը նայելով, շատ շատակեր են, եւ միջատներով, որդերով, պզտիկ թռչուններով, սատկած մկներով եւ այլն եւ այլն, կը կերակրին: Գարշահատ խոնաւ հեղուկ մը դուրս կու տան, անոր համար շներն ու կատուները դիրենք շէն ուտեր: — Շատ տեսակ նրբաքիթ մկներ կան, բայց ամէնէն մեծը հազիւ 0.13 հրժ. երկայն կ'ըլլայ: Զբայի «բնշիւ» (*Sorex fodiens*) ձարոտ ոտուրներ ունի, որոնցմով կրնայ լողալ: Ռուսաստան տեսակ մը նրբաքիթ մուկ կայ, որ Մոչգոլ-Քէր «բնշիւ» (*Myogale moschata*) կ'անուանուի եւ բարակ ու աղնիւ մուշտակ մ'ունի:

ԿԱՐԳ 4. ՄՍԱԿԵՐՆԵՐ ԿԱՄ ԳԱՋԱՆՆԵՐ (Carnivora)

Գաղանները՝ յափարակող կամ պարարտող կենդանի կ'անուանուին, որովհետեւ կամ բռնութեամբ եւ կամ խաբէութեամբ ուրիշ անասուններ ձեռք ձգելէն ետքը կը պատառեն: Ամբողջ եւ սրածայր ատամնաշար մը եւ սայրասուր մագիլներով հասաատուն անդամներ ունին, բայց անրակ չունին: Աղօրիքները սրածայր են եւ անհաւասար մեծութեամբ: Ասոնց մէջէն ամէնէն մեծը Պարարտող ախապ կ'ըսուի, ասոր եւ սրածայր կողմնական ակռաներուն մէջ տեղը կը գտնուին Սոթաղօքի ըսուածները, իսկ Բերնի անկէան դիմացը Ուրարոյի ախապները կամ Ժառիգիները: Գաղաններու ակռաներու որպիսութիւնը մտադրութեան շատ արժանի է, որովհետեւ ամէն մէկ ցեղ տարբեր ատամնաշար ունի: Յափշտակիչ գազանաց մեծագոյն մասը մինակ մատուրներուն վրայ կը քալեն եւ ասոր համար Մարմագնաց անասունները (*Digitigrada*) կ'ըսուին. միայն արջերն ու գորշուկը՝ Թախագնաց (*Plantigrada*) են: — Ասոնք կը բաժնուին 6 ցեղի, եւ են հետեւեալները.

1. Հնապիներ, 2. Բորեաններ, 3. Կարո-աղիներ, 4. Կլա-իներ, 5. Բէլի ճիւղներ, 6. Արջեր:

ՅԵՂ Ա. ԹԵՂԳԻՆԵՐ (Canina)

Բոլոր Հնապիներն՝ առջեւի թաթերուն վրայ 5՝ իսկ ետեւիններու վրայ 4 հատ բութ եւ ետ չբաշտող ձիւրաններով մատուրներ ունին, երկայնաձիգ գլուխ մը, հարթ ու ողորկ լեզու մը: Աւրի կզակին ամէն մէկ կողմը 6, իսկ վարի կզակին վրայ 7 աղօրիքներ ունին: Մարմագնաց են:

11. Ընդամենի շո-նը (էգը՝ +ած, ձագը՝ լահոփ, շնիկ, փոքունակ)
(Canis familiaris) զանազան ձև ու կազմութիւն ունեցող անասուններէն
մէկն է:



Պատկ. 42. Շուշն եւ իւր տեսակաները:

Իճնադական աեւ շոէն .

Կամփռ .

Աղիւսաշուն. Մօլոտ (նմանք՝ մոպս).

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ԳԵՐՄ. ՊԼԱՅՈՒՆ.

Անգղ. բարակ (պառակ). Հաւորսակ.

Բեռնարդեան շուն .

Էսկիմացի շուն.

Գանգրիկ շուն .

Գորշկորս շուն:

Ընտանի շունը՝ իւր սեռին մերձաւոր կենդանիներէն՝ այսինքն գայլէն ու աղուէն, կը տարբերի դմբէթադ գանգոյն եւ իւր գլուխը հարկ-
զոնական դիրքով՝ իսկ պոչը ձախ կողմը դէպ ի վեր, բռնելու յատկու-
թեամբ: Ըան գլխաւոր տեսակներն հետեւեալներն են. քեթէ,

այս վերջին շնորհն ցեղը բուրրովին սպառած է: Հորթի մը մեծութեամբ, թաւոտ, գորշ ու գեղին բծերով էին: Ա. Բեռնարդոսի մեծ լեռան վրայ (Հելուեախայի Ունտերվալիս նահանգին մէջ՝ որ 2394 մետր ծովու հարթման կէն բարձր է.) գտնուած հիւանդանոցի մէջ կը գործածուէին՝ գժտուիտ ճամբորդները գտնելու համար: Այս շնորհն ամէնէն գործունեան ու համբաւաւորը Բարրի (Barri) կ'անուանուէր: 12 տարի այս հիւանդանոցին ծառայեց եւ 40էն աւելի մարդիկ ազատեց: Հիմա նոյն հիւանդանոցն այլեւս շներ կը գործածեն Բեռնարդոսի լուսն անուամբ:

Միայն ընտանի շունը՝ բոլոր երկրիս վրայ մարդուս ընկերացած է: Արեւելեան Հնդկաստան եւ Նոր Հոլանդա, նոյնպէս ըստ մասին Ամերիկա ալ գտնուեցան վայրենի կամ բուրրովին վայրենացած շներ, որոնք մեծ խմբերով իրենց որոր կը փնտռէին: Չկայ անասուն մը որ ամէն կերակրոյ վարժի ինչպէս շունը. Գրեօնլանդայի մէջ գրեթէ միայն ձուկ կ'ուտէ, հարաւային ծովուն քովերը միայն տնկային մասեր, իսկ Եւրոպա՝ խառն կերակուր մ'ունի:

Ընտանի շունը արդէն հին ժամանակներն իբրեւ օգտակար անասուններէն մէկը կը համարուէր: Երանօթ են իւր մատուցած պէտքէն ծառայութիւնները՝ պահպանութիւն, որս եւ այլն:


Միայն կրնայ փնտռակար ըլլալ իւր մէկ զարհուրելի հիւանդութեամբը, որ շնական Կորալ-Ի-Ի կը կոչուի, եւ մէկ խածնելով մարդկան եւ անասնոց կը հազարգուի:

Այսպէս Կորալ-Ի իրենց յառաջուան քծնող ընտելութիւնը կը կորսնցնեն, առանձին տեղեր կը քաշուին, չեն ուտեր եւ չեն խմեր: Իրենց տէրերուն չեն հնազանդիր եւ կամ նոյն իսկ զինքը բնաւ չեն ճանչնար, եւ ամէն բան խածնել կ'ուզեն: Իրենց աչքերը կը պղտորին, ականջներն ու պոչը վար կը կախուին: Յետոյ ասոնց բերանը կը փրփրի եւ մեթկապոյտ գունով լեզուն գուրու կը կախուի, աչքերը բուրրովին կը կարմրին, պոչերն են տեւի ոտուրներուն մէջ կ'ամփոփեն, մազերը կը տնկուին, ակունքներով կը կափկափեն, ձայնը կը քաշուի, ամենեւին չեն հաջեր եւ շատ անգամ կոր գծի մը վրայ կը գտնան: Ինչ որ գտնեն բերնով կը յափշտակեն ու կը խածատեն: Արեւմտեան ջրերին կը քաշուի, կ'իյնան ու կը մեռնին: — Այս հիւանդութեան պատճառը կը համարուի չափազանց խտրութիւն, յոռի ու ապականեալ կերակուրներ, մաքուր ջրոյ պակասութիւն, գոլխաւան ջերմութիւն եւ սաստիկ ջրտուութիւն եւ գլխաւորաբար պաղին ու տաքին արագ փոփոխութիւնը: Դան վրայ մակարոյծ կենդանիներ ու տղեր կը գրտնուին, որոնք գիւրութեամբ ուրիշ անասնոց եւ մարդկան վրայ կ'անցնին. ասով ալ շները վտանգաւոր են:

Յիշենք ընտանի շան քանի մը յատկութիւնները: Շունը իւր լեզուաւ լափելով ջուր կը խմէ, խոնաւ ու ցուրտ քիթ մ'ունի, դուն ուրեք կը քրտնի. եթէ տաքնալու ըլլայ, լեզուն դուրս կը կախէ, եւ պառկելու տեղւոյն չորս կողմը կը սկսի դառնալ. պոչը շարժելով իւր տերը կ'ողջունէ, սեղանի առեւն կը մուրայ, եթէ բան մը գողնայ, շուտ մը պոչը կը քաշէ եւ կը սկսի փախչիլ, երաժշտութիւն լսած առեւն կ'ոռնայ, եւ լրացած լուսինը չի կրնար տանիլ, եւայլն եւայլն:

12. Կայլը (Canis lupus) հովուական խոշոր շան մը կը նմանի, սրածայր գլուխ մը, վեր տնկուած ուղղաձիգ ականջներ, ծուռ կեցած աչուրներ, եւ տափակ ճակատ մ'ունի: Մարմինը մութ գեղին թաւոտ մուշտակով ծածկուած է, որուն ծայրը՝ ներս ոլորուած, երկայն մազոտ պոչ մը ունի:


Գայլը՝ դեռ կը գտնուի Փոքր Ասիոյ ներսերը, Ռուսաստանի եւ Նոր-վեգիայի անտառները. խումբ խումբ կ'ապրի: Եւրոպայի ուրիշ կողմերը



Պտկ. 43. Գայլ ($1/10$):

գրեթէ բնաջինջ եղած է, կամ առ առաւելն քանի մը հաս կը գրտնուի: Գայլն արտաքոյ կարգի շատակեր եւ անգուծ գազան մըն է, եւ իրեն հարկաւոր եղածէն աւելի կը սպաննէ:

13. Աղւ-է-սը (*Canis vulpes*) շատ սրածայր դունչ մը, երկայնա-ձեւ բոլորակ բրով աչուրներ եւ բաց ժանգառ կարմիր մուշտակ մ'ունի: Խրճնացեալ պոչը մարմնոյն չափ երկայն է, որ աղուէսին քալած ատեն գետին կը քսուի:




Պտկ. 44. Աղուէս ($1/13$):

Աղուէսը բոլոր Եւրոպա, Ասիա եւ Հիւսիսային Ամերիկա կ'ապրի. անտառախիտ խոխոմները շատ կը սիրէ, եւ հոն իրեն գետնափոր բնակարաններ կը փորէ: Գաշտային եւ անտառային անասուններով կ'ապրի, գլխաւորաբար թռչուններով, եւ նաեւ իւր առակի կարգ գարձած

խորամանկութեամբը՝ նաեւ տներու մէջ հաւերու ետեւէն կ'իյնայ։ Այս ալ կ'ըմբռնէ, եւս ալ անուամբ գեղեցիկ մուշտակ մը կը մատակարարէ եւ պզտիկութեան տատենը կը զգտնանայ։

Հիւսիսային բարձրավայրերը կը գտնուին Ս-աւ-աւ-աւ (Canis isatis) եւ Ս-աւ-աւ-աւ (Canis lagopus), որոնք միմեկորդին գորշ, իսկ ձմեռը ճերմակ կ'ըլլան, եւ անոնք ու անհատապի յանդգնութիւն մ'ունին, որոնց մուշ-



Պատկ. 45. Սառնաղուէս. ծերմուկը՝ ծմերուսն գոյնը, իսկ գորշը՝ ամառուսն։

տակը «Սպիտակուկ», անուամբ շատ յարգի է։ Նաեւ ուրիշ աղուէսի տեսակներ՝ ինչպէս Ս-աւ-աւ-աւ-աւ-աւ, Դ-աւ-աւ-աւ-աւ, Հ-աւ-աւ-աւ կամ Դ-աւ-աւ-աւ գեղեցիկ մուշտակ կը մատակարարեն։ Ընդհանրապէս աւ-աւ-աւներու մուշտակն աւ-աւ-աւ-աւ կ'անուանուի։

ՑԵՂ Բ. ԿՅԱՔԻՄՆԵՐ (Mustelina)

Բոլոր կռապիսնէն երկայնայնի՜ մարմին մը, հինգ մատերով կարճ ոտուրներ, ողորկ լեզու եւ հաստատուն անշարժ ձիւրաններ ունին։ Ասոնց ատամնաշարն ամբողջ է, եւ ամենամեծ կողմնակի պատառող ակռաներուն ետեւը՝ երկու կողմը ուրիշ պզտիկ ակռայ մըն ալ ունին, որ Ժառ-թիւք կ'անուանուի։ Հաւնոցներու եւ աղանոցներու՝ ինչպէս նաեւ մանր որսի անասնոց, շատ փնասակար են. ասոնք ալ մատնագնաց են։

14. Մ-ն-հարսն-աւ կամ Հառաբաւ աւ-աւ (Mustela vulgaris) պզտիկ յափշտակիչ կենդանիներէն մէկն է։ Երկայնածէ մարմնոյն վերի դին շաւագոյն, իսկ տակի կողմը սպիտակ է. պոչը 0.04 հրժ. երկայն եւ միագոյն գորշ է։

Քարակոյտները, փապարներն եւ ասոնց նման տեղեր կը բնակի, եւ թէպէտ պզտիկ կենդանի մըն է, սակայն շատ արիւնդուշտ է, եւ արտաքոյ

կարգի քաջասրտութիւն մ'ունի, այնպէս որ նոյն իսկ նապաստակներու, ճագարներու եւ հաւերու, բայց սովորաբար միայն մկներու եւ իւլուրդներու



Պտկ. 46. Սկննդամուկ ($\frac{1}{2}$) վերինը: Կնգում ($\frac{1}{2}$) վարինը՝ ձմեռան մորթով:

վրայ կը յարձակի, եւ նաեւ մարդկան դէմ ալ ինք զինքը շատ յամառութեամբ կը պաշտպանէ: Ասոր կը նմանի Կնգումը կամ Սպէտիկ Կնգումը (Mustela ermineus, այսինքն՝ mus Armenius = հայ մուկն) թանկագին բաց մսխրագոյն մուշտակ մ'ունի, որ Կնգումի կ'անուանուի, ձմեռը մաքուր ճերմակ

գունով կ'ըլլայ: Պոչը 0.09 հրժ. երկայն է, իսկ պոչին ծայրը նոյն իսկ ձմեռը սեւ կը մնայ: Ապրելու կերպին կողմանէ մկնհարսնուկի կը նմանի եւ Եւրոպայի ու Ասիայի հիւսիսային կողմերը կը գտնուի. որսորդներէն շատ կը փնտռուի, բայց որսորդութիւնն ալ շատ դժուարին է: Յարգի մուշտակ մըն ալ Ժանգոթի-ը (Mustela putorius) կը մատակարարէ, միագոյն




Պտկ. 47. Ժանգոթի ($\frac{1}{2}$):

սեւագորշ է եւ յատակը՝ գեղեցիկ բաց գունով, գեղին եւ բրդոտ է: Հառարակ կատուին չափ հազիւ կոյ մարմինն, եւ ամէն տեղ կը գտնուի: Սեւմէջ ծառերու մէջ եւ հին փլկած պատերուն տակ, նոյնպէս ալ տանեաց տակ կ'ապրի, եւ հաւերու ահ ու ուրստի կը պատճառէ՝ զխաւորաբար ձմեռը:

15. Հասարակ կոպը (*Mustela foina*) 0.46 հրժ. մեծ կ'ըլայ. խարտեաչ գոյն մ'ունի, վիզն ու կուրծքը ճերմակ եւ բրդոտ է. պոչը՝ մարմնոյն կէսէն քիչ մ'աւելի է:


Քաղաքներու ու գեղերու շէնքերու մէջ կ'ապրի, նոյնպէս քաղաքայիններու եւ փայտակոյտներու տակ, հաւերուն շատ վնասակար է, բայց ասկից մկներ, հաւկիթ, խաղող, կեռաս եւ ասոնց նման բաներ կ'ուտէ: Չմերուան մորթը յարգի մուշտակ կ'ըլլայ, բայց շատ սուղ չէ. հազիւ թէ 15—20 ֆր.



Պտկ. 48. Հասարակ կուղ (1/10):

արժէ: Աշխուհի կամ Բոնի կոպը (*Mustela martes*) ասոր շատ կը նմանի 0.47 հրժ. մեծ է, գեղին դորշ մուշտակ մը եւ կուրծքին առջեւը ժանկադոյն գեղին բիծ մ'ունի, անտառներու՝ խոռոչացեալ ծառերուն վրայ կ'ապրի, ու թռչուններ, նապաստակներ, մկներ, սկիւռներ, միջատներ եւ պտուղներ կ'ուտէ: Ամբողջ տարի ալ կ'անսուսնուի եւ գեղեցիկ մուշտակ մ'ունի, որ 20—25 ֆր. կ'արժէ, բայց այս մուշտակը՝ Սիբերիայի կամ Ռուսական Սախալին (ծիբեիլին) (*Mustela zibelinea*) մուշտակէն ազնիւ չէ, որովհետեւ ասիկայ վրի բիծը չունի, եւ միայն Սիբերիա կը գտնուի եւ հոն բոլորովին անբնակ ու ամպի լեռնակողմերը կը բնակի, ձմեռը՝ մեծամեծ գժուարութիւններով եւ վտանգներով իւր արտաքոյ կարգի յարգի մուշտակին համար կ'որսան: Մուշտակը մինչեւ 400 ֆր. կ'արժէ: Թանկագին մուշտակ մըն ալ Մոսկովայի կամ Նեյքը (*Lutra lutreola*) կու տայ. այս կենդանին ոտքերուն մէջ լողամորթ ունի եւ ջրասամուրին շատ կը նմանի:

16. Նոյնպէս նշանաւոր է Հասարակ ջրաղութը կամ Զբոսամոյրը



Պտկ. 49. Զբոսամոյր (1/10):

(*Lutra vulgaris*). Լայն, տափակ, եւ առջեւի կողմը կլորեցնող գլուխ մը, եւ պզտիկ ականջներ ունի, քիթն ու ականջները մորթով մը կրնայ

դոցել, որպէս զի ջուր չառնուն: Երկայնաձիգ, մութ գորշ մարմինը՝ կարճ ոտիցը վրայ կը հանգչի, իսկ մատուրները՝ բոլորովին անմազ լողա-մորթով մ'իրարու հետ միացած են:

Ցերեկը՝ գետափներու ծակերուն մէջ կը պահուբարի, շատ քաջ կը լողայ եւ գլխաւորաբար ձկներով կ'ապրի: Յարգի մուշտակին արժէքն է 10—15 ֆրանկ:

17. Իշլարը կամ Գորշուկը (Meles Taxus) սրածայր դունչ մ'ունի, իսկ մարմինը առջեւի կողմանէ սկսեալ մինչեւ ետեւի կողմն երթալով կը հաստնայ: Հաստ մազերով ծածկուած մորթը կունակի կողմը բաց, դեղին ճերմակ է, իսկ գլուխը մաքուր ճերմակ, ասոր հակառակ վարի



Պատկ. 50. Իշլարը (1/10):

դին մութ խարտեաչ սեւ. աչուրներուն եւ կարճ ականջներուն վրայէն մութ բծեր կ'անցնին: Ոտիցը լայն ներբաններուն վրայ կոխելով կը քալէ, եւ բուշտ մ'ունի որուն մէջ դեղին, գարշահոտ, եղոտ հեղանիւթ մ'ունի:

Իշլարն անտառաշատ տեղեր՝ իւր փորած բազմախորշ բնակարաններու մէջ կը բնակի: Ցերեկը եւ ձմեռը հոս բոլորակ եղած կը հանգչի եւ միայն գիշերը բնակարանէն կ'ելլէ կերակուր փնտռելու համար, սր են արմատներ, պտուղներ, միջատներ, նապաստակիկներ, դաշտա-մկներ, օձեր, գորտեր, հաւկիթներ եւ այլն եւ այլն: Եթէ պղտիկութեան ատեն բռնուի, կրնայ զգոնացուիլ, բայց գրգռուելու ատեն շատ կը խածնէ: Մուշտակը՝ որսորդի պարկ եւ անտուկներու վրայ անցընելու կաշի կ'ըլլայ, իսկ Աֆրիկայէ կամ Լաբրադորէն Գորշուկն մորթէն մուշտակ եւ ձեռնամուշտակ (manchon) կը շինուի, իսկ մազերը՝ վրձին կ'ըլլան: Գորշկորս շան ձեռք ասոր բնակարանը դանելէն ետքը կը

փորեն ու զինքը դուրս կը հանեն, բայց իւր բնակարանէն դուրս ելլել չ'ուզեր:



Պտկ. 51. Հիւս. շատուկեր (1/8):

Իշղարին մերձաւոր անասուններն են. Կո-ղիը կամ Հի-սի-ային շար-կերը (*Gulo borealis*) եւ Աֆրիկայի Սի-սի-ային կամ Փանդանոս առ-նը (*Mephitis Chinga*). Իբրեւ մուշտակաւոր անասուններ շատ յարգի են:

Արտաքին տեսքին նայելով՝ Սամոյրը եւ Իշղարը կզտքիաններէն կը տարբերին: Սամոյրն՝ իւր ոտիցը լողամորթովը փոկերու կը մերձենայ, իսկ Թանձրամարմին իշղարը՝ իւր լայն ոտից ներքաններովը, արջերու:

ՑԵՂ Գ. ԿՆՏՈՒՆԳԻՆԵՐ (Felida)

Կա-ր-ա-պ-գ-ի-ն-է-րը բուն գազաններ են: Երկայնաձիգ մարմին մը, կլոր գլուխ, եւ պեխի պէս մազերով կարծ դունչ եւ միջակ ականջներ ունին. ասոնց ատամնաշարը շատ զօրաւոր է: Առջեւի թաթերու ծայրը 5ական՝ իսկ ետեւի թաթերուն վրայ 4ական կոր ու սուր ճիւղա-ններ ունին, զորոնք կրնան ներս քաշել, որով միշտ սրածայր կը մնան: Ասկէ զատ կատուազգիները խորտուբորտ լեզու մ'ունին, ասոնց մեծ աչուռները միջոյ մէջ կը փայլին, որովհետեւ աչքին մէջ ցոլացող քիչ մը լոյսն ալ, կը բեկբեկի: Մատնագնաց են. գլխաւոր տեսակներն են՝

18. Ընդանի կա-ր-ա-ն (*Felis domestica*) բարակ մազերով եւ զա-նազան գունով մորթ մ'ունի, երկայն բարակ, դիւրամեղք մարմին մը, բոլորակ գլուխ մը, բլթացած դունչ մը. մարմնոյն կէսէն աւելի եր-կայնութեամբ՝ դէպ ի ծայրը բարակցած, պոչ մ'ունի: Վերի կզակն



Պատկ. 52. Ընտանի կատուի գլուխը:

ետեւինները՝ չորս մատուրներ ունին, որոնց ծայրը սուր ձիւրաններ կան, զորոնք կրնայ ներս քաշել:

Ընտանի կատուն ամէն տեղ՝ բաց ի բեւեռային գաւառներէն, իբրեւ ընտանի անասուն, ըստ մասին զուարճութեան եւ ըստ մասին մկները ջնջելու համար կը պահուի: Արդէն հին ատեններն Եգիպտոս զգոնացած էր, բայց հագիւ Միջին դարու մէջ Եւրոպա բերուեցաւ, եւ անկէ ալ աշխարհիս միւս մասերը:

Կատուն որչափ ալ ընտանեայ, սակայն միշտ աւելի իւր տանը քան թէ իւր տիրոջը հաւատարմութիւն կը ցուցնէ, եւ իւր գաղանային բնութիւնը բոլորովին չի թողուր: Շատերը զինքը իւր մաքրութեան, դիւրութեան, եւ խաղի ունեցած միտութեան համար կը սիրեն. իւր հաճութիւնը կը յայտնէ կռիւելովն ու խորհալով, իսկ բարկութիւնը իւր մալալով, միշտ իւր զէնքերը՝ ձիւրաններն ու խածուածքը, գործածելու գիւրամէտ է: Մկներու ու փոքրիկ թռչուններու դարանակալ կ'ըլլայ, ու յանկարծական անակնկալ ցատկերով կը բռնէ: Յատուկ նուալու (մաւելու) ձայն մ'ունի, զոր գրեթէ անորոշաբար ձմերուան գիշերները կը հանէ: Մազերն՝ եթէ մթոյ մէջ հակառակ ուղղութեամբ (վարեն վեր) շփուին լոյս կը ցայտեն կամ կը փայլեն: Սաստկահոտ բոյսերու բերում ունի:



Պատկ. 53. Այլընդի կատու (F.):

վրայ՝ երկու կողմն ալ 4 աղօրիքներ ունի, իսկ վարի կզակին վրայ երկու կողմն ալ միայն 3 ալան, վերի եւ վարի կզակին վրայ 6 ալան կտրող ալուաններ, իսկ երկու կողմն ալ սաստիկ զօրաւոր, սրածայր շնական ալուայ մը: Ղեզուն խորտուբորտ է, բիւքը երկայնաձեւ եւ ճեղքուածի նման: Առջեւի ոտուրները՝ հինգ, իսկ

19. Այլընդի կատուն (Felis catus) ընտանի կատուն աւելի մեծ է, խիտ մազերով, մութ դեղին գունով եւ թուխ շեղ գծերով թաւոտ մորթ մ'ունի:


Մեծագին յարգի մուշտակ կը մատակարարէ, բայց որսի անանոց՝ գրեթէ անորոշաբար նապաստակներու, շատ միասակար է: Շատ մ'օրինակներով հաստատուած է, թէ նոյն իսկ մարդու ալ փոս հասցուցած է:

20. Լյուսան կամ Կամ-Լյաքսնէ (Felis lynx) կարմրեղէկ խարտեաշ՝ անկանոն թխագոյն բծերով մորթ մ'ունի, պոչը կարճ է, եւ մազի խուրձերով ականջներ ունի:



Պտկ. 54. Լյուսան ($\frac{1}{15}$):

Եւրոպայի խոխոմներու մէջ ծառերու վըայ կ'ապրի, ամէնէն փնասահար գագաններէն է, բայց հիմայ գրեթէ միայն հիւսիսային կողմերը կը գտնուի: Եղջերուներու, խարբուզներու կոնակին վըայ յարձակելով, փսղերակը կը խածնէ: Մորթը յարգի մուշտակ կ'ըլլայ:




Պտկ. 55. Առիւծ ($\frac{1}{10}$):

21. Առիթուր (անասնոց թագաւորը, *Felis leo*) ունի միագոյն մորթ, մեծ՝ աւելի քառակուսի քան կլոր գլուխ մը, լայն ու զօրաւոր կուրծք. իսկ մարմնոյն ետեւի կողմը նուրբ է, երկայն պոչին ծայրն՝ երկայն մազերէ փունջ մը կայ, իսկ այս մազերուն մէջ տեղն եղջիւրիկ մը: Ասոնցմէ զատ արուն մարմնոյն առջեւի կողմը գեղեցիկ բաշ մըն ալ ունի:

Հիմայ առիւծն՝ Ափրիկէի եւ Ասիայի ջերմ գաւառներու լեռանց ու դաշտերու վրայ կը բնակի. իսկ հին ատենները Յունաստան ալ տարածուած էր, եւ առ հասարակ հին ատենը՝ հիմակունէ աւելի շատ կար, որովհետեւ հին Հռովմայեցիք՝ իրենց մրցամարտներուն համար շատ անգամ հարիւրաւոր առիւծներ կ'սրսային:

Անգամ մը Պոմպէոս 600 առիւծ մէկտեղ Հռոմ կռուել տուաւ: Առիւծն ի սկզբանէ հետէ իւր ծանր կեցուածքովը, քաջասրտութեամբն ու ուժգնութեամբն ինք զինքն յարգել տուած է: Եր պատմուի թէ այն ատեն միայն մարդուն վրայ կը յարձակի, երբ գրգռուի, կամ մարդս փախչել ուզէ, եւ թէ այս ընելու ատեն 10—12 քայլ հեռաւորութեամբ կը նստի, ու ետքը իւր վտանգաւոր յարձակումը կ'ընէ, բայց եթէ չյաջողի, շատ քիչ անգամ նորէն կը կրկնէ:

22. Թագաւոր վագրը (Բենգալէան վագրը) (*Felis tigris*), երկայնաձիգ մարմին մը, կարմրագեղին՝ տակի կողմը ճերմակ եւ կողմական սեւաբիծ-շերտաւոր մորթ մ'ունի, երկայն պոչը սեւագոյն օղակներով է:




Պտկ. 56. Վագր (1/2):

Բոլոր գաղաններուն մէջէն ամենազարհուրելին է, որովհետեւ արտաքոյ կարգի զօրութեանը հետ՝ սաստիկ ալ արիւնախանձ ու անգութ է: Բոլոր հարաւային Ասիա, բայց գլխաւորաբար Հնդկաստան կը գտնուի, եւ հոն ամէնէն աւելի անտառաւտ ափանց վրայ իւր որսը կը փնտռէ: Ամենամեծ կենդանիներու ալ կը յաղթէ, ձիոց երամակներու վրայ կը յարձակի, եւ իւր արիւնաշտութեամբն ուտել կըցածէն աւելին կը խղրէ, կը սպաննէ:

Ի մասնաւորի՝ մարդիկներու վրայ ըրած յանդուգն յարձակմանցը համար վազըը շատ փնասակար է, որովհետեւ ճամբորդներու եւ կամ գեղի մը վրայ յարձակելով մարդ կը յափշտակէ։ Արդէն արեւելեան Հնդկաստան՝ ամբողջ բազաքներ ու գեղեր՝ վազրին ստէպ ստէպ յափշտակութեանցը պատճառաւ մարգաթափ եղած են։ Երբեմն երբեմն որսի մեծամեծ պատրաստութիւններ կը տեսնուին, որոնց յաճախ հազարաւոր մարդիկ մասնակից կ'ըլլան, բայց միշտ այսպիսի մեծ վագրորսութիւններ շատ վտանգաւոր եղած են։

Խոյտարդէտ կատուազգիներուն կը վերաբերի Ափրիկէի Ընթէ-ձը (Felis leopardus), որուն կարմրագեղին՝ իսկ տակի կողմը ձերմակ, մորթին 2 կողմը 6—7 կարգ սեւ կէտերէ բաղկացած բծեր կան։ Մեծ յաջողակութեամբ ծառերու վրայ կը մագլէ կ'ըլլէ, եւ



Պտկ. 57. Լ'նստիւն (1/2):

յատկելով կապիկներու, թռչուններու, վիթերու, այծերու, ոչխարներու եւ մարդիկներու վրայ կը յարձակի ու կը բռնէ։ Ապրելու եղանակովը, բնակութեամբն ու տեղքով ասոր շատ կը նմանի Հնդկաստանի Յօվար կամ Յօվար-ձը (Felis pardus), որուն մորթին աւելի բաց գոյն, եւ աւելի քիչ բծեր ունի։ Զաւա կղզւոյն վրայ նաեւ միագոյն Սե-Յօվար (Felis melas) մը կը գտնուի։

Նոյնպէս նշանաւոր է Կոնգո-արը (Պոն-ն, Ափրիկայի Կոնգո-ար Felis concolor), միագոյն, բաց դեղին մորթով կատուազգի մըն է, առանց բաշի եւ պոչին ծայրն ալ փունջ չունի։

23. Յօվար, Ափրիկէան յովաղ(ին) = Felis onza) Ժանկագոյն դեղին գոյն մը, բոլոր մարմնոյն երկայնութեամբը՝ 4—6 կարգ սեւագոյն մեծ, օղակաձեւ բծեր ունի, որոնց ամէն մէկուն մէջ տեղը սեւ կէտ մը կայ։

Այս գեղեցիկ, գոյնզգոյն կատուազգի անասունը՝ ջերմ Ամերիկայի անտառները կը գտնուի: Հոն ամենամեծ եւ ամենամիտառ կազմանն է,




Պտկ. 58. Յագուար (1/10):

րէն աւելի բարձր, ճիւղաւոր միայն կիսով չափ կրնան ներս քաշուիլ: Մատնագնաց են բորեանները:

որովհետեւ մեծ բնական անասնոց, եւ յաճախ մարդիկնէրու վրայ կը յարձակի: Բայց արդէն սաստիկ հալածուելով թիւը շատ նուազած է:

ՅԵՂ Դ. ԲՈՐԵՆՆԵՐ (Hyaenina)

Բորեաններու ծանուցիչներն են, 34 հատ ակույ (սյսիւքն $\frac{3}{3} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{0}{1} \cdot \frac{1}{1}$) բութ ուռուցիկ ծամելիք ակուններ, հաստ գլուխ եւ բութ դունչ, առջեւի ոտուրներն ետեւիներն



Պտկ. 59. Շերտաւոր Բորեան (1/10):

24. Շերտաւոր Բորեան (Hyaena striata) մեծ շան մը չափ է, եւ անոր կը նմանի, բայց ինչ ինչ յատկութիւններով կատուններու կը մերձենայ, որով երկու ցեղերու միջինը կը կազմէ: Գլուխը հաստ ու թանձր է, ուղղաձիգ ականջներն մեծ ու


լերկ, մարմնոյն առջևի կողմը՝ ետեւինէն զօրաւոր ու բարձր է, ասոր համար կոնակն՝ որուն վրայ բաշ մը կայ, վերէն դէպ ի վար երթալով կը ցածնայ: Մորթը բաց մոխրագոյն է, եւ խարտեաշ կողմնական շերտեր ունի: — Ասոր կը նմանի Բձաւոր Բորեւանը (*Hyaena crocuta*), որ կոնակի կարճ բաշովը եւ խարտեաշ բծերովը կը զանազանուի:

Բորեւանները չարատեո տեսքով դիշերական գազաններ են, դլուիլ՝ ծռած ու կոր է. կոնակն՝ կամարածեւ. իսկ քալելու ատեն կարծես թէ կը կազան: Ափրիկէ եւ հարաւային Ասիա կը գտնուին, եւ դիակներով կը կերակրին, որով ըստ մասին օգտակար են, աւելի երկչու են քան քաջափրտ:

Անթուլթենէ տանջուած ատեն անհաւատալի յանդգնութիւն մը կ'առնուն, ընտանի անասուններ կը յափշտակեն, նաեւ տղոց վրայ ալ կը յարձակին: Չափահաս մարդիկ բորեւաններէն չեն վախնար: Թէ քնացող մարդիկներ կը պատուեն եւ գերեզմաններէն դիակներ դուրս կը հանեն գոնէ հիւսիսային Ափրիկէ լուած բան չէ: Անգղերու պէս շատակեր են. իրենց զարհուրելի ոռնալուն համար՝ որ աւելի անախորժ քրքիլի մը կը նմանի, եւ զազուլթեան համար՝ չափէն աւելի կ'ատուին, նշանաւոր է իրենց կատաղութիւնը՝ որ վագրէն աւելի է: — Բձաւոր բորեւանը միայն Ափրիկէի հարաւային եւ արեւելեան կողմը կը գտնուի:

ՑԵՂ Ե. ԲԵՅԿ ՄՅԿՈՆԵՐ (*Viverrina*)

Յափշտակիչ գազաններու մասնաւոր խումբ մըն ալ կայ որ Կզաքիսներու տեսակներուն կը վերաբերի, այսինքն Բէշ Դէնները կամ Գէ-



Պտկ. 60. Հետախնայն ($\frac{1}{10}$):


րը ջնջելով օգտակար է, բայց նաեւ մկներ, թռչուններ, օձեր եւ ասոնց նման բաներ ալ կ'ուտէ:

Բէշներն, որոնք Ափրիկէ եւ Ասիա տնասուն կենդանիներ են, եւ յարգի մուշկ մը կու տան, որ իբրեւ հոտաւէտ իւղ եւ գեղ կը գործածուի: Այս անասնոց կը վերաբերի նաեւ Հեփաւհանը կամ Փաքաւնի Դուլը (*Herpestes ichneumon*), որ կոկորդիլոսներու ձուե-

ՑԵՂ 2. ԱՐՋՆԻ (*Ursina*)

Արջերն՝ դանդաղ կենդանիներ են, ըստ բաւականի երկայն սրունք, 5 մատ ունին եւ իրենց ոտիցը ներբաններուն (թաթերուն) վրայ քալելուն համար Թաւագնայ (*Plantigrada*) կ'ըսուին: Մեծ պատառող ակոսներով եւ բուլթ՝ ցից աղօրիքներով ամբողջ ատամնաշար մ'ունին:

25. Խաբարեալ կամ Հասարակ աքջը (*Ursus arctus*) Եւրոպայի ցամաքային յափշտակիչ գազանաց ամենամեծն է: Արջը ծանրանդամ է, խիտ, երկայնաստեւ, գորշ մուշտակով մարմին մ'ունի, կարճ պոչ, սրածայր գլուխ մը, եւ խիստ կորացած գմբեթաձեւ մեծ ճակատ մը: Լայն, լերկ եւ ուռած ներքաններուն վրայ կը կոխէ, եւ մատուրներուն ծայրը զօրաւոր, երկայն եւ սուր ճիրաններ ունի:



Պտկ. 61. Հասարակ աքջ (1/2):

Խարտեալ աքջը կը գտնուի Փոքր Ասիա եւ Եւրոպա, ի մասնաւորի Տաւրոս, Ալպեան, Կարպատեան եւ Պիւրենեան լեռանց վրայ: Եւրոպայի Հիւսիսային կողմերը յառաջագոյն շատ կը գտնուէր, բայց Հիմայ բնաջինջ եղած է: Կերակուին է անտառի մանր կենդանիներ, ծառի պտուղներ, մեղր եւ միջատներ:

Երբեմն բնտանի անասնոց վրայ ալ կը յարձակի: Իսկ մարդկան վրայ այն ատեն միայն կը յարձակի, երբ ոստիկ զրգուռի կամ անօթութիւնը զինքը ստիպէ, եւ այն ատեն շատ վտանգաւոր կ'ըլլայ, վասն զի սաստիկ մենչելով ետեւի 2 թաթերուն վրայ կը կանգնի կը կենայ, եւ երկու առջեւի ոտուրներով՝ որոնց վրայ արտաքոյ կարգի զօրութիւն մ'ունի, մարդուն վրայ կը յարձակի: Արջուն ձեռքէն ազատիլը շատ դժուար է, որովհետեւ արագ կը վազէ, անծ յաջողութեամբ կը մագլէ ծառերու վրայ կ'ելլէ եւ քաջ կը լողայ: Դեռ ձմեռ չեկած՝ կերակրոյ առատութենէն շատ կը գիրնայ, իսկ ձմեռն իւր բայոցը կը մտնէ, ձմերուան թեթեւ քունը կը քնանայ, եւ այս միջոցին զգալի կերպով կը վտիտնայ: Խարտեալ աքջը յարգի մուշտակ մ'ունի, միւր կ'ուտուի: Թոժիւն եղած ատեն կ'ընտանենայ եւ զանազան ճատարութիւններ կը սորվի: Արեւելք արջախաղ գնդուները շատ ծանօթ են:

26. Սպիտակ կամ Բե-եռային աքջը (*Ursus maritimus*) Հասարակ ցամաքային արջէն աւելի մեծ ու աւելի վտանգաւոր է: Միագոյն գեղնկեկ, արծաթագոյն սպիտակ է. գլուխը, վիզը, առհասարակ բութանդակ մարմինը երկայնաձեւ է, իսկ գանգը շատ կոր չէ, ոտիցը ներ-

բանները շատ մեծ են, իսկ մատուրներուն մագիլները համեմատութեամբ պղտիկ են:

Միայն հիւսիսային բեւեռական երկիրները կը բնակի, եւ սաստիկ ցրտութեան ալ կը դիմանայ, եւ ձմեռը՝ ձիւնն եւ սառույցը կը փորէ մէջը կը թաղուի: Միայն մեղէն կ'ուտէ (այսինքն ձկեր, փոկեր եւ սատ-



Պտկ. 62. Սպիտակ արջ ($\frac{1}{2}$):

կած կէտեր). շատ քաջ կը լողայ եւ մարդու ալ վտանգաւոր է: Մուշտակը շատ յարգի է: — Ամերիկա Սէ-թը մը կայ, որ Բ-նէթ-ը (Ursus americanus) կ'անուանուի, նոյնպէս գորշ արջ մը, որ Ան-թը-թը (Ursus ferox) կը կոչուի. Արեւելեան հնդկաստան ալ Շրեմ-ը (Ursus labiatus) կը գտնուի: Նոյնպէս ամերիկայի պզտիկ Զը-թը կամ Լ-թը-թը (Procyon lotor) ալ հասարակ արջերու յեղին տակ կ'երթայ:


ԿԵՐԳ 5. ՏՏՆՈՏԵԱՆՔ (Pinnipedia)

Տփնոթեան ըսուածները՝ մազոտ մորթ մը եւ չորս հատ լողաթեւի նման ոտքեր ունին, եւ մատուրները մաշկով իրարու միացած են. ետեւի ոտուրները մեծաւ մասամբ դէպ ի կռնակն ուղղուած են. գազաններուն նման առամնաշար մ'ունին: Ականջի կոնք չունին, վերի կողմէ կան ահուաները շրթունքներով ծածկուած են: Գրեթէ անընդհատ ջրոյ մէջ կ'ապրին եւ շատ քիչ անգամ ցամաք կ'ելեն: Ատնք երկու ցեղ կը բաժնուին:

ՑԵՂ Ա. ՓՈԿԻՆԻ (Phocina)

27. Հասարակ փոկը կամ Ծովաշուներ (Phoca vitulina): Մարմնոյն զարմանալի ձեւովը՝ իսկոյն միւս կաթնատուներէն կը զանազանուի

մոխրագույն եւ խիտ մազերով ծածկուած է, որոնք ջրոյ մէջ մարմնոյն վրայ կը կպչին: Գլուխը շան գլխուն կը նմանի, իսկ ատամնաշարը՝ գազաններու ատամնաշարին: Թուխ աչուքները շատ մեծ են, իսկ ականջները մուշտակին տակ ծածկուած են: Դուռնի բոլորտիքը՝ երկայն ու



Պտկ. 63. Փոկ (1/1):

շատ ամուր խողաններ (պեխեր) ունի: Գլանաձեւ մարմնը երթալով դէպ ի ետեւը կը բարակնայ: Ոտուքները լողարաններու կը նմանին, երկու առջեւիններն իրենց բնական տեղն են, իսկ ետեւինները դէպ ի յետսակողմն ուղղուած են:

Հասարակ փոկին՝ իւր մերձաւոր տեսակներովը՝ արեւելեան եւ Հիւսիսային ծովերը, մինչեւ Հիւսիսային սառուցեալ ծովուն մէջ ալ բազմաթիւ եւ գտնուի եւ ձկերով կը կերակրի: Չափերը գիեցընելու համար երբեմն ցամաք կ'ելլէ:

Ուշագի որ ջրոյ մէջ արտաքին կարգի արագաշարժ է, նոյնչափ ալ ցամաքի վրայ դանդաղ է քալուածքը: Այս միջոցիս զինքը շատ կ'որսան եւ դիւրութեամբ, որովհետեւ քթին վրայ թեթեւ հարուած մը զարնելուն պէս կը սատկի: Իւր ճարպին եւ մսի շատ կը հալածուի: Գրեթե անգամ յիշուած, արիւնն ալ կը խմեն, եւ աղիքը, նեարդն ու ոսկորտիքը այլեւայլ բաներու կը գործածեն: Փոկերը շատ դիւրութեամբ կ'ընտանենան, իրենց պահպանման շատ սէր կը ցուցնեն, եւ ըստ բաւականի ծանօթ են այս կենդանեաց մտաւոր ընդունակութիւնները: Սուր հաջելուն համար «ծովաշուն» անունն առած է փոկը:


Փոկերու բազմաթիւ տեսակներու մէջ՝ Ծովաշուն կամ Բաշուն (Otarja jubata) շատ երեւելի է, կարճ արտաքին ականջներ եւ շիկակաբարձր մազեր ունի, որոնք մարմնոյն առջեւի կողմը բաշի կը նմանին: Մեծ Ովկիանոսի եւ Մագելանեան նեղուցը կը գտնուի եւ 5 մետր երկայն կ'ըլլայ: — Խաղաղական Ովկիանոս ալ՝ Ծովաւը (O. ursina), Ծովափի (Cystophora elephantina) անուամբ մեծամեծ փոկեր կան:

ՅԵՂ Բ. ԾՈՎԱՆՈՒՄ (Trichechina)

28. Ծովաշուն (Trichecus rosmarus) 4—5 մետր երկայնութեամբ եւ 2—3 մետր շրջապատով՝ մեծ, հաստամարմին ու դանդա-

ԿԵՆՏՐՈՆԱՐԱՆՈՒԹԻՒՆ

ղաշարժ անասուն մըն է. թուխ դեղնագոյն, կարծր մազերով մորթ մ'ունի: Մարմնոյն կազմածքին կողմանէ փոկերուն կը նմանի, բայց գլուխն ու ատամնաշարը տարբեր են: Վերի շրթունքը թանձր, ուռած եւ կարճ ու հաստ պեխերով ծածկուած է: Վերի կղակէն 2 մեծ, եր-



Պտկ. 64. Ծովացու (Գ/ա):

կայն ժանիքներ դուրս ցցուած են, եւ ասոնք երբեմն 0.80 հըժ. երկայն, եւ 3 — 5 քիլոգրամ ալ ծանր կը կշռեն:

Ծովացիները հարկւրաւորներով մէկտեղ կ'ապրին հիւսիսային սառուցեալ ծովերու մէջ, եւ ձկերով, խեցեմորթներով եւ ուրիշ ծովային կենդանիներով կը սնանին: Իրենց բերնի ժանիքը կէս մը իբրեւ զէնք, կէս մըն ալ սառուցի կամ ցամաք հողի վրայ շարժելու կը գործածեն: Ժանիքներու, մորթին եւ ճարպին համար կ'որսացուին: Ժանիքները փղոսկրի պէս գործածութիւն ունին:

ԿԱՐԳ 6. ԿՐԾՈՂՆԵՐ (Glires)

Կրծող կենդանիները նշանաւոր են իրենց կրծող ակռաներով. երկու կղակներուն վրայ ալ՝ երկու կիսաբոլոր, զօրաւոր, երկայն, դուրի (ciseau) նման, շարժական ակռաներ ունին, որոնցմով կերակուրն եւ ուրիշ շատ կարծր նիւթեր ալ կը կրծեն. այս ակռաներն երթալով կ'աճին: Կողմնակի ակռաներ չունենալուն՝ կրծելու եւ ծամելու ակռաներուն մէջ տեղն ընդարձակ միջոց մը կայ. 5 ցեղի կը բաժնուին:

ՑԵՂ Ա. ՍԿԻՐԻՆԵՐ (Sciurina)

Սկիւրները՝ ազատ մատուրներով անհաւասար երկայն ոտուրներ ունին: Ասոնց ականջը, պոչն ու թաթերը խիտ մազերով ծածկուած են: Ասոնց ծանուցիչ նշաններն են. լայն գլուխ, տափակ ճակատ, սրածայր դունչ, մեծ աչքեր:

29. Հասարակ «կիւր» (Sciurus vulgaris) ականջներուն ծայրը մազի փունջ մ'ունի, մարմնոյն երկայնութեամբն երկշար մազերով պոչ մ'ունի, առջեւի ոտուղներուն վրայ չորս մատ կայ, բայց բթամատ չունի,



Պտկ. 65. Հասարակ սկիւռ (1/4):

անոր տեղ ելունդ (կուծիծ) մ'ունի, իսկ ետեւի ոտուղները 5 մատով են: Եւրոպա գտնուած սկիւռներու մուշտակը աղուեսագոյն կարմիր է, իսկ վարի կողմը ճերմակ բայց նաեւ սեւ գունով, եւ հիւսիսային կողմերը նաեւ կապուտկեկ մութրագոյն գտնով սկիւռներ ալ կը գտնուին:

Սկիւռները՝ բարեխառն երկիրներու անտառները կը բնակին եւ հոն կապիկներու դերը կը կատարեն, որովհետեւ իրենց մագլելու յաջողակութեամբն եւ իրենց վարմունքովն ասոնց շատ կը նմանին: Արագ արագ ծառէ ծառ կ'ոտոտոտեն: Եթէ ձագ բռնուին շուտ կ'ընտանենան: Հասանգամ շան ձագի պէս՝ զուարճութեան համար տներու մէջ կը պահուին: Ասոնց կերակուրն է՝ անտառի ծառոց պտուղներն եւ հունտերը: Ուտելու ատեն ետեւի ոտուղներուն վրայ կը նստին եւ առջեւի թաթերով կերակուրը բերան կը տանին: Չմեռը՝ առանց քուն մտնելու, անամէջ ծառերու կամ փապարներու մէջ իրենց շինած կակուղ բոյններու մէջ կ'անցընեն: Ուր որ շատ բազմացած չեն ամենեւին փնաս չեն ի տար: Հիւսիսական կամ Սիբերիայի սկիւռները յարգի մուշտակ (սկիւռեկ) կու տան: Բայց եթէ մեծախումբ բազմութեամբ տեղ մը գտնուին,



Պտկ. 66. Արջամուկ (1/10):


ահագին փնաս կը պատճառեն եւ երկրին տանջանքը կ'ըլլան. օրինակի համար, Միաբանեալ Նահանգներու մէջ Միւր-Գոյն Սկիւր» (Sciurus leucotis) թէ պարտեղները եւ թէ դաշտերն աւերակ կը դարձնեն:

Այս ցեղին տակ կ'երթայ նոյնպէս Աւստրալիայի կամ Աւստրալիայի (Arctomys marmotta):

ՑԵՂ Բ. ԿՐԻՆՈՒԻԴ (Castorida)

Ասոնք դիւրաւ կը ճանչցուին իրենց քուրայի գլխով, քոմէ դունչով: Շատ զօրաւոր եւ մեծ կրծող ակունքներ ունին. ոտքերը՝ 5 մատով. ետեւի ոտքերու մատերը լողամորթով միացած են, լայն, տափակ, թեփոտ պոչ մ'ունին:

30. Կոմբեր կամ շնչին (Castor fiber) մեծամեծ կրծող անասուններէն մէկն է, 0.80 հրճ. մեծ կ'ըլլայ. թաւ մուշտակ մ'ունի, որուն վրայ բուսած են երկտեսակ մազեր, ոմանք երկնիկեկ գորշ գունով, իսկ ոմանք բարակ եւ փայլուն ու բրդեայ մազեր են: Ետեւի ոտու ընները լողամաշկ



Պտկ. 67. Կուղը (1/2):


ունին, իսկ պոչը՝ լայն, տափարակ ու թեփոտ է: Աճուկին մէջ մնոտ պարկ մ'ունի, որուն մէջ դեղնիկեկ հոտաւէտ նիւթ մը կը գոյանայ, որ կոչւոյ՝ (castoreum) կ'անուանուի:

Կուղերը՝ Եւրոպայի, Ասիայի եւ Հիւսիսային Ամերիկայի գետերու ու ծովերու քովերը կ'ըլլան, եւ բնական վեճակի մէջ բնկերութեամբ կ'ապրին, կրծած ոստերէն եւ մէկ ոտք հաստ մատաղ ծառերէն՝ իրենց հասարակաց եւ կոնսմեւ բնակարանները կը շինեն, եւ որպէս զի ջրոյ հոսանքն այս բնակարանները չկործանէ, անոնց առջեւը նոյն ձեւով թմբեր կը կանգնեն:

Երբեմն արտաքոյ կարգի ամբաշէն կ'ըլլան այս տները, որովհետեւ շինելու ատեն քար, ցեխ եւ եղէգ կը գործածեն: Կուղերը մատաղ ծառերու եւ ցախերու տերեւներովն եւ կեղեւներովը կը կերակրին, ամառն առանձին առանձին փանց քով գտնուած ծախերու մէջ կ'ապրին, հազիւ ձմեռը հասարակաց բնակարանը կը դառնան: Իրենց մուշտակին եւ իրեւ գեղ գործածուող հեղանիւթին համար՝ այնչափ շատ կ'որսացուին որ Եւրոպայի մէջ արդէն դժուարագիւտ եղած են, նոյնպէս Սիբերիա դեռ-դեռ կը նուազին: Հիմա Հիւսիսային Ամերիկա դեռ շատ կը գտնուի, ուստի ամէն տարի 150000 մուշտակ կը բերուի Լոնդոն, եւ հրապարակական աճուրդի մէջ կը ծախուի:

ՅԵՂ Գ. ՄՈՐԻՆԱ (Murina)

Մինչեւ՝ սուր եւ նուրբ գլուխ, սրածայր դունչ եւ նեղ ճակատ ունին, ազատ մատուրներ, լերկ եւ կամ քիչ մազոտ ականջներ եւ ցանցառամազ պոչ մը. մազոտ թաթերուն առջեւինները 4 մատ, իսկ ետեւինները 5 մատ ունին: Ստորերկրեայ կեանք կ'անցընեն, արագ արագ կ'աճին:



Պտկ. 68. Տան մուկը (1/2):

31. Ցան հո—կը (Mus musculus) մոխրագոյն սեւ գունով է, իսկ երբեմն բոլորովին ճերմակ. պոչը գրեթէ լերկ ու թեփոտ է, եւ մեծ՝ ու գլխուն վրայ ծռած, ականջներ ունի: Մարմինը՝ բարակ, վրայէ վրայ կպած, եւ կարճ մազերով ծածկուած է: Մեծութիւնն է 0.09 հրժ.:

Հասարակ մուկը ամէն տեղ մարդու բնակարաններու մէջ կը գտնուի, եւ կամայ կամաց աշխարհիս չորս կողմը տարածուեցաւ, որովհետեւ առանց մարդուն կամացը՝ ամէն տեղ մարդուն կը հետեւի: Ծակ ու փապարներու մէջ կը բնակի, նոյն իսկ տախտակամած պատերը եւ որմերը կը ծակէ, եւ թէ՛ տնկային եւ թէ՛ կենդանական ամէն ուտելի կերակուրները կը կրծէ, եւ ասով բազմացած ատենը անտանելի ու վտանգաւոր կ'ըլլայ: Եզը տարին 3—4 անգամ՝ 4—8 ձագ կը բերէ, որոնք առաջին տարին իսկ կը ձգնեն. կրնայ շատ դիւրաւ գուշակուիլ թէ ինչ կը գառնար տուն մը, եթէ կատուները չջնջեն այս գարշ կենդանիները:

32. Շէկամո—կը կամ Թափառամո—կը (Mus decumanus) լերկ, թեփոտ՝ մարմնէն աւելի կարճ պոչ մը եւ խարտեաշ մորթ մ'ունի, իսկ ականջները հազիւ մարմնոյն երկայնութեան երեքին մէկին չափ մեծ են:

Այս մեծ մուկը՝ հիմայ ամէն տեղ Եւրոպայի մեծամեծ քաղաքներու մէջ տարածուած է, թէպէտ եւ մինչեւ անցեալ դարու մէջերը դեռ հոս չկար: Այս մուկը բոլոր մկներէն ամենաշնասակարն է, ամէն ուտելի բան կ'ուտէ եւ շատ քաջ կը լողայ:

1727ին մեծ երկրաշարժի մը պատճառաւ Ասապից ծովու կողմերէն ելլելով եւ Վոլգա գետէն անցնելով Եւրոպա եկած է եւ նաւերու մէջ մտնելով՝ աշխարհիս չորս կողմը տարածուած է: Պարիս կղանոցներու մէջ այնչափ կը բազմանայ, որ մարդիկ կը ստիպուին գործիքներով ու կափուրներով որսալ: Մորթը ձեռնոց չինելու կը գործածուի: Յառաջագոյն՝ ասկէ քիչ մը պզտիկ մուկ գորշ գունով Միշ ըստի հո—կը (Mus rattus) ամէն տեղ տարածուած էր. բայց թափառամկէն կը հալածուի, այնպէս որ հիմայ շատ ցանցառ կը գտնուի:

Յիշատակուելու արժանի են Դաշտահալը (*Arvicola arvalis*), Ջրահալը (*Hypudaeus amphibius*) եւ Լեռնահալը կամ Նոյնեթեան հալը (*Hypudaeus lemmus*): Վերջինս

նշանաւոր է իւր ըրած երկայն ճամբորդութիւններով: Ամէն տարի դարնան այսպիսի ճամբորդութիւններ կ'ընէ նոյնպէս՝ Սիրերիայի Գերբախէ՝ ըստած միան տեսակը: Եւ որովհետեւ կզերէն, սամպրներէն, աղուէներէն եւ ասնց նման անասուններէն կը հալածուին, անոր համար որսորդներն ուրախութեամբ կ'ողջունեն ասոնց գալուստը:



Պտկ. 69. Նոյնեթեան մուկ (1/3):

Սաստիկ փնասակար մկներէն մէկն է Գերբախէի հալը կամ Հոմադիւրը (*Cricetus frumentarius*). Թափառական մկան մեծութեամբ ու ձեւովը կ'ըլլայ, բայց կարմրագեղն գոյն մ'ունի, կարճ ու մազոտ պոչ մը, եւ վզին քովէն սկսեալ մինչեւ ուսերը տարածուող այտի պարկեր ունի:

ՑԵՂ Դ. ՓՅՈՑ ԽՈՋՈՒԿՆԵՐ (Aculeata)

Ասոնց ծանուցիչ նշաններն են, լեցուն եւ գէր մարմին, կոնակը փշոտ, հաստ գլուխ, բութ դունչ, մանր ականջներ, կարճ սրունք:

33. Խաղալը (*Hystrix cristata*) 0.60 հրժ. մեծութեամբ դանդաղաշարժ կենդանի մըն է, եւ ոտուըններուն ծայրը փորելու ճիրաններ ունի:



Պտկ. 70. Խոջուկ (1/30):

Կոնակն խոզանացեալ մազեր, 0.30 մինչեւ 0.40 հրժ. երկայնութեամբ՝ մութ գորշ եւ ճերմակախառն օլակաւոր փշեր ունի, իսկ պոչին վըային-

ներն աւելի կարճ են, իսկ ծայրերը՝ բաց. այս պոչի փշերն իրարու քսելով տեսակ մը շշուկ կը հանէ:

Ըստ բաւականի ծոյլ կենդանի մըն է, ինքնափոր խոռոչներու եւ կամ մացառներու տակ առանձինն կը բնակի եւ խոզի նման կը խանչէ: Հարաւային Եւրոպայ՝ բայց գլխաւորաբար Ափրիկէ, ընտանի անասուն մըն է. միսը կ'ուտուի. փշերը՝ զորոնք կը տնկէ բայց չի կրնար նետել, նկարչաց վրձիններու կոթ եւ կամ գրչակալ շինելու կը գործածուին:

ՅԵՂ Ե. ՆԱԳԱՍՏԱԿՆԵՐ (Leporina)

Նապաստարաններն անհաւասար երկայնութեամբ ոտքեր ունին, առջեւի ոտուրները՝ 5, իսկ ետեւիները՝ 4 մատերով. վերի շրթուներն ճեղքուած է, եւ վերի կզակներու կրծող ակուններուն ետեւը՝ ուրիշ երկու հատ ալ կտրող ակուններ ունին, տարգալձեւ մեծ, մազոտ ականջներ, թանձր փափուկ մազոտ մորթ:




Պտկ. 71. Հասր. նապաստակ ($\frac{1}{10}$) (վերինը), ծագար ($\frac{1}{8}$) (վարինը):

34. Հասարակ նապաստակը (*Lepus timidus*) կռնակի կողմը գորշ-կեկ մոխրագույն, իսկ փորին կողմը ձերմակ է: Ախանջները գլխէն աւելի երկայն են եւ ծայրը սեւ: Աչուրները մեծ են, իսկ կոփքերը նեղ են եւ ամբողջ աչքը չեն կրնար ծածկել. ետեւի ոտուրներն՝ առջեւիններէն շատ աւելի երկայն են, պոչը՝ որուն տակի կողմը ձերմակ իսկ վրայի կողմը սեւ է, դէպ ի վեր դարձած է:

Հասարակ նապաստակը գրեթէ ամէն կողմ դաշտերն եւ անտառները կը բնակի, եւ մինչ ու մուշտակին համար որսորդաց գլխաւոր որսն է: Եթէ շատ բազմանայ կամ ձմեռը սաստիկ ըլլայ, ցորենեղէններն եւ անտառի մատաղատունիկներ կը ծելով շատ փնաս կը հասցընէ: Նապաստակին յատկութիւնն է բաց աչքով քնանալ, եւ որովհետեւ բոլորովին անզէն է, վերահաս վտանգէն ազատելու համար հնարք մ'ունի, որ է — փախչել: Ալպեան լեռանց վրայ Ալշեւն Նապաստակ (*Lepus variabilis*) ըսուած նապաստակներ կան, որոնք ձմեռը մինչեւ ականջներուն ծայրը բոլորովին կը ձերմկնան: — Այս ցեղին տակ կ'երթայ ճագարը՝ (*Lepus cuniculus*) որ ճիշդ նապաստակին կը նմանի, բայց անկէ փոքր է: Հոս յիշատակուելու արժանի է՝ Մչլահաւը:

Մարմնոյն կազմաւորին կողմանէ կղբին շատ կը նմանի, բայց հազիւ ճագարի մը չափ մեծ կ'ըլլայ Հիւսիսային Ամերիկայի Մչլահաւը (*Fiber Zibethicus*): «Մուշկ» ըսուած մուշտակը՝ մութ դեղին գունով բուրգ մ'ունի, որուն վրայ մութ գորշ գունով մազեր կան: Եղէգնուտ ծովերու եւ ափունքներու քով արմատներով կը սնանի, եւ իւր բնակութեան համար խոռոչներ կը փորէ եւ կամ կաւէ կաղաղներ կը շինէ:

35. Եգիպտոսի ճագարահաւը կամ ցափաղ հաւը (*Dipus Aegyptius*) երկայն եւ ծայրը փնջաձեւ պոչ մ'ունի, իսկ ետեւի ոտուրները՝



Պտկ. 72. Ճագարամուկ (Դ):

առջեւիններէն 6 անգամ աւելի երկայն են: Հիւսիսային Ափրիկէի անապատներու եւ Ասորոց ու Արաբիայի գաւառներու մէջ կը գտնուի. արտաքոյ կարգի դիւրաթեքութեամբ մինչեւ 3—4 մետր հեռաւորութեամբ կը ջատկէ:


Ուրիշ նշանաւոր կրծող կենդանիներէն մէկն ալ Հասարակ Ծով-
խոնիրն (*Cavia cobaya*) է: Սմբականման ըղունդներ ունի, Ամերիկայէն
յառաջ եկած է, Եւրոպա ամէն տեղ իբրեւ զուարթ եւ շուտ բազմա-
ցող առտնին կենդանի մը կը պահուի:

ԿԱՐԳ 7. ՊԱՏԻՃԱՆՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ (Proboscidea)

Պատիճաւորները ցամաքի ամենամեծ եւ հսկայ կենդանիներն են,
նշանաւոր են իրենց պատիճի փոխուած քթովն ու վերի շրթունքով:
Այս պատիճը ջուր ծծելու եւ իրրեւ զէնք կը գործածէ կենդանին: Ա-
հագին գլուխը կարճ վզին հետ միացած է, իսկ ափսոսանքը մեծ ու ծանր
են: Հաստ ու ցանցաւորաւոր մորթ մ'ունին: Սրունքները սիւնաձեւ, իսկ
մատուղները 3—5 սմբակով պատած: Մի միայն ցեղ մը կայ այս կար-
գին տակ:

ՅԵՂ ՓՂԵՐ (Elephantina)

36. Հնդիկ փղը (*Elephas indicus*) ամենամեծ ցամաքային կաթ-
նատու կենդանին է: Խոշոր մարմինը՝ որ ի սկզբան անդ շատ անճոռնի



Պտկ. 73. Հնդիկ փղը (1/45):

կ'երեւայ, կարճ եւ սիւնաձեւ ոտուղներուն վըայ կը հանգչի: Առջեւի
ոտուղները հինգ սմբակապատ մատ ունին, իսկ ընդհակառակն ետեւին.

ները՝ չորս: Թանձր եւ գորշ մորթին վրայ հազիւ ասդին անդին քանի մը խողաններ կան: Մեծ գլուխը մարմնոյն հետ կապուած է կարճ վզով մը. երկայն վար կախուած ականջներ եւ համեմատաբար պզտիկ աչուներ ունի: Վերի կզակէն 2 երկայն ժանիքներ վար կը կախուին, որ փղոսկր կ'անուանուին: Սովորաբար կենդանին 3 մէտր երկայն եւ 4000 քիլոգ. ծանր կը կշռէ: Մէկ ժանիքը միայն սովորաբար 30—40 քիլոգ. կը կշռէ, բայց նաեւ 60—80 քիլոգ. ծանրութեամբ եւ 2—3 մէտր երկայնութեամբ ալ կը գտնուի:

Հնդկափիղը մասամբ ընտանեցած եւ մասամբ վայրենի վեճակին մէջ հարաւային Ասիայի եւ մերձակայ մեծամեծ կղզեաց վրայ կը գտնուի: Ամէն տեղ ջրերու քով անտառաշատ տեղեր կ'ընտրէ իւր բնակութեանը համար. խոտով, տերեւներով, արմախենքերով, բայց ամէնէն աւելի պտուղներով եւ քաղցրահամ տնկերով կ'ապրի:

Իւր պատիճն ամէն բանի կը ծառայէ, Թէ շնչառութեան Թէ իւր կերակուրը եւ ուրիշ բաներ բռնելու, Թէ խմելու եւ Թէ նաեւ իրեւ գէշը՝ ինք զինքը պաշտպանելու: Արեւայ այս պատիճը 2 մէտր երկնցքէն, կրնայ փնջել 0.60 հրժ. ի չափ ներս ամփոփել եւ կամ ժամացուցի մը զոպանակին պէս գալարել: Պատիճին ծայրի յաւելուածովն՝ իւր պատիճը ձեռքի մը ձեռք կ'առնու: Այս պատիճն ուրիշ բան չէ, եթէ ոչ երկնցած քիթ մը: Փիղերն իրենց ժանիքովը շատ օգտակար են, շատ դիւրաւ կ'ընտանենաւ եւ բռն տանելու եւ որսի եւ ուրիշ բազմապատիկ ու զարմանալի ճարտարութիւններ ընելու կը վարժին: Յառաջագոյն նաեւ պատերազմի ալ կը գործածուէին: Նախ եւ յառաջ Դարեհ՝ այս անասնոց կռնակին վրայ փայտեայ ամբարտակներ շինելով պատերազմ մէջ, բայց հռոմէական պատերազմներու մէջ ալ կը գործածուէր: Փիղը կ'որոսն ցանցերով, ցանկերով եւ փսներով, բայց աւելի եւս՝ արդէն ընտանեցած փիղերով: Բայց որովհետեւ գերութեան վեճակին մէջ չեն բազմանար, հարկ է մշտ նոր փղեր որսալ եւ ընտանեցնել:

Ափրիկէի փիղ (Elephas africanus) ըստածին գոյնը թուի է: Ականջները լայն եւ մեծ են, ամէն մէկ ոտքը չորս չորսական մատուրներ, ազօրիք ակուաներուն վրայ ալիւնաւոր շերտեր եւ պատիճին ծայրը 2 հատ մատնաձեւ յաւելուածներ ունի: Հին ժամանակները հիւսիսային Ափրիկէ ալ կ'ապրէր, կ'ընտանեցընէին եւ պատերազմի կը գործածէին: Հիմայ հոս նոյնպէս Ասիական գոյրովին ջնջուած սպառած է, եւ միայն Ափրիկէի մէջերը ըստ բաւականի շատ կը գտնուի եւ իւր ժանեացը համար կ'որոսան զինքը: — Յիշատակութեան արժանի է Էֆն Փաշայի փղոսկրեայ ժողովածոյքը:


ԿԱՐԳ 8. ԴԱՐԱՍՄԲԱԿ (ՋՈՒԳԱՄԱՏ ՍՄԲԱԿԱՆՈՐՆԵՐ) (Artiodactyla)

Դարասմբակ կը կոչուին այս կենդանիները վասն զի 4 հատ սրմբակապատ, հաւասարաչափ մեծ մատեր ունին. ասոնց ատամնաշարը զանազան կազմութիւն ունի եւ մեծաւ մասամբ ամբողջ է: Ոմանք իրենց հաստ, ուռուցիկ եւ քիչ անգամ խողանով ծածկուած մորթին համար նաեւ Թանձրամորթներ (Pachydermata) ալ կ'ըսուին: Երկու գլխաւոր մասի կը բաժնուին, Զարմաղ եւ Որմաղ դարասմբակներ:


Ա. Չորրոնող դարասմբակներ (Art. non rumantia):

ՅԵՂ Ա. ԽՈՋԵՐ (Suida)

37. Ընտանի խոզ (Sus scrofa domestica) դանդաղաշարժ մարմին մ'ունի, կռնակին սուր խողանները շատ երկայն եւ կարծր են: Չորս



Պտկ. 74. Ընտանի խոզ (1/18):




Պտկ. 75. Վարազ (վայրենի խոզ) (1/18):

մատուռներով ոտքեր ունի, այս մատուռները եղջերային պատեանով մը (= սմբակով) պատած են, բայց կենդանին միայն միջին 2 մեծ կճղակներով կը քալէ: Մերկ եւ կռճիկեայ կնճիթ մ'ունի: Մեծ շնային ակռաները (թանիթ) բոլորովին առջեւի կողմը ծռած են եւ բերնէն դուրս կը ցցուին: Ասկէ զատ ամէն մէկ կղակին վրայ 6 հաս շեղ կեցած առջեւի ակռաներ եւ 7 ական ալ աղօրիքներ ունի:

Ընտանի խոզը յառաջ եկած է վայրենի խոզէն. կեղտոտ կենդանի մըն է, որ շատ սիրով ցեխերու, տիղմերու մէջ եւ աղտոտ տեղեր կը թաւալի, բայց շատ ալ օգտակար է, պահելն արտաքոյ կարգի դիւրին է, շատ կը բազմանայ եւ մեծ զատ նաեւ խոզաններ եւ պարարտ ճարպ կու տայ: Վայրենի խոզը (*Sus aper*) սեւ գորշ գունով է, ճահճային անտառները կը բնակի, կաղնիներ եւ բոստանեք գտնելու համար գետինը փորելով շատ մնաս կը հասցընէ, շատ կատաղի եւ քաջասիրտ է, բայց հիմայ շատ չի գտնուիր: Վայրենի խոզին էգը՝ Կինճ, արուն՝ Վաշ, իսկ ձագերը՝ Վարդակոյրէն (խոճկոյր) կ'ըսուին: Վայրենի խոզերը կարծր մարմին մը, ուղղաձիգ ականջներ, եւ ընտանի խոզերուն պէս ամուր սրուններ եւ ժանիքներ ունին: Խոզերը (խաւահէր) կ'ըսուին:

ՅԵՂ Բ. ԶԻՆԻՍՏՈՍԻՍ (Hippopotama)

38. Զիաֆեօին (*Hippopotamus amphibius*) մեծամեծ եւ դանդաղ ցամաքային կենդանիներէն մէկն է, քառակուսի մեծ գլուխ մը եւ պզտիկ աչուրներ ու ականջներ ունի, զարհուրելի ցուռկ մը, կարճ վիզ



Պտկ. 76. Զիազեստի (1/32):



եւ վար կախուած պոչ. լայն իրանը՝ կարճ եւ չորսմասնեան ոտուրներուն վրայ կը հանգչի: Երեք միւշեւ 5 հրճ. թանձր եւ լերկ մորթ մ'ունի, որ հրացանի գնդակին կրնայ դիմանալ: Վարի շնային ակռա-

ները ժանիքի պէս դուրս ցցուած են, նոյնպէս 4 հաստ կտրելու՝ 2 կողմը Պահան ալ ծամելէք ունի:

Ափրիկէի մեծամեծ գետերը կ'ապրի, բայցՆեղոս գետին մէջ՝ ուստի առեալ նաեւ Նեղոսի յէ ալ ըստեած է, այլ եւս չի գտնուիր: Մշտապեւ բնակութիւնը գրեթէ ջուրն է, եւ կամ եղեգնուտ ափունքը: Գլխաւորաբար ջրային տնկերով կը սնանի: Գիշերը մօտակայ տնկարկութիւնները կ'այցելէ եւ մեծ փնաս կը հասցընէ: Իւր համեղ մսին, ճարպին եւ իւր հաստ մորթին համար՝ որմէ մորակ կը շինուի, նոյնպէս փղսկրանման ժանիքներուն համար, շատ կ'որսացուի:

Բ. Որոճողներ (A. ruminantia):

Որոճողներու մարմինը նուրբ եւ երկայն է սովորաբար, իսկ գլուխը՝ համեմատութեամբ պզտիկ է. ականջներու վարի մասը խողովակաձեւ փակուած է, իսկ շեղ, ձուաձեւ բիբերով աչքերն երկու կողմն են եւ ոտերեայ խոռոչներու մէջ: Վարի կզակին վրայ 6—8 թիակի նման կտրող ակռաներ ունին, իսկ վերը կզակին վրայ սովորաբար ամենեւին ակռայ



Պտկ. 77. Ոչխարին ստամոքսը:

ա) Որկոր (ստուգն). բ) Հազարթերթիկ. գ) Յանցիկ կամ Յանց. դ) Գանձակ. ե) խախացոց. զ) Աշիք: Կերակրոյն՝ ստամոքսի մէջէն ըրած բնթացքը այս է. նոր առնուած սնունդը — էն կը սկսի եւ դ ու էէն անցնելով դարձեալ — բերանը կու գայ: Որոճալէն ետքը բէն եւ էէն կ'անցնի եւ դէպ ի շ կ'երթայ:

Պտկ. 78. Նոյսը (մէշտեղէն բացուած):


ա) Հազարթերթիկ. բ) խախացոց. գ) Յանց. դ) Գանձակ: Իսկ ստոր մէջ այսպէս նշանակուած է. որկորէն կ'անցնի դ եւ է. բերանը կու գայ եւ յետոյ՝ երկրորդ անգամ — էն եւ բէն անցնելով կ'երթայ աղիքը:

չեն ունենար. կողմնական ակռաները մեծաւ մասամբ կը պակսին, իսկ երկու կզակին վրայ ալ երկու կողմը միշտ ճական աղօրիքներ ունին: Որոճող կ'ըսուին, վասն զի մէյ մի կլլած կերակուրը նորէն ծամելու սեպահան յատկութիւն մ'ունին: Ասոնց ստամոքսը չորս մասի բաժնուած է: 1- — չմամած կերակուրը նախ եւ առաջ կ'երթայ առաջին ստամոքսը որ Գանձի կ'ըսուի. անկէ ալ երկրորդ փոքրագոյն կլորիկ ստամոքսը կ'երթայ, որ ցանցակերպ երակներով զարդարուն երես մ'ունենալով Յանցիկ կամ Յանց կ'ըսուի: Ասոր մէջ կերակուրը մանր գնդակիկներու փոխուելով՝ կենդանին շատ գիւրաւ կրնայ բերանը բերել՝ երկրորդ

չէ, երբեմն գորշ, երբեմն ճերմակ, սեւ եւ կամ բծաւոր: Ճակատը տափակ երկայն ու նեղ է, որուն վրայ զոյգ մը կլոր եւ ողորկ սնամէջ եղջիւրներ բուսած են, որոնք իրարմէ շատ հեռու կը կենան, բայց մեծութեամբ ու ձեւով իրարու կը նմանին: Թանձր ու հաստ ցուկին առջեւի կողմը լերկ ու խոնաւ է, եւ քթի մեծ ծակեր ունի: Վզին տակը մորթ մը կը կախուի, որ Բլնի կ'անուանուի: Պոչին ծայրը մազէ փունջ մը կայ: Ամէն մէկ ոտքին ծայրը երկ երկու սմբակով ծածկուած մատուրներ կան եւ ասոնցմով կը քայլէ, իսկ ետեւի կողմը 2 հատ ալ բարձրկեկ գիբքով կեցած պզտիկ մատուրներ ունի:

Ընտանի արջառն իւր բազմաթիւ տեսակներով՝ բաց ի բեւեռային երկիրներէն, աշխարհիս չորս կողմը տարածուած ընտանի անասուն մըն է, որուն տածումը խոտաշատ գաւառներու մէջ շատ կարեւոր է:

Անդամութեանը ժամանակ իւր զօրութեամբ բեւ քաշելով մեծ օգնութիւն կը մատուցանէ. նոյնպէս իւր կաթովն ալ, որմէ դարձեալ կոգի եւ պանիր կը շինուի: Ասկէ զատ միտը, մորթը, եղջիւրներն եւ ճրագան օգտակարապէս պիտեայլ բաներու կը գործածուին: Գերմանիա գլխաւորաբար Ապեան լեռանց քովերն եւ Հունգարիայի ընդարձակ բացատտաններու վրայ կը գտնուին արջառները: Շատ նշանաւոր են արեւելք՝ Եգիպտոսի կարմիր կովերն, որոնք մինչեւ 18—22 լիտր կաթ կու տան օրը: Աւստրիայի գիւղերուն գրեթէ ամէն աղքատ տներու մէջ կաթնազառութիւն կ'ընեն: — Հունգարիայի եւ Բուկովինայի լայնահաս դաշտավայրերը խեղճ աղքատ անգէորդներ եւ կովարածներ՝ որոնք միայն եղեգէ շինուած բնակարաններու մէջ կը բնակին, բռնաձիգ անասուններ կը բուծանեն. իսկ Արեւելք յայտնի են կառաձիգ երկայն եղջերաւոր մօխազոյն եղներն: — Հարաւային Ամերիկէի Պամպան եւ Լանոս դաշտերու վրայ վայրենի Ալբաներն՝ երամակներ կ'արածին, որոնց միայն մորթն եւ եղջիւրներն, իսկ վերջի ատեններս (Ուրուգուայ) նաեւ միսն ալ կը գործածուին: — Արեւելեան Հնդկաստան Զեբուսը՝ բուսած ցուլ մը կը գտնուի. որուն կռնակին վրայ ճարպէ սապատ մը կայ:




Պտկ. 80. Գովէշ (1/40):

40. Արեւելք եւ Հարաւային Եւրոպա գործածուած Գովշը (Bos bubalus) Արեւելեան Հնդկաստանէ յառաջ եկած է:

Գոմէշը զօրաւոր բայց նաեւ վայրենի եւ ֆնաստկար կենդանի մըն է, քիթէն անցուած ցռկակապով հազիւ կը զսպուի: Կապեան Գոմէշն ասկէ աւելի զօրաւոր եւ վայրենագոյն է, եղջիւրներուն արմատն արտաքոյ կարգի հաստ է:

41. Յիշատակուելու արժանի է Բիսոնը (Bos bison):

Այս անասունն Հռոմայեցւոց՝ Bonasus = Բանաս անուամբ ծանօթ էր, իսկ միջին դարու մէջ Բիսոն (Bison) ըսուեցաւ: Տլաւյըն (Bos urus) մեր հասարակ ցուլին նախնական տեսակէն է, բայց հիմայ սպա-



Պտկ. 81. Բիսոն (1/33):

ռած է: — Անորոշեալ կամ Ամերիկէի Բիսոնը (Bos americanus) վայրենի գոմէշէն քիչ մը պզտիկ է, եւ մարմնոյն առջեւի կողմը երկայն գանգրաւոր մազեր, եւ կռնակին վրայ ճարպէ սապաւո մ'ունի: Հազարաւորներով հիւսիսային Ամերիկէի մարգագետիններու վրայ կ'ապրի, բայց երթալով կը սպառի, վասն զի համեղ մսին եւ յարգի մորթին համար շատ կը հալածուի: Հնդկաստանցւոց ամէնէն օգտակար որսն է:

42. Ընդանի ուլեար (արոն՝ խոյ [խոյ մալեալ]. էգը՝ Մառի. յագը՝ Ուրօլ, Գառն, Բոթ (Ovis aries) խղնձեւ ուլորուած, իսկ երկու կողմը ճնշուած անկիւնաւոր եղջիւրներ ունի, որոնց վրայ անկանոն շեղ հանգոյցներ կան: Ծնօտը մօրուք չունի, մազն երկայն խողաններ չունի, այլ խիտ, կարճ եւ գանգուր կամ ըւրդ է:

Ընտանի ուլեարն երկրիս ամէն կողմը բնտանեցած կը գտնուի, բայց բազմաթիւ տեսակներ ունի, որոնք իրարմէ կը զանազանին իրենց մեծութեամբը, եղջիւրներուն թուովն եւ գալարումներովը, գլխուն ականջին եւ պոչին կազմուածքովը, եւ վերջապէս բրդին գունովը, խտութեամբը, բարակութեամբը եւ երկայնութեամբը: Ամէնէն բարակ եւ ազնիւ բուրգը՝ Միլիարը կամ Սպանիական ուլեարը կու տայ, որ

Հաւանականորաւ Ափրիկէէն Սպանիա բերուեցաւ, եւ ծովու վրայէն բերուելով Transmarinus = Անդրծովեայ եւ Մերինոս անունն առաւ: Դժակաւ կամ կ'ըրբ-եւ յիշին որ ծանր ճարպոտ դմակ մ'ունի, հա-



Պտկ. 82. Ընտանի ոչխար, խոյ եւ մարի (1/10):

բաւային Ռուսաստան, Հայաստանի գաւառներն ու Հիւսիսային Ափրիկէ կը գտնուի: Կեղեցիկ, սեւ կամ գորշ, փայլուն խոպոտիկ կամ գանգուր մորթ մ'ունի, որ Ասորական (Աժտէրկան) անուամբ ծա-

նօթ է:

43. Ընտանի այծը (արոն՝ Նոթալ, ֆալ, ֆօշ, յաֆը՝ ուլ. = արոն յաֆը՝ Աֆի, էֆը՝ Ալլ. Capra hircus) մանգաղաձեւ, դեպ ի



կոնակը գալարուած, երկու կողմը (նրբացած) երկայրի եղջիւրներ ունի, որոնք ըստ բաւականի ողորկ են, եւ միայն առջեւի կողմը յայտնի հանգոյցներ ունին: Մազը երկայն ու պիւրկ է, իսկ ծնօտը՝ մօրուք մ'ունի:

Ընտանի այծն ալ բազմաթիւ գանազան տեսակներ ունի: Հասարակ այծերը հաստ ու կարճ մազեր ունին, բայց համբաւաւոր՝ կոշիւրի այծն, ինչպէս նաեւ երեւելի՝ Անգիլիայի այծն, երկայն, մետաքսաթեւ արծաթա-

Պտկ. 83. Այծ (1/10):

ԿԵՆԴՐԱՆՈՐԱՌՈՐՆԵՐ

գոյն սպիտակ մազեր ունին, որոնցմէ բարակաման եւ ծանրագնի Յփիններ (= Շալեր), եւ զգեստներուն ծայրը բրդեայ ծոփեր, եւ ձեռնամուշտակ եւայլն եւայլն, կը շինուին: Միայն անօտը խոտ բուսած տեղեր, գլխաւորաբար լեռնային կողմեր, կը պահեն այժն աւելի կաթին եւ մորթին, քան մինչ համար:

44. Այծփաղը (*Capra ibex*), կարճ, պառկած մազերով ծածկուած է, կոնակի կողմը մոխրագոյն խարտեաշ, իսկ փորին կողմը ճերմակ է, ծնօտն ալ անմօրուս: Մեծ ու ծանր եղջիւրները պարզ եւ դէպ ի



Պտկ. 84. Այծփաղ (1/30):

կոնակը ծռած են, երկու կողմը ճնշուած եւ առջեւի կողմը կլորացած են, որոնց վրայ 14—16 կողմնական հանգոյցներ կան:

Այծփաղը հիմաւ շատ քիչ կը գտնուի, միայն Պիէմոնտէի Ալպեան լեռանց եւ Մոնբլանի հարաւային կողման անմատչելի տեղուանքը կը գտնուի: Շատ քիչ անգամ գաշտերը կ'իջնայ, եւ անհաւատալի դիւրաթեքութիւն, զօրութիւն եւ երագութիւն ունի: Այծփաղի տեսակներէն մէկ քանի հատն ալ Պիւրբենեան, Վաւկատեան, Տաւրոսի լեռանց վրայ եւ Սիբերիա կը գտնուին:



45. Վերինին քիչ շատ կը նմանի Գարայծը կամ Պիլ-բենեան Լիւնայծը (Antilope rupicapra), որ շիտակ եւ ուղորկ եղջիւրներ ունի, որոնց ծայրը կեռ եւ դէպ ի ետեւ կորացած է:

Գարայծը խումբ խումբ Ալպեան լեռանց ձիւնապատ դաշտերու մօտ կը բնակի: Շատ զգուշաւոր կենդանի մըն է, խոտ ծարակելու ատեն պահապան մը կը դնէ, որ սրնգի նման ձայնով մը վտանգը կ'իմացընէ: Ստուգիւ զարմանալի է քարայծներու յաջողակութիւնն ու երազութիւնը անդունդներուն վրայէն կը ցատկեն կ'անցնին եւ սեպացած քառաթայռերու վրայ կը մագլեն կ'ելեն:

Պտկ. 85. Զարայծ (վտանգը կը դիտէ) (1/30):



Պտկ. 86. Վիթ (1/4):

46. Վիթը (Antilope Dorcas). Այծեամի մեծութիւն եւ

գեղեցիկ նուրբ կաղամած մ'ունի: Առնակի կողմը բաց դեղին, իսկ փորին կողմը ճերմակ է: Գլխուն վրայ 0.18 հրժ. երկայն եղջիւրներ ունի, որոնց տակի կողմն օղակաւոր, իսկ վրայի կողմը ողորկ է. այս եղջիւրները քնարաձեւ իրարու դարձած են: Մեծ ու վառվռուն աչուրներուն տակն են արտասուաց աման կամ ականոյթ ըսուած խողովները: Շարժական ականոյթները սրածայր են, իսկ կարճ պոչին ծայրը մագլէ փունջ մը կայ:


Վիթը մեծ բազմութեամբ հիւսիս-սիւային Ափրիկէի եւ Արաբիայի անապատները կը բնակի: Շատ վախկոտ եւ փախչող բնութիւն մ'ունի, եւ չէ թէ միայն մարդիկներէ, այլ նաեւ ինձերէ ու յովազներէ ալ կ'որոտացուի: — Ասիայի ջերմագոյն գաւառները, գլխաւո-

•*

րաբար Ափրիկէ, բայց նաեւ փոքր Ասիայի անտառները զանազան տեսակ վիթիւ եւ Յամայրներ կան, որոնք մեծութեամբ եւ կազմածքով իրարմէ կը տարբերին, եւ իրենց հեզ բայց վախկոտ բնութեամբը, նրբաւարտ եւ թեթեւաշարժ մարմնովն եւ ողորկ պառկած մազերով եղջերուներու կը մերձենան, բայց իրենց եղջիւրներովը՝ որոնք միշտ կը մնան եւ չեն թափիր, ասոնցմէ կը զանազանին:

ՑԵՂ Բ. ԵՂՋԵՐՈՒՆՆԵՐ (Cervida)

Եղջերուներն երկակիձղակ եղջերաւոր անասուններ են, ճակատին վրայ ստեղնաւոր, ոսկրի նման յաւելուածներ ունին, որոնց մէջը սնամէջ չէ (վիթիւ կ'անուանուին). ասոնք ամէն տարի կը թափին, եւ (բաց ի վարդեղէն) միայն արուներն ունին: Այս եղջիւրները՝ ճակատի ոսկրին վրայ եղած մասնաւոր ուռեցքներուն վրայ կը բուսնին, որոնց արմատը կամաց կամաց կը չորնայ եւ այսպէսով կը քակուի կ'իյնայ: Ասոնց իյնա-




Պատկ. 87. Ագնիւ եղջերուի գլուխը:

լէն ետքը նոր ու մեծ եղջիւրներ կը կազմուին, որոնց մէջ ի սկզբան անդ շատ մը արեան երակներ կ'ըլլան եւ աղու ամազ մազերով ծածկուած են: Մատաղ կենդանեաց եղջիւրները պարզ ցիցեր են, ետքէն երկձիւղ բաժնուած կ'աճին, եւ ամէն մէկ տարի ստեղն մը կամ ոստ մը կ'աճի: — Եղջերուները խաղաղասէր եւ խոտաճարակ անասուններ են, բայց այնպէս երկչոտ եւ խուսափու են, որ՝ վարդեղն ի բաց առնելով, երբեք ընտանի անասնոց պէս չեն զգոնանար:

47. (Ագնիւ) Եղջերու (վիթիւ) (Cervus elaphus), ամառը կարմրեկեկ խարտեաշ կ'ըլլայ 125 հրճ. երկայն պոչ մ'ունի: Աչուրներուն տակը 2—3 հրճ. խոր ականոցիւ մ'ունի, եւ յատուկ նիւթով մը լեցուած է այս խողովը: Արուն բազմաստեղն եւ դէպ ի ետեւ կորացած եղջիւրներ

ունի, որոնց բունը գալարուն կ'ըրր, իսկ ձիւղերը պարզ գլանաձեւ են, եւ փետրուարին կը թափին:


Եղջերուն Եւրոպայի եւ Միջին Ասիայի թանձրախուռն անտառներու մէջ խումբ խումբ կ'ապրի: Ամէն տեսակ բանջարեղէն, սունկ, տերեւ, փափուկ ճիւղեր եւ արմաթք կ'ուտէ եւ ասով երբեմն ֆնաս կը հասցընէ: Իսկ ուրիշ կողմանէ մասիւր, մորթովը եւ եղջիւրներովը շատ օգտակար է: Բազմաթեամբ զինքը որսալու կ'երթան որսորդներն եւ տեղիս տեղիս անասնոց պարտէզներուն մէջ ալ կը պահեն:



Պտկ. 88. Խաւարուղ (1/30):

Եղջերուն (Cervus dama), բայց եղջերունէն շատ պզտիկ է, ամառը սպիտակայտ կ'ըլլայ, իսկ եղջիւրներն երկայն եւ կլոր բուն մ'ունին, որուն ծայրը լայն է եւ ձեռքի պէս՝ բաժնուած: Ի սկզբան անդ հիւսիսային Ափրիկէ վայրենի կը գտնուէր, բայց հիմայ Եւրոպայի Զերմագոյն եւ բարեխառն գաւառներն՝ անասնոց պարտէզներուն եւ անտառներու մէջ կը պահուի իւր համով մսին համար:

48. Այծեֆնիկ կամ փոքիկ այծեֆնիկ (Cervus capreolus) ամառը գոյնը կարմիր, իսկ ձմեռը՝ կարմրեկեկ մոխրագոյն կ'ըլլայ: Արուն կարճ, ուղ-




Պտկ. 89. Այծեֆնիկ արուն, էգն ու ծագը (եղնիկը) (1/30):

ղաճիգ եւ սովորաբար երեքստեղնեան եղջիւր մ'ունի. այս եղջիւրն աշնան կը թափի, բայց ձմեռն ասոր տեղ ուրիշ կը բուսնի. պոչատ է:

Ասիայի եւ Եւրոպայի անտառները կ'ապրի. մինչ համար շատ յարգի է:

49. Վարգեղն կամ Հրնգեր (Cervus tarandus) միայն բեւեռային երկիրներ կը գտնուի. կառք քաշելու կը գործածուի:




Պտկ. 90. Վարգեղն ($\frac{1}{2}$ ս):



Պտկ. 91. Ումզղեղն ($\frac{1}{2}$ ս):

Ումզղեղն կամ Էւյշ-Ե-Յը (?) (Cervus alces) եղջերուներու մէջէն ամենամեծն է. իշու մը կամ փոքր ուղտի մը չափ մեծ կ'ըլլայ. 16-20 քիլոգրամ ծանրութեամբ եղջիւրներ ունի, որոնք մեծ ու լայն թի կը նմանին եւ բազմաձայր են: Հիւսիսային Եւրոպայի, Ասիայի եւ Ամերիկէի ընդարձակ ճահիճներու եւ անտառներու մէջ կը բնակի, բայց վարգեղնի պէս շատ հիւսիսային կողմերը չ'երթար: Յառաջագոյն թէ՛ վարգեղնը եւ թէ՛ էւյշեղնամբ Եւրոպա տարածուած էր:

50. Մշկայծեամբ կամ ճիւղապարտ պոչեամբ (*Moschus moschiferus*)
այծեմնիկի մեծութեամբ ու ձեւովը կ'ըլլայ: Ո՛չ եղջիւր եւ ո՛չ ալ ականո-



Պտկ. 92. Մշկայծեամբ (1/20):

ղիք ունի, այլ՝ ոտուրներու
բիւտեր: Արուն վերի կզա-
կին վըայ մեծ կողմնական
ականներ ունի, որոնք բեր-
նէն դուրս երկնցած են, եւ
պորտին ետեւը քսակ մ'ու-
նի, որուն մէջ եղոտ, սաս-
տիկ հոտաւետ մուշկ մը կը
ժողվուի, որ շատ բժշկա-
րար դեղ կ'ըլլայ:

Փոքր Ասիոյ սարաբարձը
լեռներու վըայ առանձինն կը
բնակի, շատ քաջ կը մագլէ,
եւ շատ վախկոտ ու փախչող
է: Իւր պատուական մուշկին
համար շատ կը հալածուի:

ՅԵՂ Գ. ՈՒՂՑԵՐ (Camelida)

Ուղտերն եղջիւր չունին, բայց շարժական հերձեալ վերի շըր-
թունք մը, չափազանց երկայն վիզ եւ երկու մատուրներով ոտուրներ
ունին (բայց բիւտ չունին): Սկզբնաբար միայն Ասիա եւ հարաւային Ա-
մերիկա կը գտնուէին, Ասիա՝ անապատներու մէջ, իսկ Ամերիկա՝ բարձրա-
բերձ եւ ժայռոտ լեռանց վըայ:

51. Արո-այիկ կամ Տաճիկ ուղտը (յագը՝ Կոլոն կ'անուա-
նուի) (*Camelus dromedarius*) ձիէ մ'աւելի բարձր եւ աւելի մեծ է:
Գրեթէ կունակին մէջ տեղը ճարպէ սապատ մ'ունի որ Կո-
լոն կ'ըսուի, բայց ոչ եղջիւր ունի եւ ոչ ալ վրիժակ: Վիզը երկայն ու կոր է
եւ վար կախուած մորթէ ծալք մ'ունի: Մարմինը՝ գանգուր, խար-
տեալ կամ գորշ եւ հասարակօրէն անհաւասար մագլերով ծածկուած
է, իսկ վըին, սապատին եւ աւջեւի ոտուրներուն վըայ եղած մագլերն
աւելի երկայն են: Արդէն պզտիկութեան ատեն կուրծքին եւ ծնկու-
րներուն վըայ կարծր փապարածներ (նաւթ) կ'ունենայ որ Կո-
լոն կը չուին: Ոտուրներուն ծայրը միայն երկու հատ իրարու կից մատուրներ
ունի, որոնց ծայրը պզտիկ կ՛ըլլան: Բայց ուղտերն այս կ՛ընեն
վըայ չեն կոխեր, այլ իրենց լայն, սկաւառականման մատուրներուն ներ-
բաններուն վըայ՝ որոնք նոյնպէս փապարած են:

Տաճիկ ուղտն Արաբացոց ամենակարեւոր տնային անասունն է, եւ
հարաւային Ասիայի եւ հիւսիսային Աֆրիկէի աւազային անապատներու

մէջէն ճամբորդութիւն ընելու եւ բեռ կրելու կը գործածուի միայն, եւ ասոր շատ յարմար է: Իրաւամբ Արաբացիք ուղտն «Անապատի նաւ» անուանած են, վասն զի առանց ուղտի այս անապատներն անմերձե-
նալի կ'ըլլային: Կռնակը 400 — 550 քիլոգրամ բեռ բարձած, ամէն օր տասը ժամ կը քալէ եւ շատ քիչ ուտելիքով գոհ կ'ըլլայ. անապատին




Պտկ. 93. Արուայիկ ուղտը (կանգուն), Բակտրիական ուղտը (նստած):

չոր եւ փշոտ խոտերէն զատ հազիւ թէ երբեմն ափ մը գարի, ոլոռ կամ արմաւ. կ'ընդունի: Ութ օր կրնայ ծարաւի կենալ, որովհետեւ իրեն հարկաւոր եղած ջուրը ստամոքսի խորշերուն մէջ երկայն ատեն կը պահէ, բայց սովորաբար սխալմամբ կը կարծուի թէ թարմ մնայ այս ջուրն եւ մարդիկ կարենան խմել: Ասկէ զատ այս տգեղ կենդանւոյն միւր, կաթը, ստեւն եւ նոյն իսկ քակորը շատ օգտակար է:

Ասոր շատ կը նմանի, ասոր չափ ալ օգտակար է Բ-իպրի-ի-ն կամ Երկ-ի-ն Ուղը (Camelus bactrianus), որուն կռնակին վրայ 2 հատ շարժական սապատներ (կռտկէններ) կան, մազերն ալ շատ երկայն են. միջին Ասիայի բարեխառն գաւառները կը գտնուի, ինչպէս՝ Թաթարիստանի, Մոնղոլիստանի եւ Չինի դաշտերը:

52. Այս ցեղին տակ յիշուելու արժանի են, նախ Լաման կամ Ուլապը (Auchenia lama):



Պտկ. 94. Ուլտայծ (1/2):

Միտը, կաթը, բուրդն եւ ստեւը կը գործածուի: Գրգռուելու ատենը մարդուն վրայ ժահահոտ թուք մը կ'արձակէ: Խորագաւառներ եւ տաք երկիրներ շատ շուտ կը սառնի: Ներանց ամենաբարձր գագաթները՝ Վայրէշի Ուլապը կամ Գուալի-ն-ն (Auchenia huanaco) կը գտնուին: Հարաւային Ամերիկա՝ Վիկի (Auchenia vikuna) եւ Ալպա (Auchenia paco) անուամբ 2 տեսակ ուլտայծներ կան, որոնց բարակ, մետաքսանման, կարմրիկեկ խարտեաշ բուրդը շատ յարգի է:

ՑԵՂ Դ. ԸՆՁՈՒՂՑՆԵՐ (Camelopardalida)

Ընձուղտները դիւրաւ կը ճանչցուին իրենց այլանդակ տեսքովը. երկու հատ շատ կարճ եղջիւր ունին, բայց մորթով ծածկուած են. աւտոնց կռնակը շատ ծուռ է. կ'որոճան:

53. Անալո-լը կամ Ընյո-ղը (Camelopardalis giraffa) ցամաքային կենդանեաց մէջն ամենաբարձրն է: Ուղղորդ կեցած ատեն գլխէն



Պտկ. 95. Անալուիթ (1/100):

մինչև գետինը 6 մետր բարձրու-
թիւն ունի. միայն վիզը 2 մետր
է, առջեւի ոտուղներն աւելի եր-
կայն են: Ընդհակառակն բուն
մարմինը շատ կարճ, եւ դէպ ի
ետեւի զառ ի վայր է: Ճակտին
վրայ 2 հատ, իսկ արուն 3 հատ
պարզ եւ կարճ եղջիւրներ ունի,
որոնք մորթով ու մազերով ծած-
կուած են:

Ընձուղտըներքին Ափրիկէի դաշ-
տերուն վրայ պզտիկ խմբերով կ'ա-
պրի եւ ծառերու տերեւներովը կը
ոնանի: Ընձուղտը՝ քալելու, ծռե-
լու եւ գետինը նստելու ատեն շատ
զարմանալի դիրքեր կ'առնու: Մէկ
կողման երկու ոտուղներն ալ մէկ-
տեղ կը շարժէ, երբալով կը քալէ
եւ երկայն վիզն ասդին անդին կը
շարժէ: Բայց շատ խուսափող կեն-
դանի մըն է: Որպէս զի գլուխը գե-
տին հասցընէ կամ առջեւի ոտուղ-
ներուն վրայ կը ծնրադրէ, եւ կամ
ոտուղներն իրարմէ կը բանայ, կը
հեռացընէ:


ԿԱՐԳ 9. ԱՅԼԱՄԲԱԿՆԵՐ (ԱՆՁՈՒԿԱՄԱՏ ՍՄԲԱԿԱՒՈՐՆԵՐ) (Perissodactyla)

Այլաժաճ կ'անուանուին այս կենդանիները, վասն զի իրենց
սմբակապատ մատերն անհաւասար են, միջնամատը շատ զարգացեալ
է: Ասոնց ատամնաշարը կատարեալ է, բացառաբար՝ կողմնական ակռա-
ներ չունին: Այս կարգին տակ 3 ցեղ կը զանազանենք:

ՑԵՂ Ա. ՄԻԱՄԲԱԿՆԵՐ ԿԱՐ ԶԻՐ (Equida)

Միաժաճներն կամ Զիւրն ամէն մէկ ոտուղներուն ծայրը մէկ
մէկ սմբակով պատած զորաւոր մատ մ'ունին եւ ասոր վրայ կը կոխեն,
ուրիշ երկու հատ պզտիկ մատեր ալ ունին, քիչ մը վեր կեցած եւ մոր-
թով ծածկուած են: Ասոնց առջեւի եւ ծամելու ակռաներուն մէջ ըն-
դարձակ միջոց մը կայ: Երկու կզակին վրայ ալ վեց վեցական կողմնակի
ակռաներ ունին, նոյնպէս երկու կողմն ալ վեց վեցական չորեքկուսի ա-
ղօրիքներ:

54. Ձին (արոն՝ եբելար, Ասղ, Նժոյժ, Անդրոսար, Մասթալա-խալ յի. եփը՝ Մասթալ յի, Ջաճէիլ, Ճայիլ, Ճալ, Մասթալա յի. ձափը՝ Բոսալ, Բաշահաս, Մարոնի եւայլն, *Equus caballus*) իր ազնուական կերպարանքովը եւ անդամոց գեղեցիկ չափակցութեամբը թէ նշանաւոր եւ թէ ծանօթ ընտանի կենդանի մըն է։ Երկայնաձիգ բայց ձեւաւոր գլուխ մը, կայտառ ու վառվռուն աչուրներ, եւ կարճ ուղղաձիգ եւ շատ շարժուն ականջներ ունի։ Վիզն երկայնաձեւ, երկու կողմը տափակ է, իսկ վերի կողմը բաշով մը ծածկուած։ Բողորաձեւ մարմինը



Պտկ. 96. Ձի (1/2a):


(կամ իրանը) կարճ եւ պոկած մազերով ծածկուած է, իսկ ասոր հակառակ ագին արմատէն սկսեալ՝ շատ երկայն ձարեր ունի։ Նուրբ ու բարակ, բայց միանգամայն զօրաւոր ոտուրներ, մի միակ եղջերային սմբակով պատած մատ մ'ունի։ Վերի եւ վարի կզակին վրայ ճական առջեւի ակռաներ ունի, կողմնակի ակռաները համեմատութեամբ պզտիկ են եւ երբեմն նաեւ բողբոլովն կը պակսին, իսկ ընդհակառակն ամէն մէկ կզակին երկու կողմը գտնուած ճական աղօրիքները շատ մեծ են։

Ձին իբրեւ ընտանի անասուն աշխարհիս չորս կողմը տարածուած է, միայն ամենաջերմ եւ ամենացուրտ երկիրներն այնչափ աղէկ չի բուծանիր։ Նշանաւոր է հին եւ նոր ժամանակներս Հայաստանի ձին, զոր շատ կը բուծանէին։ Միջին Ասիայի եւ հարաւային Ամերիկէի խոտաւէտ եւ մարգաշատ գաշտերուն վրայ (ինչպէս նաեւ Թաթարիստանի գաւառ-

ներն, եւ Լապլատտ գետին քով) վայրենացած ձիերու բազմաթիւ երամակներ կը գտնուին: Ընտանի ձիուն ամենաազնիւ տեսակները կը համարուին Տաճիկ եւ Անգղիացի ձին: Գլխաւորաբար Հունգարիա մասնաւոր հոգով մը ձիաբուծութիւնը յառաջ կ'երթայ, երկու հատ մեծ եւ ընդարձակ Ապապառնէր շինուած են: Նոյնպէս Բուկովինա, Բոհեմիա եւ Թրիէստի մօտ մեծամեծ ձիաստաններ կան:

Ձիերը գլխաւորաբար հեծնալու եւ կառք քաշելու կը գործածուին: Բայց շուտով կրթուելուն, եւ զօրութեանը համար շատ կը պահուին: Նաեւ մորթն եւ ոսկրները զանազան իրաց կը գործածուին: Միսը թէպէտ եւ կ'ուտուի, բայց անորժահամ չէ, ուստի եւ ընդունելութիւն գտած չէ: Ձիուն յիշուելու յատկութիւններն են, իւր խիւնջիւնը եւ իւր քալուածքին զանազան տեսակներն (ինչպէս հասարակ, ընթացիկ եւ քառարշաւ քայլուածքը), ետեւի ոտուրներով կից զարնելով ինք զինքը պաշտպանելը: Ձիու մը տարիքը մինչեւ 9 տարին առջեւի ականներուն սրպիսութենէն կրնայ ճանչցուիլ, որովհետեւ կաթի ականներէն ետքը հինգերորդ տարին երեցող մնայուն ականներուն ծայրը բիծ մը կայ, որ ըստ օրինի կամաց կամաց ծամելով կը մաշի: Գոյներու նկատմամբ իրարմէ կը զանազանին ձիերը, գլխաւորները հետեւեալներն են. ճերմակ (սպիտակ), ճարտուկ, ճանճկէն, աշխէտ, պիսակ, սեաւ, քաջասեաւ:

55. Էջ (Մապալ էշ, Իշամարոտի, Իշուի, Յաւանակ, Յովապալ [Իշեան, Իշան]. Equus asinus) ձիէն շատ պզտիկ է, եւ մերթ բաց եւ



Պտկ. 97. Էշ (1/20):

մերթ մութ մոխրագոյն գունով կ'ըլլայ. կռնակին եւ ուսերուն վըայ սեւ շերտ մը կ'երկընայ: Շատ երկայն ուղղահայեաց ականջներ ունի, եւ պոչին ծայրը մազէ փունջ մը:

Էշերը գեռ հիմայ ալ Թաթարիստան եւ Պարսկաստան վայրենացած կ'ապրին (եւ կ'ըսուին ցիւ, էշ-էշերէ)։ Բայց ընտանի էշէն աւելի մեծ, կենդանի, առողջ եւ բարակ են, եւ գոյներնին արծաթագոյն մոխրագոյն է։ Էշերը գէշ ուտելիքով ալ գոհ կ'ըլլան, եւ մասնաւորաբար փշալից խոտեղէններ շատ կը սիրեն։ Գլխաւորաբար հեծնալու (ասոր համար՝ Հեծնեթի ալ կ'ըսուին) եւ բեռ կրելու (Գրա-գ) կը գործածուին։ Ասոնց մորթը մագաղաթ եւ «էկ կ'ըլլայ։ Ասոնց յատուկ՝ բարձրաձայն եւ ա-նախորժ խանչիւնն ամենուրեւ ծանօթ է։

Զորէնէ կամ Իշ-կէ- (Equus mulus) ըսուածներն, որոնք էշէն եւ մատաղ ձիէն յառաջ կու գան, արտաքին կերպարանքով ձիերու կը նմանին, բայց նաեւ իշուս երկայն ականջները, խանչիւնը, պոչն եւ յա-մառու լծիւնն ալ ունին։ Զորաւոր կենդանիներ են եւ շատ ալ կ'ապրին, գլխաւորաբար Ալպեան լեռանց բարձունքն եւ հարաւային Ամերիկէի երկիրներն իբրեւ բեռնաբարձ գրաստ, Սպանիա, Եգիպտոս եւ ուրիշ ջերմագոյն գաւառները հեծնալու համար կը բուծանեն։




Պտկ. 98. Վագեռածի (1/35):

Բայց երբեք ընտանեցրնելով իբրեւ օգտակար ընտանի անասուն գործածելը յաջողած չէ։

Ափրիկէ վագրի պէս խայ-տաբղէտ ձիու փոքրիկ աե-սակներ կը գտնուին, զոր օ-րինակ Վագեր-յին (Equus Zebra), որուն բոլոր մարմինը սպիտակ է եւ մութ գորշ շերտեր ունի եւ կո-ագգա (Equus Quagga) որուն մար-մնայն միայն առջեւի կողմը շերտեր կան։ Շատ երագրն-թաց եւ վախկոտ կենդանի-ներ են, եւ պզտիկ երամակ-ներով կ'ապրին։ Յաճախ կ'որոսացուին եւ կը բռնուին,

ՅԵՂ Բ. ԳԵՑԱԿԻՆՃՆԵՐ (Tapiridae)



Պտկ. 99. Ամերիկէի գետակինճ (1/35):


56. ԱՅԵՐԷԼԷԻ ԳԵԿԱԿԻՆՃՆԵՐ (կըն-ճըլէղ) (Tapirus americanus) իշու մը չափ մեծ կ'ըլ-լայ, մարմինը ծած-կուած է հաստ եւ քորշ խողաննե-րով, որոնք կոնա-կին վըայ կարճ բաշ մը կը կաղ-մեն։ Կարճ, շար-

ժական կնճիթ մ'ունի, ականջները կարճ են, իսկ աչուները՝ պզտիկ։ Ատամնաշարն ամբողջ է։ Առջևի ոտուները 4, իսկ ետեւինները 3 մատուներ ունին եւ շատ զօրաւոր են։

Գետակինճը հարաւային Ամերիկէի թանձրախուռն անտառները կ'ապրի եւ գիշերն ամէն կողմը ման կու գայ, որով երբեմն ամբողջ տնկատաններ կ'ապականէ։ Քիչ մէջ վախկոտ է եւ մինն ու ճարպին համար շատ կ'որոսացուի։ — Ներքին-Հնդկաստան ուրիշ տեսակ գետակինճ մըն ալ կայ։

ՅԵՂ Գ. ԻՆԿԵՂՋԻՐՆԵՐ (Rhinocerotidae)

57. Հնդկի Ռնգեղջիւրը (*Rhinoceros indicus*) մեծ ցամաքային կենդանի մըն է, որուն եղջերային, ճաթառած եւ գրեթէ անթափանցելի մորթը տախտակի մը հաստութիւնն ունի, եւ մորթը վրայէ վրայ ծալ-լուելով՝ կարծր վահան մը կը կազմէ։ Երկայն, ուղղորդ ականջներ ունի, վերի շրթուները կերակուր ուտելու ատեն մատի ձեւ կ'առնու. քթին



Պտկ. 100. Հնդկի Ռնգեղջիւր (1/3):

ոսկրին վրայ 0.30 մինչեւ 0.60 հըճ. երկայն, սրածայր եւ հաստ խաւերէ բաղադրեալ եղջիւր մ'ունի։ Կողմնակի ակուններ չունի, ընդհակառակն 2 հատ կարող ակուններ եւ 2 կողմը 7ական աղօրիքներ ունի։ Ոտուները երեքմատնեայ են։

Արեւելեան Հնդկաստանի ճահճահոտ եւ մերական տեղերը կը բնակի, գլխաւորաբար ծառոց տերեւներովը կ'ապրի եւ ծոյլ ու խաղաղասէր անասուն մըն է։ Չորցած մորթէն՝ վահաններ, բարակ գաւազաններ,

փոկեր կը շինուի, իսկ եղջիւրէն՝ ջուր խմելու ամաններ: Ափրիկէ եւ Սուամատրա կղզւոյն վրայ 2 եղջիւր ունեցող ունեղջիւրի տեսակներ ալ կան: Այս եղջիւրներն՝ որոնց ներսի կողմը կիտոսկրի կը նմանի, քսելով մաշեցընելով երբեմն կը կարճնան եւ կը բթանան:

ԿԱՐԳ 10. ԱՏԱՄՆԱՏ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ (Edentata)

Արածնապէս կենդանիներն իրենց անունը կ'առնուն իրենց ակռաներէն: Ասոնց ատամնաշարը միշտ պակասաւոր է. առջեւի եւ բուն կողմնակի ակռաներ երբեք չունին, ոմանք աղօրիք ալ չունին: Գտնուած ակռաներն ալ արմատ չունին, միշտ կ'աճին: Ասոնց մատուրները շատ քիչ կը շարժին եւ շատ անգամ իրարու միացած կ'ըլլան եւ ամուր մանգաղաձեւ ճիրաններ ունին: Բոլորակ գլուխ, կարճ ականջներ ունին, տաք երկիրներ կը գտնուին: Երբեք ցեղ կը զանազանենք:

ՑԵՂ Ա. ՅԱՄՐՈՒԿՆԵՐ (Bradypoda)

58. Յամբոսիւր կամ Յամբոսիւս (Bradypus tridactylus) քիչ շատ կապկիւն կը նմանի: Ոտուրներուն ծայրը 3 հատ երկայն մանգաղաձեւ ճիրաններ ունի, որոնցմով ծառերու ոստերու վրայէն կը կախուի: Առջեւի եւ կողմնակի ակռաներ չունի, միայն վերի կզակին երկու կողմը հական, իսկ վարի կզակին վրայ 4 ակն կլոր աղօրիքներ ունի:




Պտկ. 101. Յամբուկ (1/2):

ասոնց մտաւոր կարողութիւնն ալ շատ նուազ է, երբեմն երբեմն սղ-բտձայն կը կռնչեն, եւ հաւանականաբար երկնից ցօղէն զատ ուրիշ ջուր չեն խմեր: Նոր բարդութեամբ Հեղեբէ կ'անուանեն ոմանք այս կենդանին, բայց ճիշդ չէ. վասն զի երբեք արթնանաւոր է:

Յամբուկները՝ Բրազիլիայի ծառերուն վրայ՝ ասոնց մեծ ամեծ տերեւներովն ու պտուղներովը կ'ապրին, եւ գրեթէ երբեք ասկէ վար չեն իջնար, վասն զի երկայն ճերաններու պատճառաւ հասարակ գետնի վրայ չեն կրնար քայլել: Գանդաղաշարժ եւ տխուր կենդանիներ են,

ՑԵՂ Բ. ԿՑՑԵՒՈՐՆԵՐ (Dasypoda կամ cingulata)

59. ԵՐԷԿԹՕՊԵԱՆ ԱՆԱՍՈՆԵՐ (ԳՕՊԵՐԷ?) (Dasypus tricinctus) կարճ պոչ մը եւ փոքրիւ յարմար ճիրաններով ոտուքներ ունի: Ամուր ոսկրէ զրահով մը պատած է, որուն մէջտեղը շարժական շերտեր կամ գօտիներ կան եւ մարմնոյն բոլորափքը կը պատեն: Պատառող եւ կողմնա-



Պտկ. 102. Երեքգօտեան անասունը, քովը՝ գնդաձեւ բոլորած (1/2):

կան ալուաներ չունի, միայն երկու կողմը ծական կլոր աղօրիքներ ունի, եւ կրնայ ողնիի պէս գնդաձեւ բոլորակ ըլլալ:

Գօտեւոր անասունները Հարաւային Ամերիկա միջատներով եւ գրւխաւորաբար մրջիններով եւ դիակներով կ'ապրին: Հատ արագ վազել չեն կրնար, բայց ուրիշ մեծ ճիրաններով յաջողակութեամբ ծակեր կը բանան եւ վտանգ մը հասած ատենը ողնիի պէս կը բոլորին եւ այն ծակերուն մէջ կը պահուբարին: — Ասոնց կը վերաբերի, աւելի մեծ է, նոսեւ Հասարակ Ինչօթեան Անասունը (Dasypus novemcinctus), որ 9 հատ շարժական գօտիներ եւ 0.34 հրժ. երկայն պոչ մ'ունի:




Պտկ. 103 . Մ'ընսքաղ (1/10):

ՑԵԳ Գ . ՆՐԲԱԼԵԶՈՒՆԵՐ (Vermilinguia)

60. ՄԵԶ ԴՐՇՆԱԿԱՅԻՆ ԿԱՄ ՄՐՇՆԱՐՔ (Myrmecophaga jubata) 120 հրժ. մեծ կ'ըլլայ, անհարթ ու հաստ մազերով ծածկուած է, որոնք կռնակին վրայ բաշ մը կը կազմեն. փնջոտ պոչը ուղղաձիգ գիւղքով կը կենայ եւ 1 մետր երկայն է. գլուխը երկայնաձեւ է, իսկ ցուկը երկայն ու սրածայր, որուն ծայրն է փոքրիկ՝ եւ բոլորովին ատամնատ բերանը: Լեզուն սողունի կը նմանի եւ մինչեւ 0.50 հրժ. կրնայ երկննալ. բայց այնպէս արագութեամբ կ'ընէ այս գործողութիւնը, որ վայրկենի մը մէջ կրնայ 50 անգամի չափ երկնցընել եւ ներս քաշել: Ոտուըններուն ճիրանները՝ արտաքոյ կարգի մեծ են:

Այս մեծ կենդանին Հարաւային Ամերիկա կ'ապրի, եւ պզտիկ միջատներով՝ գլխաւորաբար մրջնակներով եւ տերմիտներով կը սնանի, հաստաբեւատ ու երկայն ճիրաններովն անոնց բոյնը տակնուվրայ կ'ընէ, եւ խռոված մրջնակներն իւր կպչուն եւ կայծակի պէս արագ լեզուով կ'որսայ եւ կը կլկէ:



Պտկ. 104 Թեփամորթ (1/3):

Ուրիշ ատամնատ եւ սողնաձեւ լեզու ունեցող կենդանիներն են, ՄԵԶ-ԲԵՔ ԹԵՓՄԻՆԿԻ (Manis Temminckii) եւ ՀՆԳԿԱՍՏԱՆԻ ԿՐԵՎԻ ԹԵՓՄԻՆԿԻ (Manis brachyura):

ԿԱՐԳ 11. ԿԵՏԱԶԳԻՆԵՐ (Cetacea)

ԿԵՐԱՎԵՐՆԵՐ ԶԿԱՆ ԿՐ ՆՄԱՆԻՆ, անմալ մարմին մ'ունին. գլխուն եւ մարմնին միանալու տեղը արտաքուստ զգալի չէ: Արտաքին ականջ չունին, ականջափողն արտաքոյ կարգի բարակ է, նոյնպէս աչքերը շատ մանր. առջևի ոտուընները լողարանի փոխուած են: Ետեւի ոտուըններ


ԿԵՐԱՎԵՐՆԵՐ ԶԿԱՆ

7

չունին, անոր տեղը մեծ, հորիզոնական դիրքով՝ լողալու յարմար տառն մ'ունին, բայց շունչ առնելու համար ծովուն երեսը կ'ելեն. սովորաբար ասոնց քթի ծակերը գլխուն վրայ կը գտնուին: Միշտ ջրոյ մէջ կ'ապրին: Իրենց ջերմ արիւննով եւ օդի մէջ շնչելով շատ դիւրաւ եւ զգալի կերպով բուն ձկերէն կը զանազանին: Ասոնք 3 ցեղ կը բաժնուին:

ՅԵՂ Ա. ԲԱԼԵՆ ԿԵՏԵՐ ԿԱՐ ԲԱԼԵՆԻԴԵՐ (Balaenida)

61. Հառարակ կամ Գրօէնլանդայի կէտը (Բալէնան) (Balaena Mysticetus) երբեմն մինչեւ 20 մետր երկայն կ'ըլլայ: Գլուխը մարմնոյն 3 մասին մէկն է եւ դէպ ի առջեւը երթալով կը նեղնայ, վարի կզակը համեմատութեամբ շատ մեծ եւ ատամնատ է, վերի կզակը նեղ է: Այս վերի կզակին վրայ ահռաներու տեղ՝ ահռայի ձեւով կարգաւ շարուած



Պտկ. 105. Բալէնա (1/175):

եղջերեայ շերտեր կան, որոնք կիտուիք (Բալէնա) անուամբ ծանօթ են վաճառականութեան մէջ: Գլխուն մէջտեղը օձաձեւ, իրարմէ բաժնուած 2 հատ քթափող ունի: Մանր աչուրներն երկու կողմը բերնին անկիւններուն վրայ՝ առջեւի լողարաններուն մօտ են: Մեծ ու լայն տոնաթեւ մ'ունի: Մարմնոյն վերի կողմը սեւ, իսկ տակը ձերմակ է:


Հառարակ կէտը՝ հիւսիսային սառուցեալ ծովու մէջ կամ առանձին եւ կամ զոյգ զոյգ կ'ապրի. բայց նաեւ հարավային սառուցեալ ծովուն մէջն ալ տեսակ մը մօրուանի կէտ կը գտնուի: Թէպէտ եւ զարհուրելի երախք մ'ունի, այնպէս որ ամբողջ կուր մը կրնայ հանգիստ ներս մտնել, բայց կոկորդը շատ նեղ է, անոր համար միայն պզտիկ ծովային կենդանիներ (խեցգետիններ, խղունջներ, պողիպոդներ), կ'ստէ, բայց արտաքին կարգի շատ բազմութեամբ:

Հառարակ կէտէն՝ ինչպէս վերն ըսինք, կիտուիք եւ ինչ եւ ըսուած ճարպը կ'առնուի: Կիտուսկրը 3—4, մինչեւ նաեւ 5 մետր երկայնութեամբ եւ 0.20 մինչեւ 0.25 հրժ. լայնութեամբ՝ 300 հատի չափ կ'ըլլայ, կիտուսկրին ներքսակողմը պէխի նման կարծր մազերով ծածկուած է: Ջրոյ մէջ գտնուած մանր կենդանիներն որսալու համար՝ այս կէտը զատնք ուռկանի կամ մաղի պէս կը տարածէ: Միջակ մեծութեամբ կէտ մը 110,000 քիլոգ. ծանր կը

կռէ, որ է ըսել՝ 200 պարարտ եղերու կամ 30 փղերու ծանրութեան հաւասար կու գայ: Միայն կիտոսկրը երբեք 1700 քիլոգ. կը կռէ, ճարպն ալ 45,000 քիլոգ.: — Կիտոսուրթեան համար ամէն տարի բազմաթիւ նաւեր կը պատրաստուին: Այտերը տեսնելէն ետքը նաւակով զգուշութեամբ կը մերձենան եւ երեքժանիով կը շամփրեն: Թէպէտ ի սկզբան անդ կը խորասուզին կէտերը, բայց շուտ մը 5—10 մանրերկրորդ, երբեք մինչեւ քառորդ կամ կէս ժամ ետքը, հարկ է որ շունչ առնելու համար ծովուն երեսն ելլեն. ելլելուն պէս նորանոր հարուածներով եւ ռաբներով այնչափ կը վիրաւորուին, որ արիւնահոսութեամբ կը տկարանան եւ կը սատկին: Մահուան տագնապին՝ կէտերը գլխու ծակերէն շատ արիւնախառն ջուր կը ժայթքեն, իսկ հասարակ ատեններն այն ծակերէն միայն խոնաւ շունչ դուրս կու տան, այս շունչը ցուրտ օդի մէջ կը թանձրանայ եւ հեռուէն ծխէ տիւնի մը կը նմանի:

ՏԵԼ Բ. ԴԵԼՓԻՆԻԴ (Delphinida)

62. Հասարակ կամ Բոն Դելփինը (Delphinus Delphis) 2—2.5 մէտր եւ աւելի, մեծ կ'ըլլայ: Մետաքսի պէս փայլուն լերկ մորթ մ'ունի: Գլուխը սրածայր ցուրկով մը կը վերջանայ եւ իւրաքանչիւր ծնօտին վրայ մինչեւ 90 հատ միատեսակ ու սուր ակռաներ կան: Երկու քթափողերը շնչածակի մը (շատրուանի) փոխուած են եւ ճակտին վրայ են:



Պտկ. 106. Դելփին (1/30):

Առջեւի ոտուրները 2 մանգաղաձեւ լողարաններու փոխուած են, իսկ ետեւի ոտուրներ չունի: Առնակին վրայ ճարպէ լողարան մ'ունի, իսկ ետեւի կողմն ալ հորիզոնական դիրքով տոնաթեւ մ'ունի:

Դելփինը Միջերկրական եւ Ատլանտեան ծովերն ընկերաբար կ'ապրի, մանաւանդ՝ Մարմարայի եւ Բոսփորի մէջ, եւ շատակեր անասուն մ'ըլլալով ձկնով եւ ուրիշ ծովային կենդանիներով կը սնանի: Հասնազամ նաւերու ետեւէն կ'իյնայ, ոչ թէ մարդկան սէր կամ յարում ունենալէն, այլ որսալու համար այն ձկներն, որոնք նետուած կերակրոյ մնացորդներէն հրապուրուելով նաւուն քովը կը ժողովուին: Նշանաւոր է դելփիններու՝ երաժշտութեան ունեցած առասպելական սէրը:

Մոնոտոն կամ Նոնոտոն (Monodon monoceros) 4—5 մէտր երկայնութեամբ դելփին մըն է, որուն բերնէն պտուտակաձեւ որդուած եւ հորիզոնական դրիւք մեծ ժանիք մը դուրս երկնցած է, բերնին մէջ ուրիշ ակռայ չունի: Հիւսիսային սառուցեալ ծովուն մէջ մանր ձկնով եւ ծովային կենդանիներով կ'ապրի, խաղաղասէր եւ անվնաս կենդանի


մըն է, իւր 2—2.5 մետր երկայն փղոսկրէ ժանիքով ինք զինքը կը պաշտպանէ: Այս ժանիքն այնպէս զօրաւոր է որ նաւերու 0.08 հրէժ.



Պտկ. 107. Միաժանի (1/16)

Թանձր կաղնիէ գերան մը կրնայ ծակել: Մեծ նաւերու վնաս չի հասցնէր, բայց շատ անգամ նաւակներ ընկղմած է: Այս կաթնատու կենդանոյն միւր թէպէտ կ'ուտուի, բայց կարծր ու անհամ է:

63. Երկայնագլուխ փշապաշուկ (Physeter macrocephalus) ծովու ձկանման ամենամեծ գազանն է: 20 մինչեւ 22 մետր երկայն է, իսկ կոնակին տարածութիւնը 12 մետր է: Գլուխն անհամեմատ մեծ՝ եւ բոլոր մարմնոյն 3 մասին մէկն է: Քթի ծակերը միանալով շատրուան մը կը կազմեն եւ բութ ցուկին վրայ են: Վերի մեծ կզակն



Պտկ. 108. Երկ. փշապաշուկ (1/100):

Ծովուն մակերեսին վրայ փշապաշկան 4 սյուեւայլ գիւղերը. շողի կ'արձակէ. գլխուն առաջակողմը. կողմնակի գլտուած. կը խորասուզի:

ատամնատ է, իսկ ընդհակառակն վարի փոքր ու նեղ կզակին վրայ շատ մը սրածայր ակռաներ կան: Մանր աչուռները գլխուն 2 կողմը կուրծքի լողարանին քովերն են: Մարմինը գլխուն կողմանէ սկսեալ կը նեղնայ իսկ

եռեւի կողմը երկձիւղ տառն մ'ունի: Մարմինը լերկ, վերի կողմը սեւ՝ իսկ փորին կողմը ճերմակ է:

Վիշապաձուկն ամէն ծովու մէջ ընկերաբար կ'ապրի եւ գլխաւորաբար թուլատարներ ու ձկեր կ'ուտէ: Ճարպէն՝ (որ յիշեալ կ'անուանուի) եւ ակուաներէն շինուած փղոսկրէն զատ՝ ուրիշ 2 մասնաւոր նիւթեր ալ կու տայ, այսինքն ճարգամբ (= Սպարմաձէթ) եւ Յոփոփ: Ճարպամբը կենդանւոյն սղջ եղած ատեն, իւղային հեղուկ մըն է, օդի մէջ անմիջապէս մտնի նման նիւթի մը կը փոխուի: Գլխաւորաբար գլխու մորթին տակ կը գտնուի այս նիւթը, բայց կռնակին մորթին տակն ալ ըստ բաւականի կը գտնուի: Իսկ յամպարը խիժային՝ ճերմակ կամ դեղնագոյն անուշահոտ զանգուած մըն է: Ըստ մասին վիշապաձկան մարմնոյն մէջ, ըստ մասին ալ ծովուն երեսը կը լողայ եւ կամ ծովեզը նետուած կը գտնուի: 1853ին ամառը՝ Խստրիայի Չիտտա Նուովային առջեւն այս զարհուրելի անասնէն 6 հատ կորին բռնուեցան: Ամէնէն մեծին կմախքը որ 1.5 մէտր երկայն է, Վիեննա կայսերական Բնական Պատմութեան թանգարանը կը գտնուի:

ՅԵՂ Գ. ԾՈՎԱԿՈՎՆԵՐ (Sirenida)

Միջակ մեծութեամբ մարմին ունին, բուծ աղօրիքներ. եւ բոյսերով կը կերակրին. ասոնց տակը կ'երթայ Դոփոփալ (Halicore cetacea): Պոչը մահիկի ձեւով տոնաթեւ մ'ունի: Ծովահարսներու կամ ընդդայներու, ծովային համբարուններու եւայն, շատ մը առասպելեալ պատմութիւններ կը պատմուին, բայց այս կենդանին է ապահովապէս այն պատմութեանց պատճառը, վասն զի 6 մէտր երկայնութիւն ունի եւ շնդկաց Ուլիկանոսի մէջ ստէպ կը մտնեայ լողացողներու:


Նշնպէս այս ցեղին տակ կ'երթայ Սթելլերեան Ծովահիւր (Rhitina Stelleri). 10 մէտր մեծութիւն ունէր, բայց հիմայ բոլորովին սպառած է այս կենդանին:

ԿԱՐԳ 12. ՊԱՐԿԱՌՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐ (Marsupialia)

Պարկառք կենդանիները՝ ատամնաւոր կզակներ ունին, փորին կողմը երկու ոսկրներէ կազմուած քսակաձեւ պահարան մ'ունին (Պարկ, Marsupium կ'անուանուի), իսկ պարկ չունեցողները՝ յատուկ պարկոյն ունին. ձագերը՝ որոնք արտաքոյ կարգի պզտիկ եւ անկատար կը ծնանին, մինչեւ իրենց մեծնալը այս պարկին մէջ կը մնան: Երկու գլխաւոր տեսակներ կան. խոտակէր եւ մասկէր պարկաւորներ. ասոնց գլխաւորներն են:

64. Աֆէլազը կամ Մէթ Կանգոփոփ (Halmaturus giganteus). չիտակ կեցած ատեն 1.50 մէտր բարձր է, եւ շատ զարմանալի կազմածք մ'ունի, որովհետեւ մարմնոյն վերի մասը պզտիկ եւ տկար է, իսկ ընդհակառակն եռեւի մասը արտաքոյ կարգի զօրաւոր է: Գլուխը փոքր


եւ նուրբ, իսկ ականջներն՝ ուղղաձիգ եւ սրածայր: Առջեւի ոտուրները՝ ետեւի զօրաւոր սրուաններէն 5—6 անգամ պզտիկ են, պոչն ալ 1 մէտր երկայն եւ արտաքոյ կարգի զօրաւոր է. կենդանին նստելու եւ ցատկելու



Պտկ. 109. Կանգուրոս ($1/20$):

չեւ որ անձամբ իրենց կերակուրը գտնեն եւ կարենան քայել, մէկտեղ կը պտրտցնէ: Բայց այն ատեն ալ մօրը քսակին մէջ կը վազեն եւ գլուխնին դուրս հանած չորս դին կը նային:

Ագէվազը՝ Նոր Հոլանդայի դաշտերը կ'ապրի եւ հոն տեղուան ամենամեծ կաթնատու կենդանին է. խոտով կը կերակրի ու մեին համար իբրեւ երէ կ'որսացուի: Որսալու ատեն միշտ կը ջանան որսորդներն, որ զառիվայր տեղեր հալածեն այս կենդանիները, վասն զի այն ատեն զառիվայրէն վար կը գլորին, եւ շները կրնան դիւրաւ որսալ: Միայն ցատկելով կը քայէ, եւ մէկ անգամով 5—7 մէտր հեռու: Վտանգի ատեն շատ քաջութեամբ կը պաշտպանէ ինք զինքն եւ ետեւի ոտուրներով կից զարնելով կրնայ փնասակար ըլլալ:



Պտկ. 110. Պարկամուկն ($1/2$):

65. Նշանաւոր կենդանի մըն է հոս նկարուած Պարլաճոնէ կամ ենէկան ճոնը (*Didelphys dorsigera*):

ԿԱՐԳ 13. ՑՈՒԿԵՂՆԵՐ ԿԱՄ ԿՑՑԱՒՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐ (*Monotremata*)

Ցուկեղները կատարեալ կաթնատու կենդանիներ են. ընապատուած ներուն մտադրութիւնը գրաւած են, վասն զի իրենց կազմաճիւղը ըստ բաւականի կը նմանին թռչնոց: Ասոնք կենդանի ձագ չեն ածեր, այլ ձու, բայց կաթով կը սնուցանեն իրենց ձագերը: Ասոնց բերանը ատամնատ է եւ թռչնոյ մը կտուցին կը նմանի, սակայն եթէ մտադրութեամբ քննուի, քթի ծակերն իսկոյն կը տեսնուին: Թռչուններուն պէս երկրորդ ճիւղակը (*os furculaire*) մը եւ պարկոսկր ունին, բայց բուն պարկեր չունին:

66. Ցուկեղը կամ Հաւիպոսը (*Ornithorhynchus paradoxus*) պզտիկ ջրասամայրի կը նմանի, բայց 8 հատ՝ եղջերանման նիւթէ տափակ աղօրիքներ եւ նեղ՝ փողի ձեւով բերան մ'ունի, որ բազի կտուցին կը նմանի: Բերնին ետեւն այտի քսակներ կան: Ոտուրներուն



Պտկ. 111. Ցուկեղ (1/2):

վրայ հինգ մատ ունի, որոնց ծայրը ճիւղաններ կան եւ լողամաշկով մը իրարու հետ կապուած են: Աչուրները՝ մանր, ականջներն ալ՝ արտաքուստ չեն երեւար, պոչը կարճ եւ տափակ է: Արուն ետեւի ոտուրներուն վրայ երկայն բիւս մ'ունի:

Հարաւային Նոր Հոլանդայի եւ Տասմանիայի ծովեզերքը ծակերու մէջ կ'ապրի. ըստ մեծի մասին ջրոյ մէջ կը կենայ եւ հոն տղմի մէջէն փոտտաներ եւ ուրիշ մանր ճճիներ կը բռնէ ու կ'ուտէ: Ողնի մը պէս կրնայ գնդակաձեւ բոլորիլ: Նոր Հոլանդայի Կոչոսը ուղի (*Echidna hystrix*) բառածն ալ ասոր մէկ տեսակն է, բայց ցամաքի վրայ կ'ապրի եւ պզտիկ փշերով ծածկուած է: Յառաջագոյն կը կարծուէր թէ ցրակեղներն ակուայ չունին, բայց անգղիացի բնապատու մը ցոյց տուաւ թէ լնդերքին տակը կատարեալ ակուաներ ունին, միայն թէ լնդերքի մաշկը ծակած չըլլալուն՝ չեն երեւար:

ԿԱԹՈՆՏՈՒ ԿԵՆԴՐԱՆՆԵՐ ՎՐԱՅ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԻՏԵԼԻՔ

Կաթնասունները (Mammalia) (որոնց ոմանք Սպանառ [սպին+] ալ կ'ըսեն) հաստատուն ոսկորեայ կազմածք մը եւ կարմիր տաք արիւն ունին. թորով շունչ կ'առնուն, կենդանի ձագ կը ծնանին զորոնք ի սկզբան կաթամբ կը սնուցանեն (կը դիեցընեն): Ամենէն անկատար կաթնատուներն՝ որոնք շատ անկազմ ձագեր կը ծնանին, Պարչաւորներն ու Կրկնորներն են: Միւս կաթնատու կենդանիներն՝ իրենց անդամոց կազմութենէն առեալ կը բաժնուին.

Ա. Ծիրանաւորներու. Կապիւնները, Զղջիւնները, Ճեւերները, Մաւիւնները, Փռիւնները, Կրծողները եւ Արածնասունները:

Բ. Սմբակաւորներու. Դարասմբակները եւ Այլասմբակները:

Գ. Լողարանաւորներու. Կիտաւորները:



ԴԱՍ Բ. ԹՈՒՉՈՒՆՆԵՐ (Aves)

Թռչուններն ողնայարաւորներու Բ. Դասը կը կացուցանեն. մինչեւ հիմայ 9000 տեսակ կենդանի թռչուն ճանչցուած է (իսկ անգղիացի բնապատում մը 12.000 կը դնէ), եւ քանի մը հատ քարացած. թռչունները 9 կարգի կը բաժնուին, որոնց առաջինն է:

ԿԱՐԳ 1. ԵՐԳԵՑԻԿ ԹՈՒՉՈՒՆՆԵՐ (Oscines)

Երգեցիկ թռչունները ներքին նշան մ'ունին, որով ապահովուած են ուրիշներէն կը զանաղանուին, այսինքն շնչափողին վարի ծայրը՝ 4—5 զոյգ յատուկ մկունքներով երգելու խաւով մ'ունին: Բայց մեծաւ մասամբ միայն արուները կրնան քաղցրանուագ եւ զանազան երգեր երգել, իսկ ոմանք թէպէտ այս երգելու գործարանաց կազմածքն ունին, սակայն իրենց ձայնը շատ անախորժ է (ինչպէս են Ագռաւներն ու Ուրիները): Երգեցիկ թռչնոց մեծ մասը արտաքուստ կը ճանչցուի իրենց թեւերուն վրայ ունեցած 9 հաստ փետուրներով, եւ դարձեալ երգեցիկներուն ոտքերու վրայի մորթը մաս մաս բաժնուած չէ, այլ միաձոյլ է: Ասոնք 12 ցեղ կը բաժնուին:



ՑԵՂ Ա. ՍԵՐԻՆՍԵՐ (Fringillidae)

Կարճ եւ կոնաձեւ կտուց, 9 հատ թռչաթեւ ունին. մանր, գաղթող թռչուններ են, սքանչելի կ'երգեն. հունտ եւ միջատ կ'ուտեն: Գլխաւոր տեսակներն են:

Պտկ. 112. Գոնակտուց:

Կապոյա երաշտահաւ
(Parus coeruleus):


67. Եկտանիլը, Կարճեկապարն (Fringilla carduelis) իւր զարդաւորուն ու գոյնզգոյն փետուրներովը նշանաւոր է: Կոնակը՝ մոխրագոյն գորշ, իսկ փորը՝ ճերմակ է. գագաթն ու քամակը սեւ, ճակատն ու փողն մինչեւ աչուրները արիւնագոյն կարմիր են. պոչն եւ թեւերուն փետուրները սեւ են, իսկ ծայրերը ճերմակ: Թռչաթեւերուն վրայ դեղին երկայն շերտ մը կայ:



Պտկ. 113. Եվրոպական (1/2):

կան. եղոտ հնտերով՝ բայց ի մասնաւորի կանեփի եւ խաշխաշի հնտերով կ'ապրի: Ընդհանրապէս այս ցեղին թռչնոց արունները՝ կտցին արմատին քովերը սեւ մազեր ունին:

68. Հասարակ ծնծղուկը (*Fringilla domestica*) ամուր եւ հաստ կտուց մ'ունի, ոտուքները զօրաւոր են, թեւերը կարճ, մարմինն ալ ըստ



Պտկ. 114. Հասարակ ծնծղուկ (1/2):

բնակի եւ անդադար ճռուողելով ու ճչելով՝ նոյնպէս ջանաւած ընդդէմները քաղելով, մարդուն նեղութիւն կը պատճառէ, բայց դարունը միջատները ջնջելովն օգտակար է: Տարին երկու կամ երեք անգամ ձագ կը հանէ եւ թէ աներու տանեաց տակ եւ թէ ծառերու վրայ բոյն կը շինէ:

Այս գեղեցիկ եւ բազմաճամուկ թռչունը՝ գեղերու մօտ տեղեր կը սիրէ, եւ գլխաւորաբար եկքանի սերմերովը կ'ապրի: Իւր գեղեցիկ երգին համար վանդակներու մէջ կը պահեն: — Բայց Սուրբ-Կամ Սերինոսը (տճ. իսպինոս *Fringilla coelebs*) (Պտկ. 117, Ձեւ Ա') տեղիս տեղիս իւր բարձր եւ տեւական երգին համար աւելի յարգի է, ասոր վիզն ու կուրծքը ժանկագոյն կարմիր են, եւ թեւերու վրայ 2 հատ ճերմակ շեղ գծեր կան: — Սարեկի տեսակներուն ամենափոքրն է Տարինոսը կամ Սուրբիկը (տճ. իսպինոս *Fringilla spinus*) (Պտկ. 117, Ձեւ Բ) ամէնուն ծանօթ թռչուն մըն է. կանակը՝ կանանչ, փորը՝ դեղին, եւ թեւերուն վրայ քանի մը հատ սեւ շերտեր

բաւականի լեցուն է: Արունին գոյնը շագանակագոյն կարմիր, գորշ, մոխրագոյն եւ ճերմակ խառն է. էգն ու ձագերը գրեթէ բոլորովին մոխրագոյն են:

Սարեկներու ամէնէն բազմաթիւ սեռը կը կացուցանէ ծնծղուկը. խորամանկ եւ զգուշաւոր թռչուն մըն է, ամէն տեղ մարդուս մօտերը կը


69. Հապթէէկէ (տճ. Ըսքաթարոն, ռմ. Փիլիզուն) (*Coccothraustes vulgaris*) (Պտկ. 117 ՁԵԼ՝ Դ): Կոնակն եւ ուսերը՝ բաց խարտեաշ, քամակը՝ բաց մոխրագոյն, փողն ու թեւերը՝ թաւշի պէս սեւ են: Ատր կտուցն անհամեմատ հաստ, չափէն աւելի կարճ, կոտմէն եւ շիտակ է, սյնպէս որ առանց մեծ աշխատութեան նոյն իսկ կարծր կեռասի կուտեր ալ կրնայ կոտրել եւ ասկէ առնուած է իւր անունը. այս կտուցն ամառը՝ գոց կապոյտ, իսկ ձմեռը մին գունով կ'ըլլայ:

Անցաւոր թռչուն մըն է, եւ գլխաւորաբար միգաստանները կամ բազմաձառ ծառաստանները կը գտնուի: Այս ցեղին նշանաւոր թռչուններն են՝

Խաւիքոսն (*Loxia curvirostra*) (Պտկ. 117, ՁԵԼ՝ Ե) նշանաւոր է իւր կտցովն, որուն վերի եւ վարի մասերն խաչաձեւ իրարու վրայ դարձած են:

Եւրոպայի կոնարեր անտառները բազմութեամբ ապրող մնայուն եւ անցաւոր թռչուն մըն է, եւ իւր կոր կտցովն դուգաքներու պէս ծառերու վրայ կը մագլէ: Գլխաւորաբար կոնգոմներով (եղեւնի պտուղներով) կը սնանի:

70. Անկահաւոր կամ Հիսող Ռուշանը (*Ploceus soccus*) սերինոսներու ցեղին տակ կը դասուի, խածկափկի չափ մեծ է. կոնակի կողմը՝ ձիթապտղոյ գորշ գունով, իսկ փորը՝ կաշւոյ գունով է, գլուխը, թեւերն ու պոչը՝ գորշագոյն սեւ են: Կտուցը կոնաձեւ է:




Պտկ. 116. Անկահաւոր բոյնը (շատ ազտիկցուած):

Հարաւային Եւրոպա կ'ապրի եւ անով նշանաւոր է, որ մեծամեծ երամներ՝ մէկ հասարակաց բոյն կը շինեն. նախ եւ առաջ խոտերու ցողուններով՝ անձրեւէն եւ փոթորիկներէն պատսպարուելու համար, ծառի մը վրայ յարկ մը կը շինեն. յետոյ աս յարկին տակի կողմը՝ բարակ նիւթերէ հիւսուած խիտ առ խիտ յատուկ ծափեր կը շինեն: Ափրիկէ, Ասիա

եւ Ամերիկա ուրիշ տեսակ անկահաւոր կան, որոնք խոտերու ցողուններով եւ կնիւններով արտաբոյ կարգի արուեստական բոյններ կը շինեն, եւ առանձին առանձին ճիւղերու ծայրերէն կը կախեն. իսկ այս քաակաձեւ բոյններուն ծափը վարի կողմն այնպէս նեղ կը թողուն, որ միայն այս թռչունները կրնան մինչեւ հաւկիթներուն եւ ձագերուն քովն երթալ: Այս թռչնոց մէջ ամէնէն նշանաւորն է՝ Մահալին (*Ploceus Mahali*):

71. Խաչկորիկ (Եզնակ) (*Pyrrhula europaea*) (Պտկ. 117, շեւ՝ գ.)
 Կոնակը մոխրագույն, իսկ փորին վրան խրուկի կարմիր գունով է։ Գա-
 գաթը, վեզը, թեւերն ու պոչը սեւ են։



Պտկ. 117:

Ա. Սարեակ (Սերինոս).
 Բ. Տարինոս (Սարեկիկ).
 Գ. Խաչկորիկ (Եզնակ).

Դ. Հատրեկիչ.
 Ե. Խաչկառուց.


Եւրոպայի անտառները կը բնակի, անցաւոր թռչուն մըն է եւ զա-
 նազան բնդեղէններով կ'ապրի։ Խաչկորիկն՝ ապուշ կը համարուի, վասն
 զի դիւրաւ կ'որսացուի եւ շատ գոյնարաւ բան կը սորվի։

Ուկրէնայի Կրէմլի (Emberiza citrinella) ոսկեգոյն դեղին փոր մը,
 եւ ետեւի մատին վրայ բութ բղունգ մ'ունի։

ՑԵՂ Բ. ԱՐՑԱՑՑՆԵՐ (Alaudidae).

Միջակ կտուց ունին: Գետնի վրայ կը շինեն իրենց բոցնը: Մնա-
յուն թռչուններ են աւելի՛ քան գաղթող:

73. Մարգաց աբրոյոյ (Alauda arvensis): Կունակի կողմը խարտեաշ
է, իսկ փետուրներու ծայրերն աւելի բաց գունով են, փորին կողմը ճեր-
մակ, կուրծքին վրայ գորշ գունով երկայն բծեր կան: Ասոնց ըղունգը
շիտակ է: Աչքի կը զարնէ ի մասնաւորի ետեւի մատին ըղունգը, որ
սուր եւ շիտակ եւ մատին չափ երկայն է:



Պտկ. 118. Մարգաց արտոյտ (1/2):

Արտոյտը բոլոր Եւրոպայի եւ Ասիայի բաց եւ անտառագուրկ դաշ-
տավայրերու վրայ կը գտնուի եւ գլխաւորաբար սերմանիքներով կ'ա-
պրի: Անարուեստ բոցնը հողին վրայ՝ պզտիկ ծակերու մէջ կը շինէ, եւ
4 կամ 5 հատ մուրժ ձերմակ եւ գորշ բծաւոր հաւկիթներ կ'ածէ:
Յատուկ եւ քաղցրանուագ երգ մ'ունի, զոր կը սկսի երկրէ բարձրա-
նալու ատեն, երթալով մեծամեծ շրջաններ ընելով վեր կը սլանայ. յե-
տոյ կամաց կամաց վար կ'իջնայ եւ երգը լննալուն պէս յանկարծ (քարի
մը պէս) գետին կ'իյնայ: Արտոյտը թէ՛ իբրեւ գարնան աւետաբեր եւ
թէ՛ իւր ախորժահամ մին համար շատ սիրելի է: Կայ նաեւ ուրիշ
տեսակ մը Կարգաց աբրոյոյ (A. cristata):

ՑԵՂ Գ. ԵՐԱՅԱՆԿՆԵՐ (Paridae)

Կարճ, միջակ եւ կոնաձեւ կտուց մ'ունին, վարի անկիւնը դէպ ի
վեր ծռած. ամուր սրունքներ ունին, իսկ ձիւրաններն՝ ամուր եւ շատ
ծռած: Ասոնց գլխաւոր տեսակներն են:

72. Մէժ Երայահաւը (Parus major): Կունակը դեղնագոյն կա-
նաչ, իսկ փորը դեղին է: Գագաթն եւ փողն սեւ են, նոյնպէս կուրծքին

մէջ տեղն երկայն սեւ շերտ մը կայ, տոնաթեւերը գորշ են: Կլոր քթի ծակերը՝ կտցին արմատին քովերն են եւ խողանաձեւ մազերով ծածկուած: Փետուրները բարակ եւ բամբակի պէս ուռուցիկ են:

Մնայուն թռչուն մըն է. Ասիայի ջերմագոյն գաւառներն եւ Եւրոպայի անտառները շատ կը գտնուի. միջատներէն զատ ամէն տեսակ սերմանիք եւ նոյն իսկ միս ալ կ'ուտէ, բայց ի մասնաւորի պզտիկ թռչնոց վրայ կը յարձակի եւ ասոնց ըղեղն կ'ուտէ: Բոյնը ծառերու խոռոչներու մէջ կը շինէ եւ տարին 2 անգամ 8—12 հատ ձերմակ եւ կարմիր գորշ բծերով հաւկիթ կ'ածէ:



Պտկ. 119. Երաշտահաւ (P. մ.):

Ճօճհաւ կամ Փոփր երաշտահաւը (*Parus pendulinus*) առաջինէն քիչ մը պզտիկ է, կռնակը ժանկագոյն գորշ, իսկ փորը ձերմակ է: Հունգարիայի եւ Բալկանեան թերակղզոյն եղեգնուտ ճահիճները կը բնակի, եւ իւր արուեստաւոր քրակաձեւ բոյնն՝ եղեգններու կոթուններէն կամ ուռենւոյ ձիւղերէն կը կախէ: Բոյնը գլխաւորաբար ծառոց մազմզուկներով կը շինէ եւ բարակ թելերով ու յարդով կը հիւսէ: Այս գեղեցկաշէն ու ամուր բոյնին ներքին կողմը բոլորովին ողորկ է եւ աղուամազ փետուրներով լեցուած: Այսչափ խնամք կը տանին այս մանր թռչնիկներն իրենց ձագերուն: — Բայց աւելի զարմանալի է Երկայն-ոգի երաշտահաւը (*P. caudatus*) շինած բոյնը: Այս բոյնին մուտքը սովորաբար գաղաթին կողմերը կ'ըլլայ, բայց առիշեղ, որպէս զի անձրեւէն պատսպարուի: Երկայնագի երաշտահաւը գիւրաւ կը զանազանի ուրիշ երաշտահաւերէն, վասն զի փորին կողմը միակերպ սպիտակ է, նոյնպէս գաղաթն ալ, բայց վրան սեւ շերտ մը կայ: Ամբիկայի երաշտահաւերու գոյնն աւելի շողջողուն է:



Պտկ. 120. Ծօճհաւ ($\frac{1}{2}$):


ՑԵՂ Դ. ԲՈՒՆ ԵՐԳԵՑԻԿՆԵՐ (Sylviidae)



Պտկ. 121. Հերինակտուց.
Սոխակի գլուխ (1/2):

Ասոնք մանր երգեցիկ թռչուններ են. բարակ, միջակ մեծութեամբ հերինաձեւ կտուց մ'ունին. մացառներու մէջ ճիւղէ ճիւղ կը ցատկեն, սիրով չեն թռչիր. ամառը միջատ կ'ուտեն, իսկ աշունը՝ հատիկներ. շերտաւոր սրունքներ ունին, տարին երկու անգամ կը թխսեն: Գլուխաւոր տեսակներն են:

73. Սոխակը (*Lusciola luscinia*) երկայն ու բարակ մարմին մ'ունի, կոնակի կողմը մութ ժանկագոյն է, իսկ փորին կողմը բաց մոխրագոյն, պոչը՝ կարմրագոյն խարտեաշ, ոտուքները մսի գորշ կարմրութիւն ունին:




Պտկ. 122. Սոխակ (3/4):

Ամառը՝ Եւրոպայի մեծ մասին մէջ կը գտնուի, եւ գլխաւորաբար սաղարթապատ ծառոց եզրերը կը սիրէ եւ մացառներու մէջ կը բնակի, ուր ճճիներով կը սնանի, էգը 4—6 հատ կանանչ մոխրագոյն հաւկիթ կ'ածէ, բոյնը մացառներու արմատին մօտ պլլեւայլ ցօղուններէ կը շինէ:

Արուն՝ շատ զօրաւոր, գեղգեղաձայն երգ (գայլալիկ) մ'ունի որ շատ քաղցրաձայն եւ գեղեցիկ կը հնչէ: Այս երգն՝ երբեմն ամբողջ գիշերը կը տեսէ, բայց սովորաբար առաւօտուն կանուխ սկսելով ամբողջ օրը կը շարունակուի, բայց ազատութեան մէջ միայն Ապրիլէն մինչեւ Յունիս կ'երգէ: Գերութեան մէջ ամէնէն աւելի 8 տարի կ'ապրի. որդերով եւ մըջեան “հաւկիթ” ըստածով կը կերակրեն, եւ կանանչ ճիւղերով գոցուած վանդակի մէջ կը պահեն, վասն զի շատ երկչոտ է: — Պէտք չէ Աւղոստի կամ Օգոստոսի (Lusciola Philomela) բուն սոխակին հետ շփոթել: Ծիծառնուկը բուն սոխակէն աւելի մեծ է, ձայնն ալ բարձր եւ յստակ է, բայց այնչափ քաղցր չէ: — Սոխակներու դասին կը վերաբերին Շիլ-հաւը կամ Գորշ Տօբէկանը (*Sylvia hortensis*), եւ իւր սեւ գազաթիւն համար դիւրաւ ճանչնող Թոփ-թոփը կամ Թոփ-թոփը (*Sylvia atricapilla*) եւայլն եւայլն. երգեցիկ եւ շատ օգտակար թռչուններ են:


(Թռչնոց փետուրներու եւ արտաքին մասանց անունները):



Պտկ. 123. Հասարակ ծնծղուկ. ծնծղուկին մարմնոյն արտաքին մասերը:

- | | | |
|---|---------------------|---|
| ա. վերի կտուց եւ քթի ծակ. | ե. գագաթ. | ձ. Թռիչք (Թռչա- Թեւ, ձեւնաթեւ). |
| բ. վարի կտուցը. | զ. ծոծրակ. | շ. բազկի Թռիչք. |
| գ. ծայր. | թ. այտ. | է. ուղղիչ փետուր- ներ (աղուամաղ). |
| դ. կտուցի վարի ան- կիւնը. | ի. վիզ (փող). | ժ. ծածկաթեւ: |
| ե. կողք (Թռչնոց աչքին քովի լերկ միտք) եւ աչք. | կ. կուրծք. | (Այս բաժանումն կ'արժէ բոլոր Թռչնոց մարմնոյն համար): |
| զ. ճակատ. | լ. փոր. | |
| | ն. կռնակ (Թիկունք). | |
| | ո. յետոյք. | |
| | պ. պոչ (տուտն). | |
| | գ. սրունք (պճեղ). | |

74. Ցախսարեկը (Troglodytes parvus) (տճ. չալը + ու-շո-ւ, Պոլ. ումկ. «է-ո-ո-է-ո-ո») Եւրոպայի ամենէն պզտիկ Թռչունն է, հազիւ 0.08 հրժ. երկայն կ'ըլլայ:



Պտկ. 124. Ցախսարեկ (1/2):

խոռոչներու եւ մկներու ծակերուն մէջ կը պահուըտի: Չմեռն ալ կ'երգէ:

ԿԵՆԴՐԱՆՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՑԵՂ Ե. ԿԵՐՆԵԼԱԳԻ ԹԻՂԻՆՆԵՐ (Turdidae)

Միջակ մեծութեամբ մարմին եւ կտուց ունին, վերի կտուցն ամբողջ երկայնութեամբը թեթեւ վար ծռած է, իսկ ծայրը քարթած (կարուած) է. նուրբ սրունք եւ ըստ բաւականի մեծ մատեր ու ճիրաններ ունի. սրունքներուն առջեւի կողմը եւ կողմնակի՝ մուտ է: Միագոյն կամ պիսակ գունով է: Ասանց գլխաւոր տեսակներն են:

75. Կեռնեի կամ ճարեիլը (տձ. Ժարախառ-ռ-ռ) (Turdus merula) բոլորովին սեւ է, ի բաց առեալ ոսկեգոյն գեղին կտուցն ու աչքի եզրը-



Պտկ. 125. Կեռնեի (1/4):

ները. հերինաձեւ կտուցը զլէն կարճ է: Էգը՝ սեւագոյն գորշ է: Երեք մատուրները դեպ ի առաջ ծռած են, իսկ մէկը՝ դեպ ի ետեւ. տես Պտկ. 115 գ. ձեւը:

Հաստ յոտակ ու ախորժ ձայն մ'ունի. միջատներէն զատ նաեւ հատապտուղներ կ'ուտէ. շատ անգամ խցերու մէջ կը պահեն որովհետեւ այլեւայլ եղանակներ կը սորվի: Խաղողներու տուած վնասը շատ մեծ է:

76. Ուրիշ նշանաւոր կեռնեխազգիներն են. Գիւ- կիւզն (Turdus pilaris):



Պտկ. 126. Գիւլ կիւզն ((1/4):

Գլխաւորաբար հիւսիսային եւ բուսայի եւ Ասիայի ցարասույ անտառները կը գտնուի, եւ միջատներով, բոտոսներով եւ խզունջներով կ'ապրի: Միտը շատ համեղ է: Սոսկալիւ կեռնեիլը (Turdus viscivorus). այս թռչունն անով նշանաւոր է որ ճագովի (մղամուրձի) կաշուն հատերը կ'ուտէ եւ ուրիշ ծառերու վրայ ալ կը տանի, եւ ասով այն ծառին վրան ալ կը բուսնի ճագովը: Տորգիլը կամ երգիչի կիւզն (Turdus musicus), որ քաղցրաբարբառ երգ մ'ունի: Նոյնպէս Ալպեան հարեիլը (Turdus saxatilis): Բոլոր ասանցմէ աւելի նշանաւոր է Բալթիայի հարեիլը (Turdus polyglottus) որ հարաւային Ամերիկէի մեծնէն գեղեցիկ երգեցողն է, եւ այնպիսի յաակութիւն մ'ունի, որ

բաւր ուրիշ թռչնոց՝ նաեւ անասնոց ալ, ձայնը կը հանէ, եւ այնպիսի կերպով մը, որ ամենեւին չի զանազանուիր: Կեռնեխներուն կարգը կրնայ դասուիլ Գէոֆոֆիլէ կամ Ջէպլէ Կեռնեխ (Cinclus aquaticus), որ երգեցիկ թռչուն մըն է, բայց ապրելու կերպովը լողացող թռչնոց կը նմանի:

ՑԵՂ 2. ՑԱՐՄԱՀԱՆԵՐ (Sturnidae)

Ընկերութեամբ ապրող անտառի թռչուններ են, միջակ մարմին եւ կտուց ունին. կտուցը կոնաձեւ, սրունքներուն առջեւի կողմը շերտաւոր է. միջատ ու խղանջ կ'ուտեն: Գլխաւոր տեսակներն են:

77. Ցարմահաւ կամ Ցարժը (Sturnus vulgaris) սեւ, մանուշակագոյն եւ կանանչ շողշողացող փետուրներ ունի. թիկունքը, փորն եւ պոչին փետուրները ձերմկեկ բիծերով են: Կտուցը դեղին է:

Զուարթ եւ շատխօս գաղթող թռչուն մըն է, որ շատ անգամ մեծ խմբերով անամէջ ծառերու եւ կամ որմածերպերու մէջ բոյն կը դնէ: Կ'ապրի գլխաւորաբար միջատներով, զորոնք երբեմն արածուող արջառներուն վրայէն կը քաղէ. գերութեան ատեն խօսիլ եւ երգել կը սարկի:



Պատկ. 127. Ցարմահաւ (1/4):

ՑԵՂ Է. ԴՐԱՅԻՍԱՀԱՆԵՐ (Paradisaeidae)

Ասոնք դիւրաւ կը ճանչցուին իրենց կտցովը որ միջակ մեծութիւն մ'ունի, երկնկեկ կոնաձեւ է, քիչ մը վար ծռած եւ ծայրին երկու կողմերը տափակցած. նոյնպէս զօրաւոր մագիլներուն երկու քովերը տա-



Պատկ. 128. Է. Դրախտահաւ (1/4):


փակ են: Տաք երկիրներ կը գտնուին, միջատ եւ հատիկ կ'ուտեն: Գլխաւոր տեսակներն են:

78. Հասարակ դրախտահաւ (Paradisea apoda) ձայնակի մը չափ մեծ է: Կոնակն ու փորը շագանակագոյն խարտեաշ է, գլուխն ու վզին վարի մասը լիմոնի դեղին, ճակատը՝ սեւ, փողը՝ զմրուխտի կանանչ: Արուներն արտաքոյ կարգի բարակ եւ երկայն ոսկեճամուկ դեղին փետուրներ ունին, որոնք երկու կողմանէ թեւերու տակէն հողմահարի պէս դուրս ելած եւ դէպ ի ետեւը դարձած են, նոյնպէս պոչին տակէն ալ 0.63 հրժ. երկայնութեամբ 2 հատ փետուրներ դուրս ցցուած են:

Այս շքեղ թռչուններն՝ որոնք շատ նշանաւոր են իրենց մարմնոյն երկու կողմն ունեցած գոյնզգոյն եւ թռուցիկ փետուրներու փնջերով, միայն Նոր Գուինեա եւ մերձակայ կղզիներուն վրայ բնակաբնակ կ'ապրին: Տեղացի բնակիչք (== Պապուաները) այս թռչունները բթածայր նետերով կը զարնեն եւ ոտուրները կարելով իբրեւ գլխոյ մեծագին զարդ կը ծախեն եւ այսպէսով Եւրոպա կը բերուի: Ոտքերը կտրուած ըլլալով երբեմն կարծուեցաւ թէ այս թռչուններն ոտք չունին, առկէ է լատիններէն apoda = անոտն բառը: Ուրիշ մէկ տեսակն է դեղին Պրիւլ (Oriolus galbula). զօրաւոր ձայնով յաղթանգամ երգեցիկ թռչուն մըն է:

ՑԵՂ Ը. ԱԳՒՆԻՆԵՐ (Corvidae)

Ագրասներու կտուցը շատ զօրաւոր է եւ դէպ ի առջեւը ծռած եւ տափակցած, խողաններով ծածկուած քթի ծակերը կտուցին արմատին քովերն են: Ասոնց ոտուրներն ամուր եւ քաշելու յարմար են, ծայրը՝ մաշած եւ կարճ մագիշներ կան: Երկրիս ամէն գօտիներու մէջ կ'ապրին, անախորժ, կոնչող, կարկաչող ձայն մ'ունին եւ շատ իրաւամբ ամենակեր կ'ըսուին, վասն զի գրեթէ ամէն բան կ'ուտեն: Գլխաւոր տեսակներն են:



Պտկ. 129. Եղջերուկի գլուխը (3/4):

79. Բոռ՝ կամ հասարակ ագրասը (Corvus corax). Թեւերուն տարածութիւնը 120 հրժ.էն աւելի է: Բոլոր մարմինը, կտուցն ու ոտուրները փայլուն սեւ են եւ կապուտակ կը շողան: Ամուր կտուցը կամարաձեւ է, եւ արմատին քովը խողաններով ծածկուած, իսկ շիտակ, կլոր եւ սեպաձեւ պոչը՝ թեւերուն փետուրներով բոլորովին կը ծածկուի:

Հասարակ ագրասը բոլոր Եւրոպա եւ հիւսիսային Ասիա կը գտնուի եւ խիտ անտառներու եւ քարածերայերու մէջ առանձին բոյն կը դնէ:

Մեծ ու տափակ բոյնը՝ խռիւններէ եւ մամուռէ շինուած է, ասոր մէջ
էգը Մարտին 4 մինչեւ 5 հատ կանանչ եւ գորշ բծերով հաւկիթ կ'ածէ:



Պտկ. 130. Հասարակ ագռաւ (1/3):

Ագռաւն ամէն ուտելի բան կ'ուտէ, պսիւնքն՝ որդ, միջատ, գորտ, թռչնոց
ձագեր, նապաստակ, պտուղ, բանջարեղէն եւ նոյն իսկ դիակ ալ. նաեւ փայլուն
բաներ ալ կը գողնայ եւ միանգամայն արտաքոյ կարգի նենգաւոր եւ զգուշաւոր է:
Ագռաւներու անախորժ կռչելու ձայնն ամենուն ծանօթ է. բայց խօսիլ ալ կրնան
որովի: Որի կամ Արեւոտն (Corvus corone) ալ թէ գունով եւ թէ կազմուած-
քով հասարակ ագռաւին շատ կը նմանի, ամէն տեղ անտառներու մուտքերու



Պտկ. 131. Նոյնը (1/3):

քով բազմութեամբ կ'ապրի եւ թռչնոց
ձագեր, ցանուած սերմանիք, պտուղ,
դիակ եւ անտառի ծառերուն կոկոն-
ները կ'ուտէ: Ասոր համար որորդներէն
կը հալածուի եւ կը զարնուի: — Սեր-
ճաւոտն (Corvus frugilegus)
հասարակ ագռաւին շատ կը նմանի, փե-
տուրները մանուշակի գունով կը շո-
ղան: Կտուցին արմատը մերկ է:

Ասոր շատ կը նմանի՝ Եղբորն-կը
կամ Մութեւոյն տոտն (Corvus
cornix), բայց գլուխը, թեւերը,
պոչն ու փողը բոլորովին մխրագոյն
են. հիւսիսային երկիրները կը գրա-
նուի, բայց ձմեռը մինչեւ Բալկա-
նեան թերակղզին կ'իջնայ: — Ասկէ
շատ պզտիկ է ճոյս-կը (Corvus
monedula), միայն գլուխն ու վիզը
մխրագոյն է, մնացած բոլոր մար-
մինը սեւ է: Ամէնէն աւելի եկեղե-
ցիներու աշտարակացը վրայ բոյն կը
դնէ եւ շատ դիւրու կ'ընտանենայ:


80. Անթել կամ Կա-
լաղակը (*Pica caudata*)
ագռաւի մը չափ մեծ
է, բայց մարմնոյն կաղ-
մուածքն ագռաւուն չի
նմանիր, գոյնզգոյն եւ
շողացող փետուրներ ու-
նի: Պոչը սեպաձեւ եւ
մարմնէն աւելի երկայն
է, թեւերը կարճ ըլա-
լով պոչը չեն ծածկեր:
Փորն ու թիկունքը ճեր-
մակ են. պոչն ոսկեգոյն
կանանչի պէս կը փայլի,
իսկ բոլոր մարմնոյն մնա-
ցած տեղերը սեւ են:



Պտկ. 132. Անծեղ (1/2):

Պտկ. 132. Անծեղ (1/2):
առաւել շատ խոստ թռչուն
մըն է, փայլուն բաներ կը
գողնայ եւ բարձրաբերձ
ծառոց բարձունքը՝ շինած
բոյնը կը տանի: Բոլոր Եւ-
րոպա եւ Ասիայի հիւսի-
սային կողմերը կը գտնուի եւ
ագռաւներու պէս ամէն տեսակ բան կ'ուտէ:
Եթէ ձագ որսացուի, շատ կ'ընտանենայ եւ երգել ու խօսիլ կը սորվի:

81. Ճայը (*Garrulus glandarius*) 0.31 հրճ.
մեծութիւն ունի եւ փե-
տուրներուն ընդհանուր
գոյնը՝ կարմրի զարնոզ մոխ-
րագոյն է. թռչաթեւե-
րուն՝ ծածկիչ փետուրները
շատ գեղեցիկ են եւ սեւ ու
կապոյտ շերտերով, թռչա-
թեւերն ու պոչը՝ դէպ ի
կոնակի կողմը շատ ճերմակ
են: Կտուցը կարճ է եւ
ծայրը քիչ մը դէպ ի վար
ծռած: Գլխուն փետուրները՝
կատար մը կը կաղմեն:



Պտկ. 133. Ճայ (1/2):

Միջին եւ հիւսիսային Եւրոպայի անտառները կը գտնուի. ամառը՝ միջատներով, որդերով եւ արմտեաց սերմերով կ'ապրի, իսկ ձմեռը կաշկաններով եւ թեղօշի պտուղներով, զորոնք շատ անգամ իբրեւ պաշար կը ժողվէ:

ՅԵՂ Թ. ՅԱՄՓՐՈՒԿՆԵՐ (Laniidae)



Պտկ. 134. Շամփրուկի գլուխ (1/2):

Համփրուկներու վերի կտուցը զօրաւոր է, ծայրը ճանկաձեւ վար ծռած՝ եւ ատամնաձեւ կտրուած սուր մաս մը ունի, որ ապամիջին կտուցի, ասկէ առեալ Ապամիջինապոս ալ կ'ըսուին այս թռչունները. իսկ կտցին քովերը տափակ են: Կռուարար, յափշտակիչ եւ միջատակեր թռչուններ են, եւ միայն ձմեռը զարտուղութեամբ հատիկներ ալ կ'ուտեն: Սրունքներն շերտաւոր են, իսկ առջեւի մատը բոլորովին ազատ է: Թռչաթեւերուն վրայ 10 մեծ փետուր ունին: Գլխաւոր տեսակներն են:

82. Կարմիր շամփրուկ (Lanius collurio) կռնակը խարտեաշ կարմիր է: Կուրծքը կարմրագոյն ճերմակ, պոչն ալ՝ սեւ. աչուրներուն վրայէն սեւ գիծ մը կ'անցնի, այս գիծն՝ էգերուն եւ ձագերուն վրայ՝ գորշ, իսկ արուներուն վրայ սեւ կ'ըլլայ:



Պտկ. 135. Կարմիր շամփրուկ (1/2):

Գաղթող թռչուն մըն է, բոլոր Եւրոպա եւ Փոքր Ասիա տարածուած է, եւ գլխաւորաբար փշտո մացառներու մէջ բոյն կը շինէ: Մաագրուութեան արժանի սովորութիւն մ'ունի. իւր կերակուրը այսինքն բզեզներ, մարախներ, թռչնոց ձագեր, մողէզներ, մկներ եւայլն. փշերու վրայ կը շամփրէ, սրպէս զի ուզած ատեն ուտէ:

ՑԵՂ Ժ. ՃԱՆՃՈՐՄՆԵՐ (Muscicapidae)

Ասոնց կառուցն երեքանկիւնի է, վասն զի արմատին քովերը տափակցած է, սրունքներու առջեւի կողմը շերտաւոր է: Գլխաւոր տեսակներն են:

83. Այլեւ կամ «Մեփափափէն» (Bombycilla garrula) լեցուն մարմին մը, գեղեցիկ կակուղ փետուրներ եւ շիտակ գլուխ, գլխուն վրայ ալ կարմիր եւ դեղնագոյն գունով կատար մ'ունի: Ընդհանուր գոյնը կարմրեկեկ մոխրագոյն է, վիզն ու թեւերը սեւ են, ասկէ զատ պոչին եւ թեւերու վրայ գեղեցիկ ճերմակ եւ դեղին գունով շեղ գծեր կան:




Այս գեղեցիկ փետուրներով զարդարուած թռչունը հիւսիսային կողմերը կը բնակի եւ երբեմն՝ եւ այն միայն ձմեռը, աւելի ջերմագոյն երկիրներ կ'երթայ: Արտաքոյ կարգի շատակեր է, այլեւայլ ընդեղէններով կը սնանի, ընկերութեամբ կ'ապրի եւ շատ դիւրաւ կ'որոպացուի: Միջոցն ճանճորը (M. solis) գաղթող թռչուն մըն է:

Պտկ. 136. «Մետաքսագի», (1/4):

զարմանալի է օդի մէջէն ճանճերն որսալու յաջողակութիւնը:

ՑԵՂ ԺԱ. ԹԻԹՈՐՆԵՐ (Hirundinidae)




Պտկ. 137. Հերծակտուց (Այծկիթի գլուխ (1/2)):

Ծխառնները կարճ, լայն, տափակ, երեքանկիւնի եւ մինչեւ աչքերը ճեղքուած կտուց ունին, ասկէ առեալ Հերծակտուց ալ կ'անուանուին: Ասոնց ոտուրները կարճ ու տկար եւ միայն մագլըլու յարմար են, հազիւ քալել կրնան: Առանց բացառութեան ամէն ալ միջատներով կ'ապրին, զորոնք թռչելու ատեն կ'որսան, իսկ ջուր միշտ թռչելով կը խմեն: Մանր մարմին մ'ունին:

84. Հինալան Թիթառ (Թիծեռնակ) (Hirundo rustica): Կռնակը փայլուն կապուտակագոյն սեւ, իսկ փորին կողմը ճերմակ կամ կարմրա-

գոյն է. ճակատն ու վիզը՝ գորշ կարմիր. թեւերն արտաքոյ կարգի երկայն եւ սրածայր: Նոյնպէս պոչին երկու եզրներու արտաքին փետուրները շատ երկայն են, եւ պոչը խորունկ պատառուած երկձիւղ մը կը կազմէ: (Ոտքերուն համար՝ համեմատէ Պտկ. 115, Ա. ձեւը):



Պտկ. 138. Եինական ծիծառ (ծանժ մը կ'որոսայ):

Այս ծիծառն ամառը՝ Ասիա եւ Եւրոպայի ամէն կողմը կը գտնուի, գլխաւորաբար գեղերը ախաւներու եւ արջառներու քովերն, եւ տանիքներու տակը բոյն շինելու սովորութեամբ ամէնուն ծանօթ է: Բոյնը կաւէ կամ փողոցներու տիղմէ կը շինէ:

Ծիծառները մարդիկներու մօտ բնակիլը շատ կը սիրեն, եւ բնակարաններու մէջ ալ ճռուողելով չորս կողմը կը թռչտին, ուստի թէ իրենց օգտակարութեանը, եւ թէ իբրեւ գարնան աւետարներն ամենուն շատ սիրելի են: Արագ արագ եւ մանուածապատ ջրջաններ ընելով աշունն ընկերութեամբ գէպի Ափրիկէ երկայն ճամբորդութիւն կ'ընեն: Թէ կերպարանօք եւ թէ ապրելու կերպովն ասոր կը նմանի Ըփօնի ձիծառը (Hirundo urbica), բայց վզին տակը գորշ կարմիր բիծ չունի, պոչն ալ կարճ է եւ քիչ ճեղքուած:




Պտկ. 139. Ըստանի ծիծառ եւ ծագերամը (1/4):

ԿԱՐԳ 2. ԿԱՐԿԱՉՈՂՆԵՐ (Clamatores)

Կարկաչողներուն կտուցն ու ոտուքները զանազան կազմութիւն ունին, աւելի քալելու յարմար ոտքեր ունին, շատ քիչներն կրնան մագլըլ, չորս մասերէն Յը գէպ ի առջեւ եւ միայն մէկ հատը գէպ ի ետեւ ծռած է: Երգելու գործարան չունին, այլ միայն զոյգ մը դնդերը: Ասոնց թեւերուն վրայ 10 հատ մեծ փետուրներ (վարազաթեւեր) կան, իսկ իրենց ոտքերու սրունքներուն առջեւի կողմը շերտաւոր է: Շատ գեղեցիկ բուսական թռչուններ են: Ասոնք 5 ցեղի կը բաժնուին:

ՑԵՂ Ա. ԿԻՊՍԵԼՆԵՐ (Cypselidae)

85. Մառախուղ կամ Կիպսել (Cypselus apus) գորշ գոյն մ'ունի, իսկ վիզը ճերմակ է: Ջօրաւոր եւ դաշունաձեւ կոր թռչաթեւերը շատ երկայն են, ընդհանուրապէս ոտուքները՝ արտաքոյ կարգի կարճ: Ոտուքները պատերու եւ ժայռերու վրայ մագլըլու յարմար են:



Պտկ. 140. Կիպսել (Դ):

Կիպսելներն՝ արտաքոյ կարգի շուտութեամբ եւ բազմութեամբ կը թռչին եւ պատերու վրայ կը շինեն իրենց բոյնը: Շիտակ գետնի վրայէն չեն կրնար դիւրաւ վեր բարձրանալ թռչել:

Սողանիւնը (Collocalia esculenta) փոքրիկ՝ կանաչը գորշ, խոկ փոքր՝ ճերմակ, ծիծառ մըն է: Այս նշանաւոր ծիծառն բոյնը՝ զոր ճաւաղը վրայն քարածերպերուն եւ ծովու քովերն անմատչելի քարանձաւներու մէջ կը շինէ, կ'աւտուի: Այս բոյները տափակ պնակի մը կը նմանին եւ ճերմակ, կարծր եւ բոթաթափափ նիւթէ մը շինուած են, տաք ջրոյ մէջ կը կակղնան եւ սոսնձի պէս կը կպչին: Ըստ ինքեան ամենեւին համ չունին: Հաւանականագոյնս միայն թռչնոյն շուրջած առատ շողիքէն շինուած են:

ՑԵՂ Բ. ՇԵՎԻԹՆԵՐ (Caprimulgidae)

Ծիծառն կը նմանին, բուրի նման փետուրներ ունին. ասոնց կտուցը շատ կը բացուի: Գլխաւոր տեսակներն են:

86. Այթմիլը (Այթադիայ) (Caprimulgus europaeus) փափուկ, մութ գունով բուրի նման փետուրներ ունի: Կարճ ու լայն կտուցը 0.05 հրժ. չափ կը բացուի, գեղին երակքը ամուր խողանի նման մազեր ունի: Թեւերն արտաքոյ կարգի երկայն եւ սրածայր, իսկ ոտիցը ծայրը

3 առջևի եւ հատ մըն ալ ետեւի մատուրներ կան. այս ետեւի մատը ուղած ատենն ըստ բաւականի կ'երկնցընէ:



Պտկ. 141. Այծկիթ (Դ/2):

Այծկիթը գաղթող թռչուն մըն է, միայն գիշերը՝ մեծ բղէզներ եւ թիթեռներ բռնելու համար դուրս կ'ելլէ կը թռչի: Ցերեկը գետնի վրայ եւ կամ ծառերու ցած ճիւղերուն վրայ կը պահուրաւ:

ՑԵՂ Գ. ՄԵՂԸԱԾՈՒԾՆԵՐ (Trochilidae)

Իշամեղուի մը չափ մեծութիւն ունեցող սիրուն թռչուններ են, մանր սրածայր եւ շատ անգամ գլանաձեւ կտուց մ'ունին. արուեստական բոյն կը շինեն եւ երկու հատ երկայնաձեւ հաւկիթ կ'ածեն. 400 տեսակ ճանչցուած է մինչեւ հիմայ: Գլխաւոր տեսակներն են:

87. Շողափեղուի կոլեբրէն (Trochilus mosquitos) ամէնէն պզտիկ ու սիրուն թռչուններէն մէկն է. հաղիւ 0.08 հրժ. երկայնութիւն ունի, գագաթը սուտակի պէս վառվռուն կարմիր է, վիզը՝ կարմրագոյն դեղին եւ ոսկեգոյն կանաչ կը շողայ, իսկ փորը՝ ճերմակ է: Ղեզուն կրնայ երկնցընել, եւ ծայրն երկբլթակ թելերու բաժնուած է: Ցկար ու կարճ ոտուրները մինչեւ մատուրները փետուրներով ծածկուած են:

Այս կոլեբրէն իւր բազմաթիւ տեսակներովը, Ամերիկա եւ գլխաւորաբար Բրասիլիա կը գտնուի, եւ ծաղկած տնկերուն բոլորափքը կը թռչի, եւ իւր երկայն կտուցն անոնց ծաղիկներուն մէջ կը խոթէ, ոչ թէ մեղը ծծելու, այլ անոնց մէջ եղած մանր ճճիներն որսալու:

Այս շքեղ ու վառ վառն կենդանեաց քանի մը տեսակները հազիւ $2\frac{1}{2}$ հրժ. երկայն կ'ըլլան, անոր համար ալ ճանճիլ Ռաւաններ կ'ըսուին: Բոյներն որոնք բամբակէ եւ ուրիշ աստնց նման բարակ նիւթերէ կը շինուին, հազիւ կէսընկուզի կեղեւին չափ մեծ կ'ըլլան, նոյն իսկ ձուներն ալ հազիւ ոլոռի մը չափ կ'ըլլան: Գերութեան մէջ շատ քիչ կ'ապրին: — Կոլեբրիններէն ամենք երկայն փետուրներ կ'ունենան, ինչպէս Ջարձնուլ Բերձոն (Mellisuga mirabilis) ըստածը: Էգերուն փետուրներու գոյնը շատ կենդանի չ'ըլլար, զոր օրինակ Ամերիկէի Հաւաքի Տրոչիլուս (Trochilus colubris) էգն, ընդհանուրապէն արուններու փետրոց գոյնը շատ կենդանի կ'ըլլայ, ինչպէս Դիւ Բերձոն (Mellisuga magnifica) արուն:



Պտկ. 142. Հասարակ տրոքիդոս եւ իւր ընդնը (վերը): Շքեղ մեղրածուծ (վարը) (քն. մեծ):

ՑԵՂ Դ. ՅՈՊԱՊՆԵՐ (Upupidae)

Գլխաւորն է՝

88. Հասարակ Յոպոպը (Upupa epops) 0.05 հրժ. երկայն, նուրբ կտուց մ'ունի: Կունակին կողմը՝ ժանկագոյն, իսկ փորին կողմը՝ ճերմակ է: Թեւերն ու պոչը սեւ են, որոնց վրայ ճերմակ ժապաւէնի ձեւով շերտեր կան: Գլխուն վրայ մեծ ու գեղեցիկ փետուրներու խուրձ մ'ունի, զոր կրնայ վեր տնկել:

Ատիայի եւ Եւրոպայի անտառները կը բնակի եւ գաղթող թռչուն մըն է, բոստոններ եւ բնդեռներ կ'ուտէ, լեզուն կարճ ըլլալով՝ որսը վեր կը նետէ եւ կտցով կը



Պտկ. 143. Եոպոպ (1/2):

բռնէ ու կը կլլէ: Ծառերու խոռոչներու մէջ կը բռնէ, եւ կեղտոտ ու գարշատ թռչուն մըն է:

89. Ճեղագոռաւ (Coracias garrula): Հառագոյն կոնակէն զատ՝ բոլոր մարմինը գեղեցիկ կապոյտ է: Կտուցը տկար եւ քիչ մը կոր է: «Ճեղագոռաւ», ըսուած է, բայց ագռաւներու կարգէն չէ:



Պտկ. 144. Ծեղագոռաւ (1/2):

Գալթոյ թռչուն մըն է, գաշտագետին տեղերը կը բնակի եւ միայն բոտոտներով, միջատներով եւ փոքրիկ գորտերով կը սնանի, բայց արմրտիք չ'ուտեր:

ՅԵՂ Ե. ԱՂԿԻՈՆՆԵՐ (Alcedidae, Alcyonidae)



Պտկ. 145. Աղկիոն (1/2):

Քաշկու յարմար կարճ եւ տկար ոտուրներ ունին, գլուխն ու կտուցը անհամեմատ մեծ, վերջինը քառակուսի եւ շիտակ է: Ասոնց գլխաւորն է:

90. Աղկիոնը (Ձղնիկ) (Alcedo ispida) կարճ եւ հաստ մարմին մ'ունի: Գլխուն վերի մասը եւ թեւերը կանաչ եւ կապոյտ գունով են, կոնակն ու կարճ պոչը՝ կապոյտ, եւ փորը ժանկագոյն կարմիր: Հիտակ ու անկիւնաւոր կտուցը՝ երկայն է: Մանր ոտուրներուն վրայ (Պտկ. 115 զ.) 3 հատ առջեւի եւ հատ մ'ալ ետեւի կարճ մատուրներ կան:

Այս գեղեցիկ մնայուն թռչունն ամենն աւելի խոնաւ գետափներու քովերը կենալ կը սիրէ, եւ հոն ձկերու, տղուկներու եւ ծովային միջատներու գարանակալ կ'ըլլայ: Չմեռը սառչոյցէ ազատ տեղեր կը փնտռէ, բայց երբեք սառչոյցի վրայ ալ կը նստի: Հիները կը կարծէին թէ աղկիոնն՝ ալեկոծութիւնը կը հանդարտեցնէ:

ԿԱՐԳ 3. ՄԱԳԼՈՂ ԹՈՒՉՈՒՆՆԵՐ (Scansores)

Մագլող Ռուշնները բունակալ թռչուններ են եւ մագլելու յարմար ոտքեր ունին, այսինքն իրենց մատուրներուն երկուքն առջեւ՝ իսկ երկուքն ալ ետեւ դարձած են (Տես Պտկ. 115, Բ. ձեւը): Բայց թէ փետուրներուն ձեւովը եւ թէ սրունքներուն որպիսութեամբն իրարմէ այնպէս կը տարբերին, որ մասնաւոր ցեղերու կը բաժնուին. ոմանք Եւրոպա եւ Ասիա կը գտնուին, իսկ մեծագոյն մասը՝ Ամերիկա: Շատ օգտակար են այս թռչունները: Գլխաւոր ցեղերն են:

ՑԵՂ Ա. ԿԿՈՒՆՆԵՐ (Cuculidae)

Գրեթէ 160 տեսակ կ'ու ճանչցուած է մինչեւ այսօր. ոմանց կտուցը մինչեւ աչքին տակը ճեղքուած է. սրունքներն շերտաւոր են: Ասոնց տակ կ'երթայ՝

91. Հասարակ Կկոն (Cuculus canorus): Կոնակի կողմի փետուրներուն գոյնը՝ մոխրագոյն, իսկ փորին կողմն ալ ճերմակ է, ասոր վրայ սեւ գունով շերտեր կան: Ոտուրները կարճ եւ գեղին գունով են:


Այս թռչունն՝ որուն բարձրաձայն՝ բայց միայն երկու հնչիւնէ կազմուած ձայնն ամենուն ծանօթ է, ճճիներով՝ բայց գրեթե խաւորաբար մազոտ թրթուրներով կը կերակրի, եւ ասով շատ օգտակար է: Թրթուրներու մագերն իւր ստամոքսին մէջ կը խրին կը մնան, անոր համար ալ ստամոքսը մազոտ կ'երեւայ: Շատ երկչոտ է, ծառերու ոստախիտ բարձունքը կը պահուրտի, այնպէս որ շատ դիւրութեամբ չի տեսնուիր:



Պտկ. 146. Կկու (1/4):

Այս թռչնոյն մէկ մասնաւոր յատկութիւնն ալ այս է. եզր՝ պզտիկ երգեցիկ թռչնոց բոյները 4 մինչեւ 6 անգամ՝ մէկ մէկ հաւկիթ կ'ածէ, եւ թող կու տայ որ անոնք այս հաւկիթները թխեն:

92. Մեծ Պղպեղակերը կամ Ցու-կան (Ramphastus Toco): Ոմանք իբր զատ ցեղ՝ իսկ ոմանք կկուներու մէկ սեռը կը համարին: Ցու-կան արջնաթոյր սեւ գունով փետուրներ ունի, իսկ վիզը ձերմակ է: Արտաքոյ կարգի մեծ, բայց տկար կտուցը գեղեցիկ նարնջագոյն դեղին է, ծայրն ալ կոր ու սեւ: Լեզուն նեղ, եղջերանման եւ եզրները թել թել է: Ոտուրները մագլելու յարմար են:




Պտկ. 147. Պղպեղակերին զլուին ու լեզուն:

Պղպեղակերը երկշու թռչուն մըն է, Բրազիլիայի անտառները կը բնակի մինակուկ առանձին, եւ հիւթեղ ու պարարտ հունտերով (գլխաւորաբար կարմիր պղպեղով) եւ միջատներով կը կերակրի: Թէ կերպարանքով եւ թէ ապրելու կերպովն ասոր շատ կը նմանի նաեւ Պղպեղակեր Դուրիտոյնը (Ramphastus Ariel):



Պտկ. 148. Եղջերահատու զլուինը (Ն):



Պտկ. 149. Քնարատուտն (Ն/10):

93. (Ունգ)Եղջերահատը կամ Սաղաւար-տաւոր Բու-լտանը (Buceros rhinoceros) հնդկա-հաւի մը չափ մեծ է, ի բաց առեալ ձերմակ փորն եւ պոչը, բոլոր մարմինը՝ սեւագոյն է: Կտուցը՝ 0.30 հրճ. երկայն եւ անհամեմատ մեծ՝ բայց շատ տկար է, արմատին կողմը սեւ, մէջտեղը՝ կարմրագոյն, իսկ քիչ մը կոր ծայրը՝ դեղին է: Կտուցին վրայ դէպ ի վեր դարձած եղջերեայ յաւելուած մ'ունի:

Փիլիպպեան, Ճաւա եւ Սու-մատրա կղզիները կը գտնուի, եւ ազաւաններու պէս ամէն տե-սակ ուտելի բան կ'ուտէ:

Նոր Հոլանդայի Քնարատուտը (Maenura superba) փափանի մը չափ մեծ կ'ըլլայ արուն՝ պոչին վրայ 16 հատի չափ շքեղ փետուրներ ունի, որոնք 3 տե-սակէ կազմուած են եւ ճիշդ քնարի ձեւ մը կը կազմեն:

ՅԵՂ Բ. ՓՆՅՏՓՈՐՆԵՐ (Picidae)

Շիտակ կտուց մը եւ երկայն լեզու մ'ունին, ամէնն ալ մի-ջատ կ'ուտեն գլխաւորներն են:

94. Սէ- Բայրփորը կամ Ժառփորիկը (Picus Martius). Ի բաց առեալ իւրա կարգի գագաթը՝ բոլոր մարմնը ամբողջ սեւութիւն ունի: Կռացը՝ երկայն, ուղիւ, անկիւնաւոր է, իսկ առջևի կողմը սաստիկ որածայր, քթի ծակերը՝ կարճ խզաններով ծածկաւած են, կարծր, որածայր լեզուն՝ որուն վրայ պղտիկ ճանկեր կան, շատ կ'երկնայ: Ո-



Պտկ. 150. Սեւ փայտփոր (1/2):

տուրները չորս մատուրներ ունին, որոնց երկուքը քիչ մը կպած եւ դէպ ի առջև ուղղուած են, 2 հաստ աղաւ եւ ետեւը ծռած են: Սեպագանգ պոչը դժուարաթեք է եւ մագլելու ատեն իրեն նեցուկ կ'ըլլայ:

Այս մնայուն թռչունը՝ հիւսիսային Եւրոպայի եւ Ասիայի անառւները կը գտնուի, զանազան միջատներով կ'ապրի, ի մասնաւորի մեծ միջիւններով, զորոնք որսալու մասնաւոր եղանակ մ'ունի եւ այս է. իւր կարծր կտցովը ծառոց բուներուն՝ ուժգին հարուածներ կուտայ եւ քիչ ժամանակի մէջ ծառերու վրայ մեծամեծ ծակեր կը բանայ, եւ իւր երկայն, որածայր լեզուովն անմիջապէս աստեղ մէջէն իւր որսը կը քաշէ դուրս կը հանէ:

Ծառերուն վրայ կրնայ շուտ շուտ վեր վար վազել: — Եւրոպայի անառւները սեւ փայտփորէն զատ կը գտնուի նաեւ կանաչ Բայրփորը (Picus viridis) որ առաջին պղտիկ է. ուրիշ շատ մը Պիս- Բայրփորի- տեսակներ կան:

ՏԵՂ Գ. ՊՍԻՏԱԿԱՆԻԻ (Psittacidae)

Ասոնք դիւրաւ կը ճանչցուին իրենց վերի կտցովը, որ կարճ, հաստ, կեռ եւ շարժական է, իսկ արմատին քովերը մոմամորթ մ'ունի: Հաստ, մնուտ լեզուն իբրեւ շօշափելու գործարան կը գործածեն:




95. Ամազոնեան դոգաթը կամ պապ-
կան (Psittacus amazonicus). Ընդհանրապէս
գոյնը կանանչ է, գլուխը եւ այտերը դեղին,
կոքին բոլորտիքը եւ ճակատը մանուշակա-
գոյն կապոյտ, թեւերուն ծալքին տեղը՝ մի-
ջակ թռչաթեւերն եւ պոչին արմատը՝ կար-
միր են:

Այս դոգաթը Ամազոն գետին քովերը
Բրասիլիայի անտառները կը բնակի, բազմու-
թեամբ ծառոց վրայ ապրին անդին կը մագլէ-
եւ իրիկունը շատ աղմուկ կը հանէ: Ասկէ շատ
կը բերուի Եւրոպա, որովհետեւ դիւրաւ խօսիլ
կը սորվի եւ իւր հոսկիտ շարժումներովը կը
զուարճացնէ: Գերութեան մէջ ամէն տեսակ
բան կ'ուտէ եւ շուտ կ'ընտանենայ, բայց չճանչ-
ցած մարդիկը կը խածնէ:

Տաք երկիրները կան բազմաթիւ դոգաթ-
ներու տեսակներ, որոնք պայծառ եւ ակնախա-
ղոյներով նշանաւոր են, զօրինակ Ար- ֆեյէյէկը,
Արօր-իը (Sittace macao) որ երկայն պոչով բո-
լորովին կարմիր մեծ դոգաթ մըն է, կապոյտ եւ
կանանչ փետուրներ ունի, Հարաւային Ամերիկա
կը գտնուի եւ բարձրագագաթ ծառոց վրայ
բոյն կը շինէ: Բայց նաեւ պարզապէս միագոյն
պապկաններ ալ կան, ինչպէս Գորշ պապկան կամ Գորշ-
թաթը (Psittacus Eri-
thacus) որ սորվելու շատ ընդունակութիւն ունի: Ուրիշ պապկաններ ալ

Պտկ. 151. Արօրակը (1/6):



Պտկ. 153. Բու (1/6):

96. Բռն կամ Բոցփեղափայլ (Strix flammea): Թեւերուն տարածութիւնը գրեթէ մէկ մէտր է, բարակ, կակուղ եւ գեղեցիկ փետուրներ ունի: Կոնակի կողմը մոխրագոյն՝ իսկ փորին կողմը ժանկագոյն դեղին է: Կոնակին վրայ բազմաթիւ բարակ շեղ շերտեր կան, իսկ փորին կողմն ալ մութ գորշ գունով մարգարտաձեւ բծեր ունի (ուստի առեալ ճարգաբանաբար Բո ալ ըսուած է): Մեծ եւ թուխ աչուրներուն բոլորտիքը բարակ եւ ճերմակ փետուրներէ կազմուած կաննաւոր խիտ պսակ մը կայ (որ Բոյ կ'անուանուի):

Այս բուն՝ շատ տեղ քաղաքներու մէջ տանեաց տակ կը գտնուի: Մկներու եւ խլուրդներու վրայ կը յարձակի, ասով օգտակար է:

97. Բռն կամ Եղջեղափայլ (Strix bubo): Թեւերուն տարածութիւնը 2 մէտր է: Բոլոր մարմինը, բայց գլխաւորաբար գլուխը



Պտկ. 154. Բուէժ (1/6):

շատ հաստ կ'երեւան: փետուրներուն գոյնը ժանկագոյն դեղին է, որուն վրայ ալէկերպ մութ գունով բծեր կան: Բոլորով գլխուն վրայ՝ տկանջներէն վեր, երկայն շիտակ փետուրներու փունջեր կան: Աւազները ժանկագոյն դեղին եւ շատ մեծ են: Ոտուներն եւ նոյն իսկ մատուներն ալ թանձր փետուրներով ծածկուած են, բռւէճը կրնայ այս մատուներէն մէկ հատը ըստ կամքի դէպ ի ետեւ ծռել:

Բռւէճը՝ Ասիայի եւ Եւրոպայի ժայռուա խոխոճները կը բնակի, ցերեկը՝ ժայռերու, ծերպերու, հին աւերակաց տակն եւ կամ սնամէջ ծառերու մէջ կը պահուի: Գիշեր ատեն մեղմ թռիչով անտառներու մեծ ու պղտիկ անաւանց վրայ կը յարձակի եւ երբեմն երէններուն մեծ զնառ կը հասցնէ:

Իրեն տեսուր ձայնն՝ որ գիշերուան հանգարութեան եւ անտառի մոլորութեան մէջ շատ անախորժ կը հնչէ, քանի մը աւելորդապաշտական զօյցներու առիթ տուած է:

ՑԵՂ Բ. ԱՅԴՆԻ (Vulturini)

Հաստ եւ ամուր, բայց շիտակ կտուց մ'ունին, միայն վերի կտուցին ծայրը կեռ է: Գլուխն եւ շատ անգամ վիզը բոլորովին լերկ եւ կամ միայն աղուամազով ծածկուած կ'ըլլան: Ասոնց թեւերն շատ մեծ ու երկայն են եւ հանդարտ կեցած ատեն մարմնոյն վրայ չեն հանգչիր. ճիրանները շատ քիչ ծռած են եւ բութ են: Ընկերաբար կ'ապրին: Հատակեր են, բայց գրեթէ միայն սատակ ուտելով շատ օգտակար են: Գլխաւորներն են:

98. Պասկուճը կամ Կոբճը (Sarcorampus Gryphus), որուն թեւերուն տարածութիւնը 3 մինչեւ 4 մետր է: Գոյնը՝ սեւ, բայց վարազաթեւերն ու վզի մանեակը ճերմակ է, իսկ լերկ վիզն ու գլուխը՝ որ մսեղէն սանդր կամ խոզոպի մ'ունի եւ խոզաններով ծածկուած է, մութ կարմիր են:



Պտկ. 155. Պասկուճ (1/10):

Հարաւային Ամերիկայի Անդեան լեռանց վրայ կը գտնուի, 6000 մետր բարձր կը թռչի: Այս բարձրութենէն մեծամեծ անասնոց դիերը կ'անէ, կը դիտէ, եւ ասոնց վրայ յարձակելով այնպէս շատ կ'ուտէ որ ալ չի կրնար թռչիլ եւ շատ դիւրաւ վարմերով կը բռնուի:

99. Սպիտակագլուի աւգղը (*Vultur cinereus*) թեւերը տարածելով 2.5 մետր երկայնութիւն կ'ունենայ. վզին բոլորովը եղած մաղերը մանեակ մը կը կազմեն. ուստի առեալ մանէկաւոր ալ կ'անուանուի: Միւս փետուրները կարմրկեկ խարտեաշ գունով են, միայն թռչաթեւերն եւ տոնաթեւերն (պոչի թեւերն) սեւագոյն են:




Պտկ. 156. Սպիտակագլուի անգղ (1/2):

Այս անգղն Ափրիկէ, Փոքր Ասիա, Ասորիք եւ Եւրոպոյի Հարաւային կողմերը կը բնակի: Գիշերը լեռներու վրայ կ'անցընէ, իսկ կէսօրուան մօտ ատենները գաշտերու վրայ կը խոյանայ, եւ արտաքոյ կարգի բարձր կը թռչի, սրատես աչուքներովը դիակները կը դիտէ եւ գրեթէ շիտակ դիակին վրայ կը յարձակի: Տաք գաւառները թէ՛ այս անգղն եւ թէ՛ ասոր մերձաւոր տեսակները շատ օգտակար են, վասն զի սաակած անասունները կ'ուտեն կը սպառեն, եւ ասով օդն ապականելէն կը պահեն:

100. Ուլիւիւղ կամ Գաւանանգղը (որ Անգղաբէլ ալ կ'անուանուի) (*Gypaëtos barbatus*) թեւերը տարածելով 2.5 մետր մե-

ծուծիւն ունի եւ (մարմնոյն կէսին չափ) երկայն տոնաթեւեր: Փետուրներուն գոյնը կոնակին վըայ մոխրագոյն գորշ, իսկ փորին կողմը ժանկագոյն դեղին է: Գլուխն ու վիզը՝ կարճ եւ դեղին ճերմակ փետուրներով ծածկուած են: Ազակին տակը խոզաններէ կազմուած մօրուք



Պտկ. 157. Գառնանգղ (1/20):

մ'ունի (այս պատճառաւ մօրուանի անգղ ալ կ'անուանուի): Ոտուրները կարճ են եւ մինչեւ մատուրները՝ փետրաւոր:

Գառնանգղը՝ նախնիքաց անգղներուն պէս մեծամեծ յափշտակիչ թռչուններէն մէկն է, Ասիայի եւ Հիւսիսային Ափրիկէի՝ ինչպէս նաեւ Սարգինիայի եւ Յունաստանի բարձր լեռանց վըայ կը բնակի: Քարայծներու, ոչխարներու, այծերու եւ այլն, ահն ու դողն է: Մեծամեծ անասուններն, ինչպէս նաեւ որսորդներ, խորխորատներու մէջ գլորել կը ջանայ, եւ ապացուցուած բան է որ Հելլուստիա երբեմն տղաք ալ յափշտակած տարած է:

Ամենէն աւելի որբով դի'բայց գլխաւորաբար ոսկրտիք կ'ուտէ (այս յատկութենէն առած է օրիւն-ը անունը): Այս մեծ յափշտակիչ թռչունը թէ անգղներու եւ թէ արծիւներուն կերպարանքն ու ապրելու կերպը միացւած է իւր վրան: Ատուցն ու թեւերը անգղներուն է, իսկ հաստամազիկ ոտուրները, փետրայից գլուխն ու վիզը, ինչպէս նաեւ քաջատուրութիւնը արծիւներուն է: Ահաւասիկ Ափշտորի (vautour-aigle) անուանուելուն պատճառը:

ՑԵՂ Գ. ԲԱՋԵՆԻՐ (Falconidae)

Ասոնց գլուխն ու վիզը փետրաւոր է, երբեմն ոմանց այտերը կամ վզին մէկ մասը լերկ կ'ըլլայ: Ատուցին ամենաբարձր կէտը՝ արմատին քովն է, ուր ազատ մոմեմորթ մը կայ: Ոտքերը միշտ լերկ են: Զօրաւոր կեռ ճիրաններ ունին: Ատուք 4 գլխաւոր սեռ կը բաժնուին որ են. ա. Բապէ, Բ. Արծիւ, Գ. Շահէն եւ Դ. Ուրուր:

101. Պանդուր-Բապէն (Falco peregrinus) 120 հրճ. մեծուծիւն ունի: Առնակի կողմը մոխրագոյն է, իսկ փորին կողմը կարմրկէկ ճերմակ է եւ վրան շեղ գծեր կան: Պոչին վըայ 9—12 սեւ կողմնական շերտեր

կան: Կտցին վրայ եղած լերկ մորթն ու ոտուկները դեպին են: Վերի կզակին վրայ առաջնաձեւ յաւելուած մը կայ:

Պանդուխտ բազէն բովանդակ Միջին Ասիա եւ Եւրոպա կը գտնուի, եւ աշունն աւելի տաք երկիրներ կ'երթայ: Զօրաւոր եւ քաջասիրտ թռչուն մ'ըլլալով՝ արտայտէն սկսեալ մինչեւ սագի չափ մեծութիւն



Պտկ. 158. Ծախրուկ (1/4):

ունեցող թռչուններու շատ մեծ փառանք կ'ընէ: Յառաջագոյն թէ առիկայ եւ թէ իսլանդեան Աշի- կամ Որո-իւն Բազէն (Falco candidans)՝ որ առաջինէն աւելի մեծ եւ աւելի զօրաւոր է, կը կրթէին, եւ գլխաւորաբար ճագարներ, գորշ արագիւններ, վայրենի սագեր, բազեր եւ արօսներ որսալու կը գործածէին: (Ծանօթ է Բազ-որո-իւն-ը): Նշանաւոր է հոս նկարուած ճագար-իւն կամ շրթի Բազէն (կեր-բազ ?) (Falco gyrofalco):


102. Ուիլեգոյն աքթի-ը (Aquila fulva) թեւերը տարածելով 2 մետրէն աւելի երկայնութիւն կ'ունենայ: Ընդհանուր գոյնը սեւ խարտեաշ է: Գլխուն եւ վզին վերի կողմը ժանկագոյն գորշ է եւ սրածայր փետուրներով ծածկուած. կտուցին վրայ եղած կակուղ մորթը՝ եւ մա-

տուրները գեղին են: Ոտուրները՝ մինչև մատուրները փետուրներով ծածկուած են:

Ոսկեգոյն արծիւը՝ բովանդակ Ասիայի, Եւրոպայի եւ Հիւսիսային Ամերիկայի անտառաշատ լեռնային տեղերը կը գտնուի: Յանդուգն եւ զօրաւոր օդային թռչուն մըն է, կաթնատուներու եւ թռչուններու, ի մասնաւորի եղնորթներու, այծեմէիկներու, նապաստակներու, հաւերու եւ այլն. ետեւէն կ'իջնայ եւ առով շատ փնաս կը հասցընէ: Իւր շիտակ եւ վեհ կեցուածքը, եւ գէպ ի ամպերն ուղղուած յանդուգն թռիչք, ծանրաբարոյ վարմունքը եւ արտաբոյ կարգի զօրութիւնը՝ նոյն իսկ մարդուն ալ զարմանք կը պատճառէ, անոր համար հիներն՝ արծիւը կ'անուանէին «Թռչնոց թագաւոր, Որմզդական հաւ», եւ այլն: Ասոր շատ կը նմանի Արփայքի՝ կամ Կայսերական արծիւը (Aquila imperialis) կոչուածը:



Պտկ. 159. Ոսկեգոյն արծիւ (1/10):



Պտկ. 160. Սակո (1/10):

Սփռն (Astur palumbarius) ալ պզտիկ բայց շատ յանդուգն գիշատիչ թռչուն մըն է: Բովանդակ Եւրոպա կը գտնուի եւ գեղերու քովերը կը կենայ, եւ անոնց հաւնոցներուն ստէպ ստէպ այցելութիւն կ'ընէ, գլխաւորաբար կաքաւներու, աղաւնիներու եւ երգեցիկ թռչուններու փնասակար է: Այնպէս յանդուգն եւ գիշատիչ է, որ շատ անգամ նաեւ մարդիկներու առջեւ կը յանդգնի հաւնոցները մոնել:


Ճոռիւր (կամ Դարսի. Շակն) (Astur nisus) ալ Սփռնի կը նմանի, բայց անկէ ըստ բաւականի պզտիկ է, եւ գլխաւորաբար ճնճղուկ եւ

ուրիշ մանր թռչուններ կը յափշտակէ: Իսկ ընդհանրապէս Մինորս կամ Ժորալան ճոռալը (*Buteo vulgaris*) շատ օգտակար է, գլխաւորաբար արտաշատ տեղեր պէտք չէ հալածել:

Այս ցեղին տակ կ'երթայ Յին կամ Ուրուրը (աճ. ալմալա) (*Falco milvus*). Գիւրբիկ բայց շատակեր գիշատիչ մըն է, որ շուտով կը ծանչցուի իւր գլխուն՝ երկար եւ սրածայր մազերովն ու երկճիւղ պոչովը:

ԿԱՐԳ 5. ԱՂԱՒՆԻՆԵՐ (Columbae)

Աղաւնիները կոճէ թեփերով ծածկուած քթի ծակեր ունին եւ բունակալ են, կառուցին արմատը կակուղ է: Աղաւնիներն զոյգ զոյգ կ'ապրին: Չագերը ձուէն ելած ատեն շատ տխեղծ եւ անճարակ կ'ըլլան, եւ հարկ է որ արուն եւ էգը իրենց խամփէքէն հանած խիւսի նման ճերմակ հիւթով զիրենք սնուցանեն: Այս զարմանալի երեւոյթն ուրիշ թռչնոց տեսակներու վրայ չի տեսնուիր: Այս կարգը միակ մէկ ցեղ ունի. մինչեւ հիմայ 300 տեսակ աղաւնի ճանչցուած է. գլխաւոր տեսակներն են:



Պտկ. 161. Վայրասուն հաւփալ (1/2):

ները կարճ են, եւ ետեւը մատ մ'ունին՝ որ առջեւի մատուղներուն հետ հաւասար բարձրութեան մէջ է: Փետուրներն՝ որոնք կակուղ չեն, շատ թանձր եւ իրարու վրայ նստած են:

Այս աղաւնին՝ Միջերկրական ծովուն ափանց քով գտնուած Ժայռերու ծերպերուն եւ փապարներուն մէջ բազմութեամբ կ'ապրի, բայց մարդիկ հին ատենէն սկսեալ զասիկայ ընտանեցուցին, եւ ասկէ անհամար աղաւնիներու տեսակներ ելան. եւ իբրեւ ընտանի աղաւնի աշխարհիս չորս կողմը տարածուեցաւ, բայց ընտանեանալէն ետքն ալ շատ

103. Վայրասուն հաւփալ (*Columba livia*) կապուտագոյն գորշ գունով է, վիզը եւ կոնակին վարի մասը ճերմակ է եւ կանանչ կը փոփոխուի, իսկ վերի մասին վրայ 2 հատ շեղ շերտեր կան: Կտուցը քիչ մը ծռած եւ կակուղ է, եւ արմատին՝ ինչպէս նաեւ քթի ծակերուն բոլորտիքը, լերկ եւ ուռուցիկ մորթ մը պատած է: Ոտուր-

94. Սև- փայտփորը կամ Ժառ-կոտիկը (Picus Martius). Ի բաց առեալ խիստ կարմիր գագաթը՝ բոլոր մարմինը ածխոյ սեւութիւն ունի: Կառնքը՝ երկայն, ուղիղ, անկիւնաւոր է, իսկ առջեւի կողմը սաստիկ սրածայր, քթի ծակերը՝ կարճ խողաններով ծածկուած են, կարծր, սրածայր լեզուն՝ որուն վրայ պզտիկ ճանկեր կան, շատ կ'երկնայ: Ո-



Պտկ. 150. Սև փայտփոր (1/2):

տուրները չորս մատուրներ ունին, որոնց երկուքը քիչ մը կպած եւ դէպ ի առջեւ ուղղուած են, 2 հատն ազատ եւ ետեւը ծռած են: Սեպաձեւ պոչը դժուարաթեք է եւ մագլխու ատեն իրեն նեցուկ կ'ըլլայ:

Այս մնայուն թռչունը՝ հիւսիսային Եւրոպայի եւ Ասիայի անտառները կը գտնուի, զանազան միջատներով կ'ապրի, ի մասնաւորի մեծ միջիւններով, զորոնք որսալու մասնաւոր եղանակ մ'ունի եւ այս է. իւր կարծր կտցովը ծառոց բուններուն՝ ուժգին հարուածներ կուտայ եւ քիչ ժամանակի մէջ ծառերու վրայ մեծամեծ ծակեր կը բանայ, եւ իւր երկայն, սրածայր լեզուովն անմիջապէս ասոնց մէջէն իւր որը կը քաշէ դուրս կը հանէ:

Ծառերուն վրայ կրնայ շուտ շուտ վեր վար վազել: — Եւրոպայի անտառները սեւ փայտփորէն զատ կը գտնուի նաեւ կաշտ փայտփորը (Picus viridis) որ առաջնէն պզտիկ է. ուրիշ շատ մը Պի- փայտփորէր- տեսակներ կան:

ՑԵՂ Գ. ՊՈՊՈՆՆԻ (Psittacidae)

Ասոնք գիւրաւ կը ճանչցուին իրենց վերի կտցովը, որ կարճ, հաստ, կեռ եւ շարժական է, իսկ արմատին քովերը մոմամորթ մ'ունի: Հաստ, մսուտ լեզուն իւրեւ շօշափելու գործարան կը գործածեն:



95. Ամազոնեան Դո-Դո-Դո կամ Կապ-
կան (Psittacus amazonicus). Ընդհանրապես
գոյնը կանանչ է, գլուխը եւ այտերը դեղին,
կրծքին բոլորակաբար եւ ճակատը մանուշակա-
գոյն կապոյտ, թեւերուն ծալքին տեղը՝ մի-
ջակ թռչաթեւերն եւ պոչին արմատը՝ կար-
միր են:

Այս դուդաքը Ամազոն գետին քովերը
Բրազիլիայի անտառները կը բնակի, բազմու-
թեամբ ծառաց վրայ ասդին անդին կը մագլէ-
եւ իրիկունը շատ աղմուկ կը հանէ: Ասկէ շատ
կը բերուի Եւրոպա, որովհետեւ դիւրաւ խօսիլ
կը սորվի եւ իւր հոսկիտ շարժումներովը կը
զուարճացնէ: Գերութեան մէջ ամէն տեսակ
բան կ'ուտէ եւ շուտ կ'ընտանենայ, բայց չճանչ-
ցած մարդիկը կը խածնէ:

Տաք երկիրները կան բազմաթիւ դուդաք-
ներու տեսակներ, որոնք պայծառ եւ ակնախառն
գոյներով նշանաւոր են, զօրինակ Ար- ֆե-ն-նի-
Ար-ի-ն (Sittace macao) որ երկայն պոչով բո-
լորովին կարմիր մեծ դուդաք մըն է, կապոյտ եւ
կանանչ փետուրներ ունի, Հարաւային Ամերիկա
կը գտնուի եւ բարձրագագաթ ծառաց վրայ
բոյն կը շինէ: Բայց նաեւ պարզապէս միագոյն
պապկաններ ալ կան, ինչպէս Գո-ր-ը Դո-Դո-Դո կամ Դո-Դո-Դո (Psittacus Eri-
thacus) որ սորվելու շատ ընդունակութիւն ունի: Ուրիշ պապկաններ ալ

Պտկ. 151. Արօրակը (1/6):



Պտկ. 153. Բուլ (1/4):

96. Բուն կամ Բոյճէրաւորը (*Strix flammea*): Թեւերուն տարածութիւնը գրեթէ մէկ մէտր է, բարակ, կակուղ եւ գեղեցիկ փետուրներ ունի: Կոնակի կողմը մոխրագոյն՝ իսկ փորին կողմը ժանկագոյն դեղին է: Կոնակին վրայ բազմաթիւ բարակ շեղ շերտեր կան, իսկ փորին կողմն ալ մութ գորշ գունով մարգարտաձեւ բծեր ունի (ուստի առեալ ճարգարդապաշտ Բու ալ ըստւած է): Մեծ եւ թուխ աչուրներուն բոլորաթիբը բարակ եւ ճերմակ փետուրներէ կազմուած կաննաւոր խիտ պսակ մը կայ (որ ֆոյլ կ'անուանուի):

Այս բուն՝ շատ տեղ քաղաքներու մէջ տանեաց տակ կը գտնուի: Մկներու եւ խլուրդներու վրայ կը յարձակի, ասով օգտակար է:

97. Բուէճ կամ Եղջէրաւոր Բու (*Strix bubo*): Թեւերուն տարածութիւնը 2 մէտր է: Բոլոր մարմինը, բայց գլխաւորաբար գլուխը



Պտկ. 154. Բուէճ (1/4):


շատ հաստ կ'երեւան: Փետուրներուն գոյնը ժանկափայլ գեղին է, որուն վրայ ալէկերպ մութ գունով բծեր կան: Բուրդակ գլխուն վրայ՝ ականջներէն վեր, երկայն շիտակ փետուրներու փունջեր կան: Աչուրները ժանկափայլ գեղին եւ շատ մեծ են: Ոտուրներն եւ նոյն իսկ մատուրներն ալ թանձր փետուրներով ծածկուած են, բուէճը կրնայ այս մատուրներէն մէկ հատը ըստ կամի դէպ ի ետեւ ծռել:

Բուէճը՝ Ասիայի եւ Եւրոպայի ժայռուտ խոխոմները կը բնակի, ցերեկը՝ ժայռերու, ծերպերու, հին աւերակաց տակն եւ կամ սնամէջ ծառերու մէջ կը պահուի: Գիշեր ատեն մեղմ թռիչով անտառներու մեծ ու պզտիկ անասնոց վրայ կը յարձակի եւ երբեմն երէններուն մեծ փնաս կը հասցընէ:

Իրեն տխուր ձայնն՝ որ գիշերուան հանդարտութեան եւ անտառի միայնութեան մէջ շատ անախորժ կը հնչէ, քանի մը աւելորդապաշտական զրոյցներու առիթ տուած է:

ՑԵՂ Բ. ՄՆԳՆՆԻ (Vulturini)

Հաստ եւ ամուր, բայց շիտակ կտուց մ'ունին, միայն վերի կտուցին ծայրը կեռ է: Գլուխն եւ շատ անգամ վիզը բոլորովին լերկ եւ կամ միայն աղուամազով ծածկուած կ'ըլլան: Ասոնց թեւերն շատ մեծ ու երկայն են եւ հանդարտ կեցած ատեն մարմնոյն վրայ չեն հանգչիր: Ճիրանները շատ քիչ ծռած են եւ բութ են: Ընկերաբար կ'ապրին: Հատակեր են, բայց գրեթէ միայն սատակ ուտելով շատ օգտակար են: Գլխաւորներն են:



Պտկ. 155. Պասկուժ (1/10):

98. Պասկուժը կամ Կորճը (Sarcorampus Gryphus), որուն թեւերուն տարածութիւնը 3 մինչեւ 4 մէտր է: Գոյնը՝ սեւ, բայց վարազաթեւերն ու վզի մանեակը ճերմակ է, իսկ լերկ վիզն ու գլուխը՝ որ մանրէն սանդղ կամ խոպոպի մ'ունի եւ խողաններով ծածկուած է, մութ կարմիր են:

Հարաւային Ամերիկայի Անդեան լեռանց վրայ կը գտնուի, 6000 մետր բարձր կը թռչի: Այս բարձրութենէն մեծամեծ անասնոց դիերը կ'ականէ, կը դիտէ, եւ ասոնց վրայ յարձակելով այնպէս շատ կ'ուտէ որ ալ չի կրնար թռչիլ եւ շատ դիւրաւ վարմերով կը բռնուի:

99. Սպիտակագլուի անգղը (*Vultur cinereus*) թեւերը տարածելով 2.5 մետր երկայնութիւն կ'ունենայ. վզին բոլորովը եղած մազերը մանեակ մը կը կազմեն. ուստի առեալ մանէկաւոր ալ կ'անուանուի: Ծիւս փետուրները կարմրիկիկ խարտեաշ գունով են, միայն թըռչած թեւերն եւ տոնաթեւերն (պոչի թեւերն)՝ սեւագոյն են:




Պտկ. 156. Սպիտակագլուի անգղ (1/2):

Այս անգղն՝ Ափրիկէ, Փոքր Ասիա, Ասորիք եւ Եւրոպայի Հարաւային կողմերը կը բնակի: Գիշերը լեռներու վրայ կ'անցընէ, իսկ կէսօրուան մօտ ատենները գաշտերու վրայ կը խոյանայ, եւ արտաքոյ կարգի բարձր կը թռչի, սրտոն աչուքներովը դիակները կը դիտէ եւ գրեթէ շիտակ դիակին վրայ կը յարձակի: Տաք գաւառները թէ՛ այս անգղն եւ թէ՛ ասոր մերձաւոր տեսակները շատ օգտակար են, վասն զի սատկած անասունները կ'ուտեն կը սպառեն, եւ ասով օդն ապականելէն կը պահեն:

100. Ուկրիւղ կամ Գառնանգղը (որ Անգղաքծիւ ալ կ'անուանուի) (*Gypaëtos barbatus*) թեւերը տարածելով 2.5 մետր մե-

ծաթիւն ունի եւ (մարմնոյն կէսին չափ) երկայն տանութեւք: Փետուրներուն գոյնը կոնակին վրայ մոխրագոյն գորշ, իսկ փորին կողմը ժանկագոյն դեղին է: Գլուխն ու վիզը՝ կարճ եւ դեղին ճերմակ փետուրներով ծածկուած են: Կլակին տակը խողաններէ կազմուած մորուք



Պտկ. 157. Գառնանզղ (1/2):

մ'ունի (այս պատճառաւ Տօրոսանի անգղ ալ կ'անուանուի): Ոտուրները կարճ են եւ մինչեւ մատուրները՝ փետրաւոր:

Գառնանզղը՝ նախընթաց անգղներուն պէս մեծամեծ յափշտակիչ թռչուններէն մէկն է, Ասիայի եւ Հիւսիսային Աֆրիկէի՝ ինչպէս նաեւ Սարգիսիայի եւ Յունաստանի բարձր լեռանց վրայ կը բնակի: Քարայծներու, ոչխարներու, այծերու եւ այլն, ահն ու գողն է: Մեծամեծ անասուններն, ինչպէս նաեւ որսորդներ, խորխորատներու մէջ գլորել կը ջանայ, եւ ապացուցուած բան է որ Հելուետիա երբեմն տղաք ալ յափշտակած տարած է:

Ամենէն աւելի սիրով գի'բայց գլխաւորաբար սակրտիք կ'ուտէ (այս յատկութենէն առած է անոր անունը): Այս մեծ յափշտակիչ թռչունը թէ անգղներու եւ թէ արծիւներուն կերպարանքն ու ապրելու կերպը միացուցած է իւր վրան: Կտուցն ու թեւերը՝ անգղներուն է, իսկ հաստամագիլ ոտուրները, փետրալից գլուխն ու վիզը, ինչպէս նաեւ քաջարտութիւնը արծիւներուն է: Ահաւասիկ Անգլ-ըթի- (vautour-aigle) անուանուելուն պատճառը:

ՑԵՂ Գ. ԲԱՋԷՆՆԻ (Falconidae)

Ասոնց գլուխն ու վիզը փետրաւոր է, երբեմն ոմանց պոսերը կամ վրին մէկ մասը լերկ կ'ըլլայ: Կտուցին ամենաբարձր կէտը՝ արմատին քովն է, ուր ազատ մոմեմորթ մը կայ: Ոտքերը միշտ լերկ են: Զօրաւոր կեռ ճիրաններ ունին: Ասոնք 4 գլխաւոր սեռ կը բաժնուին որ են. ա. Բազէ, Բ. Արթի-, Գ. Շահէն եւ Դ. Ուրո-ը:

101. Պանդոնի Բազէն (Falco peregrinus) 120 հրձ. մեծութիւն ունի: Կռնակի կողմը մոխրագոյն է, իսկ փորին կողմը կարմրկեկ ճերմակ զգծեր կան: Պոչին վրայ 9—12 սեւ կողմնական շերտեր

կան: Կտցին վրայ եղած լերկ մորթն ու ոտուրները դեղին են: Վերի կղակին վրայ ատամնաձեւ յաւելուած մը կայ:

Պանդուխտ բազէն բովանդակ Միջին Ասիա եւ Եւրոպա կը գտնուի, եւ աշունն աւելի տաք երկիրներ կ'երթայ: Զօրաւոր եւ քաջասիրտ թռչուն մ'ըլլալով՝ արտոյտէն սկսեալ մինչեւ սագի չափ մեծութիւն



Պտկ. 158. Ճախրուկ (1/4):

ունեցող թռչուններու շատ մեծ փնտսներ կ'ընէ: Յառաջագոյն թէ ասիկայ եւ թէ իսլանդեան Աշի- կամ Որաւիս քաւէն (Falco candidans)՝ որ առաջինէն աւելի մեծ եւ աւելի զօրաւոր է, կը կրթէին, եւ գլխաւորաբար ճագարներ, գորշ արագիւններ, վայրենի սագեր, բազեր եւ արօսներ որսալու կը գործածէին: (Ծանօթ է քաղերսուիւնը.) Նշանաւոր է հոս նկարուած ճագարիւն կամ շրջիլ քաւէն (կերքաւ ?) (Falco gyrofalco):


102. Ուիլեգոյն աքթիւ-ը (Aquila fulva) թեւերը տարածելով 2 մետրէն աւելի երկայնութիւն կ'ունենայ: Ընդհանուր գոյնը սեւ խարտեաշ է: Գլխուն եւ վզին վերի կողմը ժանկագոյն գորշ է եւ սրածայր փետուրներով ծածկուած. կտուցին վրայ եղած կակուղ մորթը՝ եւ մա-

տուրները գեղին են: Ոտուրները՝ մինչև մատուրները փետուրներով ծածկուած են:

Ոսկեգոյն արծիւը՝ բովանդակ Ասիայի, Եւրոպայի եւ Հիւսիսային Ամերիկայի անտառաշատ լեռնային տեղերը կը գտնուի: Յանդուգն եւ զօրաւոր օդային թռչուն մըն է, կաթնատուներու եւ թռչուններու, ի մասնաւորի եղջերութներու, այծեմնիկներու, նապաստակներու, հաւերու եւայլն. ետեւէն կ'իյնայ եւ ասով շատ փնաս կը հասցընէ: Իւր շիտակ եւ վեհ կեցուածքը, եւ գէպ ի ամպերն ուղղուած յանդուգն թռիչք, ծանրաբարոյ վարմունքը եւ արտաքոյ կարգի զօրութիւնը՝ նոյն իսկ մարդուն ալ զարմանք կը պատճառէ, անոր համար հիներն՝ արծիւը կ'անուանէին «թռչնոց թագաւոր, Որմզդական հաւ», եւայլն: Ասոր շատ կը նմանի Արտայ-բէ-կամ Կոյ-բե-հան արծիւ (Aquila imperialis) կոչուածը:



Պտկ. 159. Ոսկեգոյն արծիւ (1/10):



Պտկ. 160. Սակը (1/4):

Սփն (Astur palumbarius) ալ պզտիկ բայց շատ յանդուգն գիշափառ թռչուն մըն է: Բովանդակ Եւրոպա կը գտնուի եւ գեղերու քովերը կը կենայ, եւ անոնց հաւնոցներուն ստէպ ստէպ այցելութիւն կ'ընէ, գլխաւորաբար կաքաններու, աղանիներու եւ երգեցիկ թռչուններու փնասակար է: Այնպէս յանդուգն եւ գիշատիչ է, որ շատ անգամ նաեւ մարդիկներու առջեւ կը յանդգնի հաւնոցները մոնել:


Ճոռ-ալը (կամ դոբ-ի. Շուէն) (Astur nisus) ալ Սփն կը նմանի, բայց անկէ ըստ բաւականի պզտիկ է, եւ գլխաւորաբար ճնճղուկ եւ

ուրիշ մանր թռչուններ կը յափշտակէ: Իսկ ընդհակառակն Միւր-կամ Եղրակն ճաւաղը (*Buteo vulgaris*) շատ օգտակար է, գլխաւորաբար արտաշատ տեղեր պէտք չէ հալածել:

Այս ցեղին տակ կ'երթայ Յին կամ Ուրուրը (տճ. ախալա) (*Falco milvus*). փոքրիկ բայց շատակեր գիշատիչ մըն է, որ շուտով կը ծանց-ցուի իւր գլխուն՝ երկար եւ սրածայր մազերովն ու երկճիւղ պոչովը:

ԿԱՐԳ 5. ԱՂԱԽՆԻՆՆԵՐ (*Columbae*)

Աղաւնիները կռճկէ թեփերով ծածկուած քթի ծակեր ունին եւ բունակալ են, կտուցին արմատը կակուղ է: Աղաւնիներն զոյգ զոյգ կ'ապրին: Չագերը ձուէն ելած ատեն շատ տխուղ եւ անճարակ կ'ըլլան, եւ հարկ է որ արուն եւ էգը իրենց խամճիքէն հանած խիւսի նման ճերմակ հիւթով զերենք սնուցանեն: Այս զարմանալի երեւոյթն ուրիշ թռչոց տեսակներու վրայ չի տեսնուիր: Այս կարգը միակ մէկ ցեղ ունի. մինչեւ հիմայ 300 տեսակ աղաւնի ճանչցուած է. գլխաւոր տեսակներն են:



Պտկ. 161. Վայրասուն հաւփալ (1/4):

103. Վայրասուն հաւփալը (*Columba livia*) կապուտագոյն գորշ գունով է, վիղը եւ կռնակին վարի մասը ճերմակ է եւ կանանչ կը փողփողէ, իսկ վերի մասին վրայ 2 հատ շեղ շերտեր կան: Կտուցը քիչ մը ծռած եւ կակուղ է, եւ արմատին՝ ինչպէս նաեւ քթի ծակերուն բոլորտիքը, լերկ եւ ուռուցիկ մորթ մը պատած է: Ոտուր-

ները կարճ են, եւ ետեւը մատ մ'ունին՝ որ առջեւի մատուրներուն հետ հաւասար բարձրութեան մէջ է: Փետուրներն՝ որոնք կակուղ չեն, շատ թանձր եւ իրարու վրայ նստած են:


Այս աղաւնին՝ Միջերկրական ծովուն ափանց քով գտնուած Ժայռերու Ծերպերուն եւ փապարներուն մէջ բազմութեամբ կ'ապրի, բայց մարդիկ հին ատենէն սկսեալ զստիկայ ընտանեցուցին, եւ ասկէ անհամար աղաւնիներու տեսակներ ելան. եւ իբրեւ ընտանի աղաւնի աշխարհիս չորս կողմը տարածուեցաւ, բայց ընտանեանալէն ետքն ալ շատ

անգամ կը վայրենանայ եւ կ'երթայ երկնաբերձ աշտարակներու վրայ եւ փլփկած գղեպկներու մէջ բոյն կը դնէ: Կերակուրը միայն կարծր հատիկներ են, զորոնք նեղ խամփքի մէջ կը կակղցընէ եւ կը հալեցընէ:

Արտաքին կարգի արագածութիւն է. մէկ ժամանակ մէջ 70 քիլոմ. ճամբայ կ'ընէ: Դարձեալ տեղերը միտքը պահելու զարմանալի յիշողութիւն մը կը ցուցնէ եւ միշտ ուր որ տարուի, կը դառնայ իւր ձագ հանած տեղը կու գայ, անոր համար իբրեւ թղթաբեր աղանի՝ արագ լրեր հասցընելու եւ բերելու կը գործածուի: Դարձեալ իրենց մօին համար ալ յարգի են, բայց երբեմն դաշտերու մեծամեծ փնտներ կու տան: — Տարւոյն (*Columba turtur*) ալ՝ պզտիկ գեղեցիկ փետուրներով զարդարուած աղանոյ մէկ տեսակ է: Շատ ծանօթ է իւր մնչելու ձայնը:

104. Գաղձող աղաւնի (*Columba migratoria*) հաւփալէն ըստ բաւականի մեծ է. կոնակի կողմը մութ կապոյտ, իսկ փորին կողմը բաց կապոյտ եւ կարմրագոյն է. սեպաձեւ երկայն պոչ մ'ունի:

Հիւսիսային Ամերիկա կը գտնուի. թխսելու ատեն բազմաթեամբ՝ երբեմն միլիոններով եւ քանի մը քառակուսի մղոններ ծածկելով, կը ժողվուին, եւ չորս կողմը կ'ապականեն: Թռչելու ատեն արեւուն լոյսն այնպէս կը խաւարեցընեն, որ կարծես թէ արեւու խաւարում կ'ըլլայ, ծառերուն ոստերն՝ որոնց վրայ հարիւրաւորներով կը թռաին, ծանրութենէն շատ անգամ կը կտարին, եւ հոն տեղուան ժողովուրդն ասկէ այնչափ կը զարնէ, կը մեռցընէ, որ շատ ըլլալուն նաեւ խոզերուն ալ կու տան:



Պտկ. 162. Գաղձող աղաւնի (1/4):

ԿԱՐԳ 6. ՀԱՒԱԶԳԻ ԹՈՒՉՈՒՆՆԵՐ (*Gallinae*)

Հաւազգի իւրօրնային ծանրաշարժ ցամաքային թռչուններ են, կարճ կոնաձեւ կտուց մ'ունին, որուն արմատը կարծր է, քթի ծակերը ծածկողով մը գոցուած են. ասոնց ոտուրները՝ որոնցմով կը բրեն, ըստ բաւականի երկայն են, եւ ծայրերը լայն ու բթածայր ըղունգներ կան: Ետեւի կարճ մատը՝ մորթով մ'իրարու միացած առջեւի 3 մատուրներէն աւելի բարձր է եւ միայն արուններն ունին: Գլխուն եւ կամ վզին վրայ լերկ մասեր ունին (կատար, բբուկ եւայլն): Արուն՝ էգէն կը զանազանի իւր գեղեցիկ պոչովը եւ կամ գլխուն բբուկովը: Չագերը՝ ձուէն ելած ատեն ըստ բաւականի կատարեալ կազմուածք կ'ունենան եւ կրնան անմիջապէս ասդին անդին վազվզել: Իրենց ուտելի մօին, շատ բազմանալուն եւ առատ հաւկիթ ածելուն համար օգտակար անամնոց կարգէն են: Ասոնք կը բաժնուին 3 ցեղի:

ՅԵՂ Ա. ՌՈՒՆ ՀԱՒԵՐ (Phasianidae)

Ընդամենի համար (Արուս՝ Առաջադ [Առաջ]՝ Էֆը՝ Մարի. Յաֆը՝ Վաստեալ, ճեփ կամ ճոփ, Հա-Յաֆ) (*Gallus domesticus*). գլխուն վրայ շիտակ սղոցաձեւ մանղէն բբուկ մ'ունի, նոյնպէս կտուցին տակն ալ վերինէն պզտիկ բբուկ մը: Մանգաղաձեւ ու վեր տնկուած պոչը՝ նեղ փետուրներով ծածկուած է: Աքաղաղն՝ որ գլխաւորաբար իւր մեծութեամբը, վառգոյն փետուրներով եւ գլխուն բարձրկեկ բբուկովը կը ճանչցուի, պծեղներուն վրայ մէյ մէկ բիտ (կամ կարթ) ունի:



Պտկ. 163. Վայրի արքաղաղ (1/2):

Այս թռչունն՝ իւր բազմաթիւ տեսակներով աշխարհիս չորս կողմը տարածուած է, յառաջ եկած է արեւելեան Հնդկաստանի Վայրի առաջադէն (*Gallus bankiva*) որ ճաւա կղզւոյն վրայ վայրենի վիճակի մէջ կ'ապրի: Հաւերը մենք զատ նաեւ հաւկիթ կ'ածեն, գրեթէ ամբողջ տարին մարին ամէն օր մէյ մէկ հաւկիթ կու տայ, ի բաց առեալ փետրափոխութեան ժամանակն, որ Սեպտեմբերին կը սկսի: Եգիպտոս մասնաւոր շինուած փաերու մէջ կը դնէին հաւկիթներն եւ տաքու թեամբ կը թխսէին: Անգղիա եւ Սպանիա եւ մասնաւոր Տաճկաստան պաղաղաղները կու ընելու կը կրթեն: — Հիմայ Եւրոպա հասարակ հաւերէն զատ նաեւ արեւելեան Ասիայի՝ գլխաւորաբար Կոչինչինայի, Բրամադա-Գրայի եւ Սոմաթրայի հաւերն ալ կը բուծանեն:

105. Հասարակ ֆասիանը (*Phasianus colchicus*) ընտանի հաւու չափ մեծ է, բայց ասկէ աւելի բարակ եւ աւելի երկայն: 0.60—70 հրճ. երկայն եւ դէպ ի վար ծռած պոչի փետուրներ ունի, աչուրներուն բո-

լրտախն ալ լերկ մորթ մը: Արուին փետուրները ժանկագոյն գորշ են եւ ոսկեգոյն կը շողան, իսկ գլուխն ու վիզը՝ մուրժ կանանչ, եգը՝ մուրժ գորշ եւ մխրագոյն գունով է:

Այս փասիանը յառաջ եկած է Կողքիսի՝ Փասիս քաղաքէն Կովկասու մօտ (Հիմակուան Մինգրելիան) եւ արդէն Տին ատենները՝ իւր համեղ մին համար Յոյները զատկա Եւրոպա բերին եւ Հռոմայեցիք ալ շուրս կողմը տարածեցին: Հիմակուան ատենս փասիանները կը պահուին՝ ցանգով կամ ջրով պատած անտառակներու մէջ, որոնք «Փասիաններու պարտէզ» կամ «Փասիանոց» կ'ըսուին, հոս ամառը ազատ




Պտկ. 164. Ա. Սպիտակ Փասիան. Բ. Ոսկի Փ. Գ. Հասարակ Փ. (1/10):

կ'ապրին եւ միայն ձմեռն մասնաւոր շինուած տնակ մը կը մտնեն: Այս կերպով՝ Դանուբի կղզիներուն վրայ եւ Եւրոպա ուրիշ շատ տեղ հազարաւոր փասիաններ կը բուծանեն. ձմեռն՝ ինչպէս նաեւ ազատութեան մէջ, ցորեն կ'ուտեն, երբեմն բոլորովին կը վայրենանան: Հաւկիթները սովորաբար հնդկահաւը կը թխտէ:

Ուի Գուի (Phasianus pictus), Հին Ժամանակի «Փիւի», հաւն, իւր վառվառն եւ գոյնգոյն փետուրներով: Չինի շատ նշանաւոր թռչուններէն մէկն է, եւ տեղիս տեղիս զուարճութեան համար կը պահուի: Նոյնպէս երբեմն կը տեսնուի հաւնոցներու մէջ Սիւրի Փիւի (Phasianus nycthemerus). Կանակի կողմը ձեան սպիտակութիւն ունի եւ վրան սեւ գծեր կան, իսկ փորին կողմը միագոյն ծիրանի սեւ է:

106. Սիրամարգը (*Pavo cristatus*) գեղեցիկ եւ մեծ թռչուն մըն է. գլխուն վրայ խուրձ մ'ունի, դերձանի պէս բարակ, իսկ ծայրերը տարածուած եւ բազմասփիւռ փետուրներէ կազմուած: Գլուխը, վիզն ու փորը մութ կապոյտ է, կոնակը ոսկեգոյն կանանչ՝ կարծես թեփոտ է: Արուն կրնայ իւր խրճնացեալ պոչին փետուրներն անուի մը պէս բանալ: Այս բազմաճամուկ փետուրներն անհասարկ մեծութիւն ունին, կոթունը՝ ճերմակ է եւ ցիրուցան փետրիկներով, բայց ծայրերը գեղեցիկ ոսկեճամուկ դրօշ մ'ունին, որուն մէջտեղը կապոյտ աչքի պէս բիծ մը կայ: Սիրամարգին՝ իւր պոչը պարզելուն, կարանելէ կ'ըսենք:




Պտկ. 165. Սիրամարգ (Պ/Պ):

Դեռ արդի ժամանակս ալ սիրամարգը մեծ բազմութեամբ արեւելեան Հնդկաստանի եւ Սուդան կողմերուն վրայ վայրի կ'ապրի, բայց արդէն հին Յունաց եւ Հռոմայեցւոց ալ ծանօթ էր. հիմայ Եւրոպայ իբրեւ հաւնոցներու դարդ գրեթէ ամէն տեղ կը պահեն: Յուրաքանչեւ զգայ, ծառոց եւ տանեաց վրայ թռալի կը սիրէ եւ անոնց վրայէն իւր անախորժ ձայնը լսել կու տայ: Հին ասոնները, նաեւ Միջին դարուն համադամ ուտելեաց կարգն էր, մանաւանդ լեզուն եւ բղբղը շատ յարգի էին: — Բոլորովին սպիտակ սիրամարգ ալ կը գտնուի:

107. Հնդկահաւը (*Meleagris Gallopavo*) կապուտակագոյն է: Կտուցը, գլուխն ու վիզը՝ լերկ եւ խորտուբորտ մորթով մը ծածկուած է. այս մորթը կտցին արմատին քովը մանղէն եւ վար կախուած խոպոպիկ մը կը կազմէ եւ կապոյտ գոյն մ'ունի: Արուն երբեմն իւր պոչին լայն ու շիտակ փետուրներն անուի մը պէս կլոր կը բանայ, վիզն ետ քաշած, երեսն ալ բոլորովին կարմիր բարձր ղողանջիւնով մը ծանրութեամբ կը քալէ եւ դէպ ի վար կախուած փետուրներովը գետինը կ'աւլէ: Եզը կարմիր մոխրագոյն է: Նոյնպէս ուրիշ շատ յարգի ճերմակ հնդիկ հաւ մըն ալ կայ:

Այս թռչունն՝ որ հաւնոցներու մէջ շատ կ'ըլլայ, Հիւսիսային Ամերիկայէն յառաջ եկած է, հոն անտառներու մէջ կ'ապրի այնպէս, ինչ-

պէս Եւրոպայի անտառահատերը: Հազիւ 16^{րդ} դարուն, իւր անուշահամ մին համար Եւրոպա բերուեցաւ: Պարարտացընելով կրնայ մինչեւ 10 քիլոգրամ կշռել, հարաւային երկիրներն, ինչպէս Դաղմասիա շատ գիւրաւ ալ կրնայ վայրենանալ: Եթէ մէկը սեւեռեալ աչուրներով երկայն ատեն գիտէ զինքը, կամ հաւ կարծի գոյն տեսնէ, երբեմն



Պտկ. 166. Հնդկահաւ (1/10):

այնպէս կը գրգռի, որ կատաղութեամբ զինք նախատողին վրայ կը յարձակի եւ քնաս հասցընել կը ջանայ: — Ճերմակ Հնդկահաւ մըն ալ կը գտնուի:

ՑԵՂ Բ. ԿԱՔԱՆՆԵՐ (Perdidae)

Կաքանները կը ղանաղանուին բուն հաւերէն. 1. գլխու վրայ կատար չունին, 2. այտերն փետրաւոր են. 3. պճեղները լերկ. 4. սրունքները բիտ չունին: Գլխաւոր տեսակներն են:

108. Մոխրագոյն կամ Հասարակ Կախաւ (Perdix cinerea): Կռնակի կողմը գորշկեկ, փորը՝ մոխրագոյն, եւ վրան՝ բաց կամ մութ գծեր եւ բծեր կան: Արուններուն կուրծքին վրայ շագանակի գորշ գունով մեծ բիծ մը կայ:

Եւրոպայի եւ Փոքր Ասիայի դաշտերու մնայուն մէկ թռչունն է, որ իւր տխորժահամ մնովը ամենուն ծանօթ է եւ ընկերաբար կ'ապրի՝ Ընդեղէն-



Պտկ. 167. Կաքաւ (1/2):

ներով եւ միջատներով կը կերակրի եւ ձիւ-նաշատ տարիները շատ մեծ նեղութիւն կը կրէ: Կաքաւը շատ երկշոտ է, վտանգ մը հասածին պէս հոգերու կոշտե-րուն ետեւն, եւ կամ բարձր խոտերուն մէջ կը պահուբաի եւ կամ կը սկսի փախչիլ, եւ միայն արտաքոյ կարգի վտանգ մը հասած ա-տեն բազմութեամբ եւ մասնաւոր խշրտոցով մը կը թռչի եւ խոտե-րու կամ մացառներու մէջ իրեն ապահով ա-պաստանարան մը կը փնտռէ: Անան՝ կա-քաւն որսալու համար Հաւորսակ (Canis a- vicularius) բուռած շունը կը գործածուի:

109. Լորամարգին կամ Լորը (Coturnix dactylisonans) Կաքաւէն շատ պզտիկ է, կռնակի կողմը գորշ է եւ երկայն, գեղնագոյն ձերմակ



Պտկ. 168. Լորամարգի (1/2):


բծաւոր շերտեր ունի: Պոչը շատ կարճ է, անոր համար մարմինն ալ տկլոր կ'երեւայ: Արուին վիզը թխագոյն գորշ է:

Լորամարգին՝ հաւային թռչնոց մէջ մի միայն գաղթողն է, հարաւ-ային Եւրոպայի երկիրներէն անցած ատենը շատ կը հալածուի, նաեւ շատ անգամ ծովու վրայ ալ դժբախտութեան կը հանդիպի: Այս մը մին, կէս մըն ալ իւր ա-խորժ՝ բայց միակերպ երգին համար կ'որսան: Իսկ ապրելու կերպովը՝ Կաքաւին շատ կը նմանի: Անան գաղթելու ատեն՝ իւր պարարտ մար-

մնով շուտով կը յոգնի եւ շատ անգամ առանց դժուարութեան նոյն իսկ ձեռքով կ'որսացուի: Թռած ժամանակ շատ անգամ նաւերու մէջ կ'իյնայ:

ՑԵՂ Գ. ՄԵՏՈՒՆՆԻԿ ԿՈՄ ՄԱՐՈՒՆՆԻԿ (Tetraonidae)

110. Մեծ փայտհորեկը կամ Ցախալուրը (*Tetrao urogallus*) Եւրոպայի մորեկներուն ամենամեծն է: Հինգ քիլոգրամ ծանր կը կշռէ: Կտուցը՝ յափշտակիչ թռչնոց կտուցին պէս ղօրաւոր եւ կորացած է, պոչը լայն եւ հողմահարի պէս տարածուած, կզակին տակը սեւ մօրուք մ'ունի: Ոտուրները մինչեւ մատուրները փետուրներով ծածկուած են, փետուրներուն գոյնը գորշագոյն սեւ է, գլուխն ու կուրծքը կանանչ կը



Պտկ. 169. Ցախալուրը (1/4):

փողփողայ, իսկ կողերը՝ ճերմակ: Աչուրներուն բոլորտիքը՝ ծիրանեգոյն կարմիր գունով լերկ մորթ մ'ունի: Իսկ էգերուն՝ որոնք արուններէն զգալի կերպով պզտիկ են, փետուրները ժանկագոյն են եւ վրան սեւ ու ճերմակ բծեր կան: Արտաքին տեսքը հասարակ աքաղաղին կը նմանի, բայց անկէ շատ մեծ է:

Շատ երկշուտ եւ խորամանկ մնայուն թռչուն մըն է, բարձր խոխովներու մէջ հատապտուղներով, կոկոններով եւ եղեւիններուն օր ցցուած ճիւղերովն կ'ապրի: Փայտմորեկին որսը՝ Մարտի կամ Ապրիլի մէջ շատ յաջող կ'ըլլայ, վասն զի արուն ծառի մը վրայ նստելով՝ անսովորական եւ ծիծաղական ձեւերով եւ յատուկ ձայնով մը 6—7 էգ կը ժողկէ քովն՝ եւ այս միջոցին ոչ կը լսէ եւ ոչ ալ կը տեսնէ: Թէպէտ միտը քիչ մը կարծր է, բայց շատ համով:

Մայիսին կամ Պուրի Միւրի (*Tetrao tetrix*) մեծ փայտմորեկէն զգալի կերպով պզտիկ է, պոչին դրսի փետուրները ճանկի ձեւով երկու կողմը ծառած են, եւ թեւերուն վրայ ճերմակ շերտեր ունի, թանձր անտառներու մացառներուն մէջ կ'ապրի: Որսորդները՝ մայրահաւին պոչի գալարուած փետուրներովն իրենց գլխարկը կը զարդարեն: Էգերը՝ պզտիկ, ժանկագոյն եւ սեւ բծերով են:



Պտկ. 170. Մայրենալ (1/2):

Անտառահաւերուն կը վերաբերին. Չեռնհաւը կամ Դշխոյահաւը (*Lagopus alpinus*). Ալպեան լեռանց վրայ կը գտնուի. գոյնը ճերմակ է եւ մինչեւ մագիլները փետրաւոր: Աւարը (*Tetrao bonasia*), մեծ կաքաւի մը կը նմանի եւ միտը շատ համով է: Այս ցեղին տակ կ'երթայ Աւարը կամ Գառնը (*Tetrao attagen*), անուանի նոյնպէս իւր համեղաճաշակ մսովը:

ԿԱՐԳ 7. ՄՕՐԱԿԱՆ (ԿԱՄ ՃԱՀՆԱՅԻՆ) ԹՈՒՂՈՒՆՆԵՐ (Grallatores)

Ճահնային լիւլըններն շատ դիւրաւ կը ճանչցուին իրենց բարձր, լերկ սրունքներուն համար եւ Բաքլորապոսն. (*Grallatores*) ալ կը կոչուին. ասոնց մատուրներուն արմատը մորթով մ'իրարու միացած է. ջրերու մէջ կը քալեն, բայց իրենց փետուրները չեն թրջիր: Շատերը երկայն վիզ կ'ունենան: Շատ քաջ կը թռչին, եւ ջրային կենդանիներով կը կերակրին: Գաղթող թռչուններ են: Ասոնք 4 գլխաւոր ցեղերու կը բաժնուին:

ՅԵՂ Ա. ԱՐԱԳԻՆՆԵՐ (Ciconiae կամ Ardeidae)


Երկայն, զօրաւոր եւ կարծր կտուց ունին եւ երկայն վիզ, ցած ճակատ մը. ասոնց մարմիններն երկու կողմանէ տնփակցած են, երկայն սրունքներ ունին: Արագ կը թռչին, բայց ոչ այնչափ յաջողակութեամբ,

ԿԵՆԳՆԵՐԱՆԵՐԻԹԻՆ

դգալի ձեռով: — Ափրիկէ
մարաբու կամ Մարաբու (Ci-
conia marabu). լերկ գլխով
խոտածարակ, տղեղ արագիւ-
մըն է, պոչի՝ փափուկ եւ
ճերմակ փետուրներն իբր
զարդ կը դործածուին: —
Ասոնց նման ուրիշ բազմա-
թիւ տեսակներ կան:

112. Մոխրագոյն ա-
րագիլը (Ardea cinerea):
Թեւերուն տարածութիւնն
է 1 մ. 60 հրժ: Կռնակի կող-
մը մոխրագոյն, փորը՝ ճեր-
մակ եւ վզին առջեւի կողմը՝
մեծ ու սեւ երկայն բծեր
կան: Գլխուն ետեւի կողմը
0.10 հրժ. երկայն, կա-
խուած, կապուտակագոյն
թուխ փետուրներու փունջ
մ'ունի, նոյնպէս առջեւի
կողմը վզին տակն ալ բա-
րակ եւ թոյլ փե-
տուրներ: Երկայն,
չիտակեւսրածայր
կտուցն, ինչպէս
նաեւ աչուրներն՝
վառվռուն դեղին
են, ոտուրներն ոս-
կեգոյն կանանչ,
իսկ ծերութեան
ատեն՝ կարմրա-
գոյն գորշ կ'ըլլան,
ետեւի մատն առ-
ջեւի մատուրնե-
րուն հետ հաւա-
սար. բարձրու-
թեան մէջ է:

Գաղթող թռու-
չուն մըն է, գլխաւո-



Պտկ. 173. Տարգալկտուց (Դ/1):




Պտկ. 174. Մոխրագոյն արագիլ (Դ/12):

բարբար ձկնատեաններու եւ լիճերու քովերն կը բնակի, եւ ճահիճներու եւ ճահճահուտ տեղերու անմատչելի կողմերը շատ անգամ բազմաթեամբ բոյն կը շինէ, եւ արտաքոյ կարգի երկչոտ եւ զգուշաւոր է: Յարատեւութեամբ եւ շատ յաջողակութեամբ խոնաւ տեղեր ջրոյ մէջ կը կենայ եւ ձկերուն դարանակալ կ'ըլլայ, որով երբեմն ձկնատեաններու մնաս կը հասցընէ: Յառաջագոյն բազէներով կ'որսային այս արագիւր: Հարաւային կողմերը, նոյնպէս Դանուբի վարի կողմերը՝ գեղեցիկ ճերմակ՝ Արծաթագոյն արագիւր (Ardea egretta) կը գտնուի, որուն կռնակի շքեղ փետուրներն իբրեւ դարդ շատ յարգի են:

ՑԵՂ Բ. ԵՋԵՐԱՐՆԱԿՆԵՐ (Litorales կամ Charadriidae)

Միջակ կտուց մ'ունին, կտցին արմատին քովը ճակատը գնդաձեւ ուռած է: Բիտ կամ չունին կամ շատ կարճ է: Զրային դաշտերու վրայ կ'ապրին: Ատնք բունախոյս են. եւ շատ տեսակներ ծանօթ են: Գըլխաւորներն են:

113. Եղպիւրիկ (Հայաստան կ'անուանեն Կիւի) (Vanellus cristatus). գլխուն վրայ դէպ ի վեր ծռած սեւ փետուրներու փունջ մ'ունի. փետուրները գոյնզգոյն են: Գլխուն վերի մասը, կուրծքը, թռչաթեւերն



Պտկ. 175. Եղպիւրիկ (1/2):

ու պոչին վերջի ծայրին կէսը սեւ են, կռնակը մետաղի կանանչ է եւ պղնձագոյն կարմիր կը շողայ, վզին երկու քովերը եւ փորը՝ ճերմակ: Կտուցը՝ գլխէն կարճ է:


Եղպիւրիկն՝ ամառը միջին Եւրոպայի եւ Փոքր Ասիայի ճահնային տեղերը կը բնակի, մարդուս մոտադրութիւնը կը գրաւէ իւր գեղեցիկ տես-

քոյն եւ բոլորածեւ թռչելու ատեն հանած տեսակ մը ձայնովը: Հաւկիթներն՝ որ ձիթապտղոյ կանաչ գունով են եւ վրան գորշ բծեր կան, խոտի մէջ կ'ածէ. այս հաւկիթներն շատ անորժահամ են եւ շատ կը փնտռուին:

ՅԵՂ Գ. ԿՑՑԱՐՆԵՐ (Scolopacidae)

Նուրբ ու բարակ կտուց ունին, որ գլխուն չափ կամ գլխէն աւելի երկայն է, կակուղ եւ դիւրաւ կը ծռի: Բունախոյս են, շատ քաջ կը թռչին: Ասոնց գլխաւոր տեսակներն են:

114. Վայրի կոցարն կամ Չիական լուսնուկ (Scolopax rusticola): Փետուրներուն գոյնը գորշ է, եւ գեղին ու մուրթ շերտերով: Կտուցը՝



Պտկ. 176. Վայրի կոցար (1/2):

դէպ ի ծայրը կը բարակնայ, բոլորովին կակուղ է եւ դիւրաբեկ, միայն ծայրը քիչ մը կարծր է, վերի կտուցը մէջտեղէն կրնայ ծռիլ: Ոտուրները կարճ են:

Ծառօթ անցաւոր թռչուն մըն է եւ համեղ մին համար շատ կ'որսացուի: Գլխաւորաբար հիւսիսային կողմերը կը շինէ իւր բոյնը, գաղթելու ատեն՝ (որ Մարտին կը սկսի եւ գրեթէ չորս շաբաթ կը տեւէ,) նոյնպէս աշնան, հրացանով կը զարնեն: Կոցարը գիշերուան թռչնոց պէս կ'ապրի, կերակուրն՝ որ բոտոտ եւ միջատներ են, իւր երկայն կտուցովն խոնաւ եւ կակուղ հողի

մէջէն կը փնտռէ, դուրս կը հանէ: Զբոյրացա՛նք (Sc. gallinago)՝ ձիական թռչնոց պզտիկ մէկ տեսակն են. ասոնց միսն ալ շատ համով է:

Կոցարներու կը վերաբերին շատ մը տեսակներ, բայց ի մասնաւորի Կարմրաբերան իւղբնալը (Himantopus rufipes), ոտուրներն արտաքոյ կարգի երկայն, բարակ եւ կարմիր են եւ մարմնոյն հետ ամենեւին չեն համեմատիր, վասն զի մարմնը հազիւ աղանիթի մը չափ մեծ է, կռնակի կողմը՝ սեւ, իսկ փորի կողմը՝ ճերմակ է: Նոյնպէս՝ Մարգարիտալը կամ Կռնակ իւղբնալը (Machetes pugnax): Արուն վղին բոլորապէս մանեակի պէս փետուրներ ունի, զորոնք ուղած ատեն կը տնկէ, եւ Մայիսի մէջ սաստիկ կատաղութեամբ իրարու հետ կը կռուին:

ՅԵՂ Դ. ԶՐԱՀԱՆԻՐ (Rallidae)

Կտուցը կարճ կամ գլխէն քիչ մը երկայն է: Նըր կտրուած թռչաթեւեր ունին, որ հազիւ պոչին արմատը կը հասնին: Խիտ փետուր ունին: Ըստ մեծի մասին բունախոյս են: Գլխաւոր տեսակներն են:


115. Կոռնիկը կամ Հասարակ խորդ (Grus cinerea) 2 մետր բարձրությամբ ունի: Փետուրներուն գոյնը միակերպ մոխրագույն է, միայն գլխուն առջևի կողմը, փողն եւ սրունքները սեւ են, իսկ գլխուն ետևի լերկ կողմն եւ արտեւանունքը բոլորովին կարմիր են: Ետևի թռչաթևերը՝ փետրափնջի մը պէս պոչին վըայէն կը կախուին: Շիտակ կտուցը՝ հաստ գլխէն քիչ մ'աւելի երկայն է: Երկայն ու լերկ ոտուրներուն ետևի մատը հազիւ գետին կը դպչի:



Պտկ. 177. Կոռնիկ (1/2):

Խորդը՝ շատ ծանօթ է գրեթե աւորաբար իւր գաղթելու տարօրինակ կերպովը. հիւսիսային Եւրոպայի եւ Ասիայի ճահճային տեղերը կը գտնուի, աշունը՝ հարաւային կողմերը կը գաղթէ: Ասորաշաւանքը հասարակօրէն շատ բարձրէն կ'ըլլայ եւ բաց եռանկիւնի մը՝ կամ այս V ձեւով: Այս արտաքոյ կարգի երկչոտ եւ զգուշաւոր թռչնոյն կերակուրն է ամէն տեսակ ծճի, որդ եւ ուրիշ մանր կենդանիներ, ասկէ զատ նաեւ հատիկներ, գլխաւորաբար ոլոռ, սոսք եւ ցորեն ալ կ'ուտէ: Իրենց բոյնը կը շինեն ճահճներու անմատչելի տեղերը: Չագերուն միտը կ'ուտուի: Բազմաթիւ տեսակ կռուենկ կայ:

116. Համբահաւ (Gallinula chloropus): Կռնակի կողմը միագոյն գորշ սեւ է, իսկ փորին կողմը՝ մոխրագոյն: Թռչաթևերուն առջևի



Պտկ. 178. Շամբահաւ (1/2):

փետուրները, նոյնպէս պոչը ծածկող փետուրներուն առաջինները՝ ձեան պէս ճերմակ եղերք մ'ունին: Կտուցը գլխէն կարճ է, ճակատը մերկ եւ



Պտկ. 179. Սեւ փարփար (1/2):

Չեւ՝ իւ. եղեգնուտ առաջաններու եւ լճերու մէջ շատ գտնուող ճահճային թռչուն մըն է:

բոլորովին կարմիր. առջեւի երեք մատուրները շատ երկայն են, եւ թէ՛ ասոնք եւ թէ՛ սրունքները կանանչ են:

Գլխաւորաբար եղեգնուտ առաջաններու մէջ շատ սիրով կը կենայ եւ ջրային ճճիներով եւ միջատներով կը սնանի: Շատ քաջ կը լողայ եւ շատ լաւ ալ կը խորասուզի: Միտը շատ յարգի չէ:

Սեւ փարփարը կամ Կերկերն (Fulica atra) ալ առջինն կը նմանի բայց ասկէ մեծ է, սեւ գոյն մ'ունի եւ ճակատը մերկ ու ճերմակ է: Առջեւի երկայն մատուրներուն լողամորթը մաս մաս կտրուած եւ թաղանթով մը պատած է. Տես Պտկ. 115,


ԿԱՐԳ 8. ԼՈՂԱԿԱՆՆԵՐ ԿԱՄ ԼՈՂԱՑՈՂ ԹՈՒՄՆԱՆԵՐ (Natatores)

Լողացող խաչաւանները ջրոյ մէջ ապրելու համար ստեղծուած են կարծես: Ասոնց մարմինը վերէն մինչեւ վար կլորցած է. կարճ ոտուրներ ունին, որոնք ըստ մեծի մասին գէպ ի ետեւի կողմը ծռած են. ասոնց մատուրները բլթակաւոր են եւ կամ լողամորթով իրարու հետ միացած: Պոչին վերի կողմը գտնուած ճարպի գեղձերէն՝ իրենց կաուցովը տեսակ մը ճարպ կ'առնուն եւ անով իրենց փետուրները կ'օծեն, որպէս զի ասով ցրտութենէ եւ թացութենէ պահպանուին, ոմանք լողալու առան կը խորասուզին (խորասուզներ), ոմանք օդի մէջէն ջուր կը նետուին, ոմանք միայն գլուխը եւ վիզը կը մխեն ջրոյ մէջ, իսկ մարմինը՝ ոչ: Զրոյքովերն անարուեստ բոյներու մէջ կը թխսեն: Գլխաւոր ցեղերն են:

ՑԵՂ Ա. ԲԱՆԴՆԵՐ (Anatidae)

Վերի կզակը եղջերային նիւթէ կազմուած է, ծայրերը սանդղաձեւ եւ բշարիկներով ու ակռաններով պատած է. պճեղներն մինչեւ սրունքները փետրով ծածկուած են: Գլխաւոր տեսակներն են:

117. Վայրենի Բադը (Anas Boschas) գոյնգոյն շողացող փետուրներ ունի, գլուխն ու վիզը մութ կանանչ գունով կը շողան, կուրծքի վերի մասը շագանակի գորշ է, ճակատը սեւ է եւ կապոյտ կամ մանուշակագոյն կը փողփողայ, կտուցն՝ դեղին կանանչ, ոտուրներն ալ նարնջի կարմիր գունով են: Էգը բաց գորշ գունով է եւ վրան մութ բծեր կան: Ատուցը գրկուն չափ երկայն է, եւ առջեւի կողմը տափակ ու լայն, վերի կողմն եղբրը՝ նեղ եւ զուգա-




Պտկ. 180. Վայրենի բադ (1/2):

Տեղական թերթիկներ կան եւ ծայրն ասեղի պէս սուր եւ վար ծռած է: Կարճ եւ լողալու յարմար ոտուրներ ունի:

Վայրենի բադն՝ որմէ ընտանի բադն յառաջ եկած է, Տիւսիսային կիսագնդին ծովերուն եւ գետերուն մէջ կը գտնուի եւ այն ատեն միայն ասկէ կը հեռանայ, երբ ջրերը սառնին: Շատ քաջ կը լողայ. նոյնպէս շատ անգամ ալ կը սուզի ջրոյ մէջ եւ իւր զգայուն կողմն ցեխի մէջէն որդեր, խղունջներ, միջատներ, գորտերու եւ ձկներու ձուեր, գորտի ձագեր, ձկեր եւ ծովային տնկեր կը հանէ: Իւր համեղ մսին համար յարմար տեղեր մասնաւոր շինուած վարմերով կ'որսան զինքը:

118. Այդերուկ կամ Փափկափեարուր Բադ (Somateria mollissima): Կոնակի կողմը ճերմակ, փորը սեւ է. գլխուն վրայ մինչեւ աչուրներուն վրայ սեւ գիծ մ'ունի, այտերը՝ բաց կանանչ, կտուցն եւ ոտուրները՝ կանանչ մոխրագոյն են: Էգն ու ձագերը գորշ գունով են:



Պտկ. 181. Այդերուկ (1/2):

Լողացող թռչնոց պէս հազարաւորներով՝ սեպտեմբր քարաժայռերու վրայ բոյն կը դնէ, եթէ չհալածուի նաեւ մարդու մոտաւորութենէն ալ չի քաշուիր, այլ տառեղներու պէս տանեաց վրայ բոյն կը շինէ: Անարուեստ բոյնը՝ որ ծովային տնկերէ եւ յարդէ կը շինէ, փափուկ փետուրներով կը լեցընէ եւ կանանչադոյն հաւկիթները վրան կ'ածէ: Այս փափուկ եւ արտաքոյ կարգի ձգական փետուրները կը ժողովեն մարդիկ եւ «փետրալից բարձեր», կը շինեն. 1 քիլոգրամ փետուրով մեծ վերմակ մը կը շինուի:

Այդերուկը՝ Տիւսիսային եւ արւայի ծովափուկները կը գտնուի, ծովային կենդանիներով կը կերակրի, զորոնք՝ շատ յաջողութեամբ խորասուզելով կ'որսայ:

Ընդհակառակն քալուածն ու թռիլը շատ դանդաղ են: Միւս

119. Վայրենի սագը (*Anser cinereus*) 5—6 քիլոգրամ ծանր կը կշռէ: Կունակը՝ մոխրագոյն, թիկանց վըայ՝ գորշ մոխրագոյն, փորը՝ սպիտակագոյն է: Թռչաթեւերուն ծայրերը սեւ են, կտուցը՝ նարնջի գունով դեղին, ոտուրներն ալ տժգոյն կարմիր: Կտուցը՝ գլխուն չափ երկայն է, եւ առջեւի կողմը՝ շատ նեղ: Վերի եւ վարի կտուցներուն երկու կողմերն ատամնաւոր են: Ոտուրներն աւելի դէպ ի կրունակը դարձած են, երեք առջեւի մատուրները լայն լողամորթով մ'իրարու հետ միացած են, իսկ ետեւի մէկ մատն ազատ է:




Պտկ. 182. Վայրենի սագ (1/10):

Վայրենի սագը՝ գլխաւորաբար հիւսիսային արեւելեան Եւրոպա եւ Սիբերիա կը գտնուի, աշունը մեծ բազմութեամբ ուղիղ գծով մը կամ եռանկիւնի ձեւով տաք երկիրներ կը դաղթէ: Ճահիճներու եւ եղտիւրներու անմատչելի տեղերը կը շինէ բոյնը: Կերակուրն է գլխաւորաբար սերմանիք, զորոնք դաշտերու վըայ եւ խոտաւէտ տեղեր կը փնտռէ: Վայրենի սագերը շատ նենգաւոր եւ խորամանկ են, շատ լաւ կը թռչին եւ անոր համար դժուարաւ կ'որսացուին: — Ընտանի սագը՝ վայրենիէն յառաջ եկած է եւ մեծութեամբ անոր շատ կը նմանի. մին եւ փետուրներուն համար շատ տեղ իբրեւ օգտակար կենդանի կը հոգացուի:

120. Պորը կամ հասարակ կարապը կամ “Չին+աղը” (*Cygnus olor*) երեւելի է իւր ջինջ եւ ձեան պէս ճերմակ փետուրներու գեղեցկութեամբը, թեւերը ծանր կերպով վեր կը տնկէ, եւ իւր նեղ ու երկայն վիզը կերպ կերպ կը ծռէ ու կը դարձնէ: Կտուցն՝ որ ծայրէ ծայր հաւասար լայնութիւն ունի, դեղնագոյն կարմիր է, իսկ տակի կողմը՝ սեւ եւ արմատին վըայ վեր ցցուած սեւ կունդ մ'ունի: Կտուցին արմատէն մինչեւ աչքը սեւ փետուրներու եռանկիւնաձեւ մաս մը կայ: Սեւ ոտուրները՝ շատ ետեւ ծռած են եւ լողալու յարմար:

Հասարակ կարապը հիւսիսային Եւրոպայի տեղացի հաւերէն մէկն է, շատ անգամ ընտանեցոյնելով պարտէզներու աւազաններուն մէջ զարդի համար կը պահուի: Արմատներով, հատերով, որդերով եւ ջրային ճճիներով կը կերակրի. բայց ձուկ չ'ուտեր երբեք (թէպէտ “ձկնբաղ” ալ կ'ըսուի): Շատ երկայն կ'ապրի, իւր զօրաւոր ձայնը քիչ անգամ կը հանէ, ասոր համար ալ յառաջագոյն զինքը մունջ կը կարծէին, ընդ-

Հակառակն սագերն եւ բազերը մշտ կը կռկռան: — Գեղեցիկ-յն է —
բագն (Cygnus musicus) — Լ ասոր շատ կը նմանի, բայց կոչին վրայ



Պտկ. 183. Կարապ (Գ/11):

կունդ չունի. աշնան միջերկրական ծով կ'երթայ եւ թռչելու ատեն
իւր զօրաւոր բայց անախորժ ձայնովը շարունակ կ'երգէ: Այս ցեղին տակ
յիշատակելու արժանի է՝

121. Շառաագոյն կար-
թիւէ-ը (Phoenicopterus
roseus). Հաստ եւ կրր կը-
տուց մ'ունի, վիզն ու ո-
տուրներն արտաքոյ կարգի
երկայն, եւ մատուրները
լողամորթով իրարու միա-
ցած են. ստուգիւ թռչնոց
“Լրէշը” կրնայ կոչուիլ:

ՑԵՂ Բ. ՄԱԹԿՈՑԵՆՆԵՐ (Steganopodes)


Իրարու հետ մաշկով մի
միացած 4 հատ մատ ունին,
ետեւի մատը՝ դէպ ի ներս
դարձած է: Բունակալ են.
այս ցեղին տեսակներն են:



Պտկ. 184. Շառագոյն կարմիրթն (Գ/10):

122. Հառապուսներ կամ թռչնը (Pelecanus onocrotalus) շատ մեծ լողացող թռչուն մըն է, 3 մետրէն աւելի երկայնութիւն ունի, երկայն, տափակ եւ ծայրը կեռ կտուցին տակը շատ մեծ մարթէ պարկ մը կայ: Իբաց առեալ սեւ թռչաթեւերը՝ փետուրները ճերմակ են եւ քիչ մը կարմրի կը զարնեն, իսկ աչուրներուն բոլորտիքը մինչեւ ճակատը լերկ է: Կարճ ոտուրներուն ետեւի մատը քիչ մը կողմնակի կեցած է եւ մի եւ նոյն լողամորթով միւս երեք մատուրներուն հետ միացած է:

Այս մեծ անձուռնի եւ տծեւ թռչունը Սեւ ծովուն եւ Կասպից ծովուն բոլորտիքը շատ կը գտնուի: Հատ լաւ կը թռչի եւ բաւական բարձրութենէ՝ ձուկ որսալու համար յանկարծ գրւիտիւյր ջուր կը նետուի. այս ձկներն ի սկզբան անդ իւր բնդարձակ պարկին մէջ կը պահէ եւ ետքը թռչելու ատեն կը կլկէ եւ կամ ձագերուն կը տա:




Պտկ. 185. ՀԱՆԱՐԱՐԱՆ (1/10):

նի: Հատ շատակեր ըլլալէն զատ նաեւ ձագերն ալ առատութեամբ կը կերակրէ: Հատ դիւրաւ կ'ընտանենայ:

Յարգաւորութեամբ (Phaëton aethereus) որաթռիչ թռչնոց կը վերաբերի եւ արեւադարձի ծովերը կը բնակի, կարճ պոչին վրայէն 2 հատ երկայն փետուրներ կ'երկնան: Թռչելու ատեն պոչին փետուրները մկրատի պէս կը բանայ եւ կը գոցէ:

Ջրագործ (Cormoranus) հիւսիսային Եւրոպայի ծովերը բազմութեամբ կը գտնուի եւ ձկնի կ'որսայ եւ կ'ուտէ, առով ձկնորսութեան շատ փաստ կար է: Չինաստան ձուկ բռնելու կը կրթեն: — Զուլը կամ Եւրոպայի Տաչպետ (Tachypetes aquilus): Թեւերուն տարածութիւնը 2'5 մետր է, թռչաթեւերն արտաքոյ




Պտկ. 186. Զրագործ (1/10):

կարգի երկայն, պոչի թեւերն ալ երեքտանիի ձեւով բաժնուած են, ընդհակառակն ոտուրները արտաքոյ կարգի կարճ եւ պզտիկ են: Այս զարմանալի թռչունն ոչ կրնայ քայլել, ոչ լողալ, եւ ոչ ալ դեռնէն կամ ջրոյ վրայէն մէկէն թռչել վեր բարձրանալ: Մղոններով ջամաքէն կը հեռանայ, որչափ ալ սաստիկ փոթորիկ ըլլայ, սակայն օդի մէջ թեւերը սաւառնելով կը կենայ եւ թռչող ձկնը կ'որոայ եւ կամ ուրիշ ծովային թռչնոց որոք կը յափշտակէ:

ՑԵՂ Գ. ԱՐԱՐՆԵՐ (Laridae)

Բունակալ թռչուններ են. ծայրը տկար կտուց մ'ունին: Երկայն ու սրածայր թեւեր ունին: Գլխաւոր տեսակներն են:


123. Զուարթ որորը (կամ աճալը) (*Larus ridibundus*) աղաւնոյ մը մեծութիւնն ու ձեւն ունի. գոյնը ճերմակ է եւ բաց մոխրագոյնի



Պտկ. 187. Զուարթ որորի գլուխ (1/2):

կը զարնէ: Գլուխն ու վիզը՝ գարնան եւ աշունը՝ կարմրագոյն գորշ են, ձմեռը՝ ճերմակ: Կտուցն ու ոտուրները՝ ծիրանեգոյն կարմիր են. առջեւի երկայն թռչաթեւերը ճերմակ են. բայց ծայրերը՝ սեւ: Երկայն եւ նուրբ կտուցին ծայրը դէպ ի վար ծռած է, վարի կտուցը՝ քիչ մը անկիւնաձեւ կտրուած է: Առջեւի երեք մատուրներն ամբողջ լողամոր-

թով մ'իրարու հետ միացած են, եւ ետեւի փոքրիկ մատը քիչ մը բարձր կեցած է:




Պտկ. 188. Արծաթագոյն որոր (1/2):

Զուարթ որորները բոլոր Եւրոպայի ծովափունքն եւ ջամաքածովերը բազմութեամբ կ'ապրին եւ մանր ձկներով, որդերով եւ միջատներով կը կերակրին: Վառվառն եւ կայտառ կենդանիներ են, որոնց բարձրա-

ձայն աղաղակը ծիծաղել կը նմանի. ասկէ առեալ «զուարթ որոր», կ'անուանուին: Յուրա եղանակներն ասդին անդին անկանոն կերպով կը թափառին եւ մարդկան՝ ոչ օգուտ ունին. եւ ոչ ալ փնասով երինին շատ կը նմանի հոս նկարուած Արծաթափայլ որորը. *L. argenteus*.

Որորներու շատ կը նմանին, բայց առանց մէ պզտիկ են ծովէն ծով: Բոլորէն թռչելու ժամանակն որոնք երեք ժանիկ ձեւով պոչ ունին, գետերու եւ աւազաններու քովերը ձկնէր կ'որոնան. առանց սեռէն է Հարաւայի ծովէն ծով (Sterna hirundo):




Պտկ. 189. Գորշ Ժողածիծառ (1/2):

ՑԵՂ Դ. ՄՐՐԿԱՆՈՒՆԵՐ (Procellariidae)

Խողովակաձեւ բթի ծակեր ունին: Կտուցին երկու մասերու ծայրերուն վրայ գտնուած եւ ուղեքներ կան: Իրենց երկայն թեւերուն պատճառաւ երկայնաթիւ (Longipennes) ալ կ'անուանուին:

124. Չիլիո՛ւ, Դիոմէդ, Զբիթա՛նը (*Diomedea exulans*) լողացող թռչուն մըն է, որուն թեւերուն տարածութիւնը 3·5—4·5 մետր կ'ըլլայ: Կողմնական բթափողեր ունի եւ լողալու յարմար ուտուրներ, բայց ետեւի մատ չունի: Փետուրներուն գոյնը ճերմակ է, կոնակը՝ մոխրագոյն, միայն թեւերը սեւ են:

Գլխաւորաբար հարաւային կիսագնդին երկիրները կը բնակի, եւ զարմանալի զօրութեամբ նոյն իսկ մերկի ասեռն հեռաւոր տեղեր կը թռչի կ'երթայ: Կերակուրն է՝ ձկնէր,



Պտկ. 190. Դիոմէդ (1/4):


զորոնք օգի մէջէն յանկարծ ծով նետուելով կ'որսայ: Միւր կարծր եւ ճարպոտ է:

Մըրիւհաւը (*Thalassidroma pelagica*) զարմանալի զօրութեամբ մը նոյն իսկ փոթորիկ եղած ատեն ծովու հողմակոծ երեսին վրայ կը լողայ եւ կամ ջրոյ վըայէն կը թռչի եւ ծովածուփ ալեաց մէջ իւր որսը կը փնտռէ: Ասոր կը վերաբերին աեւ Հիւսիսային Տրոպիկալ (Procarraria glacialis), որորի մէկ տեսակն է, ծայրը կեւ դեղնադոյն ամուր կտուց մ'ունի, որուն վրայ են փողածեւ քթի ծակերը: Այս թռչունը հիւսիսային կողմերը կը գտնուի, շատ գէր է եւ հարիւր հազարներ մէկտեղ կ'երթան ժայռերու անձաւներուն մէջ թռիս կը նստին:

ՑԵՂ Ե. ԽՈՐԱՍՈՑՆԵՐ (Colymbidae)

Վարազաթեւերը շատ կարճ են եւ հազիւ մինչեւ կարճ պոչին արմատը կը հասնին: Վիզը՝ երկայն. կտուցը՝ նուրբ եւ սրածայր: Գլուխաւոր տեսակներն են:

125. Ծովառուղակ կամ Կապարաւոր Խորասոց (Podiceps cristatus): Ոտուրները կարճ եւ բոլորովին դէպ ի ետեւի կողմն են, մատուրներն առանձին առանձին



Պտկ. 191. Ծովառուղակ (1/10):

լողամորթ ունին: Կտուցն՝ երկայն, նեղ, կարծր եւ սրածայր է: Փետուրներու գոյնը կոնակի կողմը սեւագորշ, իսկ փորին կողմը՝ արծաթի պէս փայլուն: Արուններու գլխուն բոլորտիքը՝ շագանակագոյն գորշ խրճնացեալ փետուրներու մանեակ մը կայ, իսկ ճակատին վրայ սեւագոյն երկբաժին ցցունք մը:

Դանդաղամած եւ շամբուտ ջրերու մէջ առդին անդին քանի մը հատ կը գտնուի: Խորասոցները միայն ուղղորդ գիրքով կրնան կենալ, իսկ ցամաքի վրայ քայլելու ատեն դիւրաւ կը գլորին կ'իյնան: Բայց ընդհանրապէս սուգելու մէջ շատ յաջողակ են եւ այս բնելու ատեն

իրենց թեւերն ղեկի տեղ կը գործածեն: Ասոնց միւր հազիւ թէ կ'ուտուի, մորթն երբեմն իբրեւ մուշտակ կը գործածուի: Ասոնց ցեղին տակ կ'երթայ Հիւսիսային (Colymbus septentrionalis):

ՅԵՂ Զ. ԹԱՆՅՐԱՆՈՒՆԵՐ (Alcidae)

Ասոնց կտուցին երկու կողմերը ակօսներ կան, կարճ վիզ մ'ունին, մանգաղաձեւ թեւեր. ոտքերը պոչին քովերն են:


126. Հսկայ կամ Հի-սիսային Թանյրահաւը (*Alca torda*) չի կրճնար թռչել, եւ ինչպէս կ'երեւայ բոլորովին բնաջինջ եղած թռչուն մըն է: Լաբրադորի, եւ Իսլանդի քովերը գտնուած կղզեաց վըայ, նոյնպէս Ֆարէօրեան, Հէբրիդեան կղզեաց վըայ կը գտնուէր:

ՅԵՂ Է. ՊԵՆԳՈՒՆՆԵՐ (ԸԹԵՒՈՒՆՆԵՐ) (Impennes)

Տափակ թեւերն՝ թեփանման փետուրներով ծածկուած են եւ աւելի լողալու յարմար են:

127. Փայլուն Պենգո-նը կամ Թե-սայը (*Apdenodytes patagonica*) շիտակ կեցած ատեն 1 մետր բարձր է: Տափակ թեւերը՝ լողաթեւերու պէս են. վարաղաթեւեր չունի: Պտկ. 192. Հսկայ թանծրահաւը (1/12): Ընդհանրապէս փետուրները շատ կարճ են եւ թեփերու կը նմանին, փորը՝ ճերմակ է եւ փետուրները մետաքսի պէս պառկած են, վիզն ու կուրծքը՝ կիտրոնի դեղին, իսկ մնացած տեղերը՝ խիստ մոխրագոյն են: Երկայն կտուցը՝ սրածայր եւ գմբեթաձեւ է:

Այս անթեւուկը՝ բազմաթիւ խումբերով Մագելլանեան ջրանցքին ծովազերքը կ'ապրի: Ցամաքի վըայ արտաքոյ կարգի դանդաղ ու անճարակ է, որովհետեւ հազիւ կրնայ քալել, իսկ վազել ամենեւին չի կրնար: Զրոյ մէջ սովորաբար մինչեւ պլուխը սուզած կը մնայ: Աերակուրն է գլխաւորաբար՝ ձուկ: Թէպէտ եւ միսը սեւ է եւ չի կրնար ուտուիլ, սակայն եւ այնպէս իւր ճարպին եւ գեղեցիկ մեւշտակին համար շատ կ'որսացուի:



Պտկ. 193. Պենգուին (1/12):

ԿԱՐԳ 9. ՎԱԶՈՂ ԹՈՒՉՈՒՆՆԵՐ (Cursores)

Ջանազան մատեր ունեցող ցամաքային յաղթանդամ թռչուններ են. ճոզած թեւեր ունին եւ միայն լաւ կը վազեն: 5 գլխաւոր ցեղ կը բաժնուին:

ՑԵՂ Ա. ԵՐԿՄԱՏՆԵԱՆ ԶԱՅՆԱՄՆԵՐ (Strutheonida)

128. ԱՓԻԻԿԷԻ Զայէւամ (Struthio Camelus). Ինչպէս որ կ'իտազգիները կաթնատու են, բայց ցամաքի վրայ ապրելու անկարող են, նոյնպէս ջայլեամը թռչելու անկարող է եւ միայն ցամաքի վրայ կ'ապրի: Ամենամեծ թռչունն է, 2.5 մէտր բարձր կ'ըլլայ: Գլուխը լերկ, փոքր եւ տափակ է, իսկ վեղը արտաքոյ կարգի շարժուն, երկայն եւ լերկ է: Մարմինը փոքր է, փետուրները փափուկ, նոյն իսկ սեւ



Պտկ. 194. Ափրիկէի Զայլեամ (1/2):

Թռչաթեւերն եւ պոչին փետուրները բամբակի պէս կակուղ են: Երկայն եւ լերկ ոտուրներուն ծայրը 2 մատուրներ ունի, որոնցմէ ներսի կողմինը տափակ ըզունգ մ'ունի: Խոշոր աչուրներն՝ որոնք արտեւանունք եւ յօնք ունին, բոլոր միւս թռչնոց աչուրներէն աւելի շարժական են:




Պտկ. 195. Զայլեամը կը վազէ:

1½ քիլոգ. ծանր եւ 2½ հաւու հաւկիթի մեծութեամբ կ'ըլլայ: Արուն եւ էգը 65 օր փոփոխակի կը թխան այս հաւկիթները, բայց միայն գիշերները, վառն զի ցերեկն արդէն արեւուն ճառագայթները միեւնոյն ազդեցութիւնը կ'ընեն: Թեւեւ բոլ մեծագին փետուրներուն համար Զայլեամը կ'որոտն եւ կ'ընտանեցընեն:

Զայլեամը՝ Ափրիկէի ընդարձակ անապատները խումբ խումբ կ'ապրի: Թէպէտ մարմնոյն ծանրութեանն եւ թոյլ ու կարճ թեւերուն համար թռչել չի կրնար, բայց իւր ընթացքն այն աստիճանի շուտ է, որ ձի մը հազիւ կրնայ հասնիլ իրեն: Չանապան տնկային նիւթեր ուտելու ատեն՝ մանր քարեր եւ ապակւոյ բեկորներ, լաթի կտորներ ալ կը կլլէ եւ փնտս մը չի կրեր:

Էգը աւագի մէջ խոնաւ տեղեր փոս մը կը փորէ եւ 15—18 հատ ձերմակ հաւկիթ կ'ածէ, որոնց մէկ հատը

ՅԵՂ Բ. ԵՐԿՄԱՏՆԵԱՆ ԶԱՅԼԵԱՄՆԵՐ (Rheidae)



Պտկ. 196. Կատուար (1/20):

ասոր փետուրները ձարակերպ են: Հնդկաշայլեամներու գլխուն վրայ

ԿԵՆԴՐԱՆՈՒՄԻՆԻՆԻ

Նանդուան (Rhea americana) Ափրիկէի Զայլեամէն պզտիկ է. եւ ոտուրներուն ծայրը 3 մատ ունի, գլուխն ու վիզը տեղիս տեղիս փետրաւոր է: Հարաւային Ամերիկա կը գտնուի:

Նոյնպէս Նոր Հոլլանդա ալ Էմու (Dromaeus Novae Hollandiae) անուամբ 3 մասնեայ Զայլամ մը կայ: Միայն փետուրներու կազմութեամբը կը զանազանի Նանդուանէ:


ՅԵՂ Գ. ԿԱՍՈՒԱՐՆԵՐ (Casuaridae)

Հնդիկ Զայլամ կամ Կասուար (Casuarus indicus).

եղջերանման սաղաւարտ մը կայ, եւ ընդ կոծիծաւոր վզին վըայէն 2 հաս-
րըթիկ կախուած է: Ամեն ալ Հնդկաստան կը գտնուին:

ՅԵՂ Դ. ԿՅՏՈՒՈՐ ԶՈՍԵՆՈՐՆԵՐ (Apterygidae)


Ափ-ի (Apteryx au-
stralis Հարաւային Աւ-
թե-էայ) ըսուածը զար-
մանալի կազմաճիւղ ունի,
թռչաթեւերը շատ կարճ
մնացած են, երկայն ու
նուրբ կտուց մ'ունի,
քթին ծակերն ալ այս
կտուցին երկայնութեան
չափ են: Փետուրները
գորշ եւ մազաձեւ են:
Նոր Զէլանդայի ճահ-
նային տեղերը կը բնակի
եւ գիշերուան թռչուն
մըն է, շատ քիչ կը
գտնուի եւ հազիւ նոր
ժամանակներս ճանչ-
ցուեցաւ:



Պտկ. 197. Կիւի (1/12):

ՅԵՂ Ե. ՈՐՈՍՆԵՐ (Otidae)

129. ՄԵԶ արօւր
(Otis tarda) Եւրոպայի
թռչող թռչնոց ամենա-
ծանրն է, 17 քիլոգրամ
կը կշռէ: Գմբեթարդ
կտուցը շատ զօրաւոր է,
կտուցին երկու կողմը
կախուած խոզաններ
կան: Գլուխն ու վիզը՝
մոխրագոյն, կոնակը՝
ժանկագոյն խարտեաշ
է, եւ վրան սեւ եւ կո-
հակաձեւ գծեր կան:
Թռչաթեւերուն վերի
փետուրները՝ ինչպէս



Պտկ. 198. Արօս (1/12):


նաեւ պոչին ծայրը ճերմակ են: Ոսուրները դեպ ի վար շատ լերկ են եւ ետեւի մատ չունին:

Այս մեծ թռչունն՝ Եւրոպայի եւ Միջին Ասիայի անծառ եւ ցանուած դաշտերը կը գտնուի, թէպէտ կրնայ լաւ թռչել, բայց սովորաբար արագընթաց կը վազէ: Շատ երկշոտ բլալուն, քովը մտնեալ շատ դժուարին է. շատ դժուարընտել է:

Նոյնպէս ծանօթ են ուրիշ քանի մը տեսակ վազող թռչուններ, որոնք հիմայ սպառած են. թռչել չէին կրնար եւ մեծութեան եւ զօրութեան կողմանէ նոյն իսկ Ափրիկէի ջայլեամբ ալ կը գերազանցէին: Մեծաւ մասամբ Նոր Զէլանդա կ'ապրէին եւ Հոկայտոն կամ Մոյո (Dinornis) անուամբ ծանօթ են:

ԹՈՂՆՈՑ ՎՐԱՅ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԻՑԵԼԻՔ

Ողնայարաւոր կենդանեաց երկրորդ դասը կը կացուցանեն Ռալոնները. կաթնատուներու պէս հաստատուն ոսկրէ կազմածք մը, կարմիր եւ տաք արիւն ունին, թորքերով շունչ կ'առնուն բայց կաթնատուներէն կը տարբերին, նախ՝ վանն զի փետուրներով ծածկուած մարմին մ'ունին, երկրորդ՝ կրային կեղեւով կարծր հակիթ կ'ածեն, զորոնք ամէնն ալ առանց բացառութեան իրենց մարմնոյն ջերմութեամբ կը թխսեն: Ասոնց կզակին ծայրը՝ եղջերանման կտուր մը կայ, իսկ բուն ալուաներ չունին: Առջեւի անդամները միշտ թեւ են, ոտուրներուն ծայրը 4 հատ, իսկ երբեմն 3, եւ կամ միայն 2 հատ մատ ունին, եւ իրենց զանազան ապրելու կերպին համեմատ՝ այս մատուրներն ալ զանազան կազմութիւն ունին: Բոլոր թռչուններն ընդհանուր բնակութենէն առեալ երեք խմբի կրնանք բաժնել, ա. օդային, Բ. ցամաքային եւ Գ. ջրային Ռալոններ: Թռչնոց մեծագոյն մասը իրենց ձագերուն մեծ հոգ ու խնամք կը ցուցնեն, աւելի կամ նուազ արուեստական բոյներ կը շինեն, որոնց մէջ կ'ածեն հաւկիթները եւ կը թրխսեն: Ոմանց ձագերը հաւկիթէն ելած ատեն լերկ կ'ըլան, եւ թրխս-



Պտկ. 199. Հաւուն մարտողական գործարանը:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ա. Որկուր. | Բ. Կուրաղի. |
| Բ. ստուգն (նախաստամոքս). | Գ. ստուարաղի. |
| Գ. ստամոքս. | Դ. կորի. |
| Դ. առաջնաղի. | Ե. նրբաղի. |
| (Կ. երկվեցաղի). | Զ. լեարդ. |
| | Է. խածի. |

մայրը զիրենք կը հոգայ, փնջեւ որ ասոնց փետուրներն աճին, իսկ ընդհակառակն ուրիշներն ալ հակիրթէն ելածին պէս աղուամազ մազերով ու փետուրներով ծածկուած կ'ըլլան, թխամայրը զիրենք չի հոգար, այլ իրենք իրենցմէ իրենց կերակուրը կը փնտռեն: Ասկէ առեալ թըռչուններն երկու կը բաժնուին, ոմանք բոյնին մէջ մնացող՝ Բունակալ, իսկ ոմանք իրենց բոյնն անմիջապէս թող կու տան՝ Բունախոյս:

Առաջիններուն տակը կ'երթան. 1. Երգեցիկներ, 2. Կարկաչուներ, 3. Մագլղղներ, 4. Գիշարող Ռուլ-ններ եւ 5. Աղա-ններ:

Իսկ վերջիններուն կը վերաբերին. 6. Հա-աղգի Ռուլ-ններ, 7. Ճահնայի Ռուլ-ններ, 8. (ըստ մասին) Լողացող Ռուլ-ններ եւ 9. Վաղաղ Ռուլ-ններ:




ԻԱՍ Գ. ՍՈՂՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ԶԵՌՈՒՆՆԵՐ (Reptilia)

Սողունները կը կացուցանեն ողնայարաւորներու երրորդ դասը. ասոնցմէ մինչեւ հիմայ 1500 տեսակ ճանչցուած է, որոնց 450ը գրեթէ սպառած է: Ընդհանուր առմամբ 4 կարգի կը բաժնուին սողունները, որոնց առաջինն է:

ԿԱՐԳ 1. ԿՐԻԱՆՆԵՐ (Testudines)

Կրիաներն՝ իրենց կմախքին որպիսութեամբը շատ նշանաւոր են: Ասոնց մորթը կը փոխուի ոսկորեայ կամ եղջերեայ նիւթի մը, որ կարճ եւ լայն մարմնոյն երկու կողմը հաստատուն վահան մը կը կազմէ եւ այս վահանին վրայ եղջերեայ դրուագներ (վահանակներ) կան: Միայն վզին, 4 անդամներուն եւ պոչին քովերը մորթը հասարակ կաշի մնացած է, առանց ոսկրի: Ասոնց ատամնատ բերանը կտցի կը նմանի: Կրիաները դանդաղ, խոտաճարակ եւ արտաքոյ կարգի օգտակար կենդանիներ են: Շատ չարքաշ եւ դիմացկուն կեանք ունին, կրօնան ամիսներով անօթի մնալ, նաեւ շատ ծանր եւ զօրաւոր հարուածներու ալ կը դիմանան: Երբեք գլխաւոր ցեղերու կը բաժնուին:



Պտկ. 200. Գետակրայի կմախք:

ա. Ուռուկը. բ. անրակ. գ. ծղիք. դ. տիպք. ե. ող-
նաշար. զ. կող. ի. կոնք. ը. պքեայ. թ. ազգը:


ՅԵՂ Ա. ԺԱՆՈՍԻՆ ԿԻՐԱՆԵՐ (Emyda)

130. Եւրոպայի Գեոպոլիս (Emys lutaria): Կոնակի վահանը (խեցին) քիչ մը գմբեթարդ է, վրան 13 հատ սեւ, գեղին բծերով՝ եղջերեայ դրուագներ կան. այս վահանը՝ կուրծքի տափակ եւ գեղին խեցւովը կապուած է, այնպէս որ միայն գլուխն, ոտուրներն ու պոչը յատուկ ծակերէն դուրս կ'երկնան: Ատամազուրկ բերանը՝ Թռչնոյ մը կտուցին շատ կը նմանի, եւ շատ սուր եւ կարող եղջերներ ունի: Չորս հաւասարաչափ ոտուրներուն ծայրը շարժական մատուրներ կան, որոնք տեսանելի լողամորթով մ'իրարու հետ միացած են, եւ այս մատուրներուն ծայրը՝ երկայն եւ սուր ըղունգներ ունի:

Այս կրիան Ասիա՝ եւ ի մասնաւորի Կասպից ծովուն քովերն եւ հաւաւային եւ միջին Եւրոպայի ճահիճներու մէջ՝ որդերով, խղունջներով եւ ձկներով կ'ապրի: Չուերն՝ որոնց արտաքին կեղեւը շատ կակուղ է, ջրոյ քովերը՝ չոր հողին տակը կ'ածէ: Իրեն ուտելի մսին համար սաէպ վաճառատեղիները կը բերուի:

ՅԵՂ Բ. ԺԱՎԱԿՐԱՆԵՐ (Chelonida)

131. Վելապոպոլիս կամ Ծովակրան (Chelonia Midas) 2 մետրէն աւելի երկայն, եւ 400—450 քիլոգրամ ծանր կ'ըլլայ: Կոնակի վահանն ըստ բաւականի տափակ է, եւ մեծ ու եղջերեայ դրուագներով ծածկուած: Գլուխն ու ոտուրները ներս ամփոփել չի կրնար: Առջեւի




Պտկ. 201. Ծովակրայ (1/20):

ոտուրներն՝ ետեւիններէն աւելի երկայն են, մատուրներն՝ անշարժ, եւ մորթով մը միացած՝ լողալու յարմար լողարանի մը փոխուած են:

Առջնորեան Ովկիանոսի տաք կողմերը, բայց ի մասնաւորի ցած եւ աւազուտ կղզիներու քովերը (Ճաւա, Սումատրա) շատ կ'ըլլայ: Լուրն-

կայ գիշերները ծովակրաները ցամաք կ'ելլեն, իրենց ձուերն աւազի մէջ թաղելու համար: Բձէ ձուերը եւ թէ նոյն իսկ այս կենդանիներն որսալու յարմար առիթն/այո է: Այս անասնոյն ոչ թէ միայն միսը, այլ նաեւ ճարպն ու խեցին կը գործածուին:

Ս-ն-դ-ը-ն (Chelonia imbricata) ալ վերինին կը նմանի, բայց անկէ շատ պզտիկ է: Ասկէ կ'ելլէ կրե-ն-ը կամ կօր (աճ. պղ-), ըսուածն,




Պտկ. 102. Սանդրակրայ (1/2):

որմէ ունդր, տուփ եւայլն կը շինուի. կրեոսկրը՝ կրիային կռնակի՝ եղջերեայ, թափանցիկ, դեղնկեկ եւ գորշ բծերով վահանին դրուագներն են:

ՅԵՂ Գ. ՅԱՄԱՔԻ ԿՐԻԱՆԵՐ (Chersida)

132. Յո-ն-ա-կ-ան կամ Յամաթի կրիայ (Testudo graeca): Կռնակի վահանը շատ գմբեթաձեւ է, վրայի դրուագները՝ դեղին, սեւ բծերով եւ ծայրերը ափսոսաձեւ ճեղքեր ունին: Գլուխն ու ոտուրները կրնայ ասոնց տակն ամփոփել: Մատուրներն անշարժական են, եւ մինչեւ բթածայր ըղունդներն իրարու հետ միացած:

Եւրոպոյի եւ ի մասնաւորի Յունաստանի աւազային եւ անտառաշատ կողմերը կը գտնուի: Տնկերով, պտուղներով, խղունջներով եւ բոտոսներով կ'ապրի, եւ եր-



Պտկ. 203. Յամաքի կրիայ (1/2):

բեմն պարտեզներու մէջ բոտոտները ջնջելու կը գործածուի: Չմեռը քնանալով կ'անցընէ. նոյնպէս այո ալ վաճառատներէն կը բերուի: Ասոնց արիւնը առանց եփելու կը խմուի, եւ կուրծքի հիւանդութեանց օգտակար է:


Ար գտնուին նաեւ ուրիշ կրիաներ, որոնց մարմինը՝ փոխանակ խեցւոյ՝ միայն կաշւով պատած է, եւ ասոր համար ալ կոչուողոյ կըսեն (Sphargis coriacea) կ'անուանուին:

ԿԱՐԳ 2. ՆՀԱՆԳՆԵՐ (Crocodilina)

Այս կարգը 3 խումբի եւ յաղթանդամ կենդանիներ կը պարունակէ. զարմանալին այն է որ այս 3 սեռերն ալ տարբեր տեղեր կը գտնուին, եւ այս՝ պատճառ տուած է ոմանց զասոնք տարբեր ցեղեր նկատելու:

Նհանգները ջրաբնակ զեռուններ են, երկայնաձեւ, տափակ եւ հաստ կունտերով ծածկուած մարմին եւ անկիւնաւոր՝ ղեկավարելու յարմար պոչ եւ սեպաձեւ ակռաներ ունին:

133. Նեղոսի կոկորդիլոսը (Տիֆեւը կամ Խէլը) (Crocodylus vulgaris) 6 մետրէն աւելի երկայնութիւն ունի: Երկայնաձիգ մարմինը՝ որ 4 կարճ եւ մաշկապատ ոտիցը վրայ կը հանգչի, հաստատուն զրահով մը եւ կամ ոսկրէ վահանով մը ծածկուած է, եւ երկայն, քովերէն



Պտկ. 204. Նեղոսի կոկորդիլոս (Դա):

ձմրուած, վերի կողմը սրոցաձեւ ատամնաւոր եւ արտաքոյ կարգի զօրաւոր պոչ մ'ունի: Առնակի կողմը ձիթապտղոյ կանանչ է, սեւ շերտերով ու բծերով, իսկ փորի կողմը՝ դեղին կանանչ է: Գլուխը տափարակ է, աչուները՝ մանր եւ շատ դեպ ի ետեւը կեցած են ու կը փայլին: Քթի ծակերն եւ ականջները ծածկութեով ծածկուած են: Մեծ ու ընդդարձակ երախքին ահագին ակռաներն՝ անհաւասար երկայնութեամբ, սրածայր եւ բերնին մէջ ցիր ու ցան կեցած եւ սեպացած են: Լեզուն կարճ ու տակի կողմը յատակին կպած ու միացած է:

Նեղոս, Սէնէգալ եւ Ափրիկէի ուրիշ գետերը շատ կը գտնուի: Ահա-
գին գազան մըն է որ նոյն իսկ մարդու ալ կրնայ վնասակար ըլլալ: Ցե-
րեկը գետեզերքը կը քնանայ հանգիստ, եւ գիշերը յափշտակելու
կ'ենլէ:


Ցամաքն այնպիսի յաջողակ չէ եւ չի կրնար շուտով ետ գառնալ, ընդհա-
կառակն ջրոյ մէջ նետի պէտ արագ կը շարժի: Արագի հաւկթի մեծու-
թեամբ հարիւրի չափ կարծրակեցել հաւկթի կ'ածէ աւազի մէջ: Նսեւ
բուն կոկորդիլոսներն ալ շատ կը հալածուին եւ քանի մ'ազգեր առնոց միտը
կ'ուտեն: Բայց սրտաբաւթիւնը շատ վտանգաւոր է: Գառնալոցն Եգիպտոս
շատ կոկորդիլոս կար եւ մասնաւոր կերպով պաշտօն կ'ընդունէր:

Այրեցեալ գօտւոյն ամէն գետերու մէջ կոկորդիլոսի նման գազան-
ներ կը գտնուին: Ամերիկա՝ ուր շատ բազմութեամբ կ'ըլլան եւ Ամա-



Պտկ. 205. Կայմանի գլուխը:

զոն, Օրինոկոյ եւ Միսիսիպի գետերուն մէջ, կ'ապրին Կոյման կամ Այ-
փաթոր ըսուած նահանգները: Հնդկաստանի Գանգէս գետը գտնուող տի-



Պտկ. 206. Գաւիալ:

տեւը՝ Գա-ի-լ կ'անուանուի, եւ նոյն իսկ հիմայ տեղացի ժողովուրդը
կը պաշտէ զասիկայ:

ԿԱՐԳ 3. ՕՁԵՐ (Ophidia)

Բոլոր օջիւրն՝ երկայնաձիգ, գլանաձեւ, թեփոտ եւ առանց ոտքի
մարմին մ'ունին, գետնի վրայ, ջրոյ մէջ եւ կամ ծառերու վրայ գալա-
րելով յառաջ կը շարժին: Մարմնոյ այս արտաքոյ կարգի երկայ-

նութիւնը ներքին գործարանաց վրայ մեծ փոփոխութիւններ յառաջ կը բերէ: Թափանցիկ, անշարժ ծածկոյթ մ'ունին իրենց աչքերուն վրայ. վարի կզակին ու վերի քմաց ոսկրն իրարմէ բաժնուած աճած ըլլալուն՝ հրախքն ու կոկորդն արտաքոյ կարգի առանձգական են: Ասոնց ակուանները դէպ ի ետեւը ծուած են եւ երախքին մէջ առատ



Պտկ. 207. Իծի գլուխ:


շողիք ունենալով՝ իրենց կերածը դիւրութեամբ կը կլլեն: Օձերն երբեք չեն կր բաժնուին. խռնաւոր եւ անխոյն օձեր: Անթոյն օձերու մեծ մասն՝ իրենց որսը միայն իրենց բաց բերնովը կ'որսան եւ անմիջապէս ողջ ողջ կը կլլեն. վիշապ օձերը նախ իրենց զօրաւոր գալարուածքներովը (քնթունոցներովը) կը ճմլեն, իսկ թունաւոր օձերը հանդարտ կը սպասեն, մինչեւ որ թունաւոր խածուածքն ազդեցութիւն ընէ եւ ետքը կը կլլեն: Պաղարիւն կենդանիներ են, իրենց կերածը շուտով չեն կրնար մարսել, եւ ընդհանրապէս շատ քիչ կ'ուտեն:

ՑԵՂ Ա. ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՕՁԵՐ (Venenosa)

Թունաւոր օձերն ընդհանուր արտաքին նշան մը չունին, որով ապահովութեամբ չեն կրնար ճանչցուիլ: Թունաւորներէն շատերուն գլուխը մանր թեփերով ծածկուած է. եւ այս գլխուն վարի մասն անհամեմատ կերպով լայն է. բուն զանաղանիչ նշանն է՝ վերի կզակին վրայի երկու հատ երկայն, շատ կոր, սնամէջ եւ շիտակ ակուանները, եւ եթէ օձը խայթելու ըլլայ, ասոնց վերի կողմը գտնուած փամփշտիկէ մը՝ այս ակուաններուն մէջ թոյն կը վազէ եւ անկէ ալ վէրքի մէջ կ'երթայ: Թոյնը՝ թափանցիկ, դեղնակէ հեղանիւթ մըն է, որ ոչ հոտ եւ ոչ համ ունի, եթէ պարզապէս կլլուի, փնասակար չէ, բայց արեան հետ անմիջական հաղորդութեան մէջ մտածին պէս, զարհուրելի հետեւութիւններ կ'ունենայ, նոյն իսկ քանի մը ըրպէի մէջ մահ ալ կը պատճառէ: Ամէն թունաւոր օձ հաւասարապէս վտանգաւոր չէ, նաեւ մի եւ նոյն օձին խածուածքը զանազան է, որովհետեւ օձի մեծութենէն, տարիքէն, վէրքի մէջ վազած թոյնին քանակութենէն, կլիմայէն եւ տարւոյն եղանակէն կախում ունի: — Թունաւոր օձի մը խածուածքը՝ երկու բարակ ասեղն խայթուածքին կը նմանի. երբեք օձ մը իւր երկայն եւ երկճիւղ փափուկ լեզուաւը չի կրնար խայթել, ուստի եւ որչափ սխալ գաղափար ունի ռամիկը, երբ նոյն իսկ թունաւոր օձերու լեզուն տեսած աստեն, կը կարծէ թէ թոյնի գործարանն այն է:

134. Հասարակ Իծը (Pelias berus) պզտիկ թունաւոր օձ մըն է, շատ քիչ անգամ 0.60 հրժէն աւելի կ'ըլլայ եւ գրեթէ մատի հաստու-

Թիւնն ունի: Գունակը մոխրագոյն կամ ժանկագոյն է, եւ կոնակին երկայնութեամբը՝ սեւ գօրշ գունով ատամնաւոր շերտ մ'ունի, նոյնպէս երկու կողմն ալ՝ կլոր եւ սեւ գօրշ բծերու շարք մը կայ: Գլխուն մէջտեղն ալ նոյն գունով խաչաձեւ բիծ մը ունի: Փորի կողմը սեւ է եւ ճեր-



Պտկ. 208. Հաս. իծ (1/2):

մակ բծերով: Գլուխը մանր թեփերով ծածկուած է, վերի կզակին վրայ 2 հատ երկայն, սնամէջ ակռաններ կան, զորոնք կրնայ վեր տնկել:


Իժն՝ Ասիա շատ կը գտնուի, իսկ միջին Եւրոպայի մի միակ թունաւոր ձն է. կէս մը լեռանց վրայ քարուտ եւ շոր տեղեր, կէս մըն ալ եղտիւրներու եւ մարգերու բաց եւ արեւոտ տեղերը կը բնակի: Բայց գլխաւորաբար՝ ցած մացառներու եւ արեւու ջերմութենէն տաքցած քարերու քովերը շատ սիրով կը կենայ:

Միայն գրգռուած ատեն կը խածնէ, բայց իւր կարճ եւ պղտիկ թոյնի ակռաներովը կօշկի կաշին ծակել չի կրնար: Խածուածքը՝ ատեղն մը խայթուածքին կը նմանի, բայց շատ վտանգաւոր է, իսկ երբեմն մահացու ալ: Ի մասնաւորի տաք օրերը շատ շուտ կ'ազդէ թոյնը, երբեմն նաեւ քանի մը վայրկեան ետքը: Թունաւորման առաջին հետեւութիւններն են, ստատիկ ցաւ, խածուած տեղը կ'ուռի, տկարութիւն, յանկարծական ուժաթափուլութիւն, գլխու պտպտ եւ մարելիք: Չափահաս մարդիկներու վրայ մեծաւ մասով երկայնժամանակեայ հիւանդութիւններ կը պատճառէ, բայց մահ՝ շատ քիչ անգամ: Խածուածքը թեթեւ եղած ատեն շատ անգամ բաւական կ'ըլլայ միայն վերքը լուսլը, բայց խորունկ եղած ատենը պէտք է վերքը մեծցնելով արիւն վազցնել. զգուշութեամբ արիւնը ծծել գորտ հանել, կամ խորել եւ նոյն անգամը քիչ մը վերէն կապել եւ շուտ մը բժիշկ կանչել:

Հարաւային կողմերը ուրիշ սատր նման՝ բայց սակէ մեծ եւ աւելի վտանգաւոր իժ մըն ալ կայ՝ որ Եղջի-բի կամ Եղջեւոր իժ (Vipera ammodytes) կ'անուանուի, երախքին ծայրը կակուղ եղջիւր մ'ունի: Կ. Պոլսոյ քարուտ այգիներու մէջ թէեւ շատ ցանցաւ, բայց գրտնուած է:

135. Խարամանին կամ Բոթոթաւոր օյը (Crotalus durissus) 1 մ. 60—90 հրճ. երկայն կ'ըլլայ եւ բազկի հաստութեամբ: Կոնակը

մեծամեծ թեփերով ծածկուած եւ ձիթապտղոյ գոյնն ունի, եւ վրան մեծ, սեւ, ճերմակ վերջաւորներով, շեղանկիւն բծեր կան, նոյնպէս փո-




Պտկ. 209. Խաւրամանի (1/2):

ային Ամերիկա ալ ասոր նման օձ մը կայ՝ որ Ահա-որ խաւրամանի (Crotalus horridus) կ'ըսուի:

136. Ափնոցա-որ կամ Հնդիկ օձը (Նայայ) (Naja tripudians) 1 մ. 60 հրժ. երկայն՝ արտաքոյ կարգի վնասակար թունաւոր օձ մըն

րին վրան ալ, բայց ասոնք շատ պզտիկ են: Գլխուն վրայ 2 հատ խորունկ խոռոչներ ունի, պոչին ծայրը՝ եղջերեայ օղակներով կազմուած զանգակիկ մ'ունի, եւ բարկացած ատեն՝ յատուկ եւ հնչող խշուտոց մը կը հանէ:

Հիւսիսային Ամերիկէի ամենէն թունաւոր օձն է, որուն խածուածքը 10—12 բուլէ ետքը կը մեռցընէ: Հարաւ-



Պտկ. 210. Հնդիկ օձ (1/2):

է. եթէ գրգռուի մինչեւ մարմնոյն 3 մասովը վեր կը կանգնի եւ վիզն՝ որ շատ կ'երկնայ, սկաւառակի ձեւով դուրս կ'երկնցընէ: Այս ընելու ատեն վզին վրայ սեւագորշ եւ ափնոցի ձեւով նշան մը կը տեսնուի, եւ


կարծես թէ պզտիկ գլուխը՝ կրկնապատիկ լայն եւ հաւկթաձեւ սկաւառակի մը վրայ կը հանգչի: Որսը ցատկելով կը բռնէ:

Այս անոցաւոր օձը, թէպէտեւ շատ վտանգաւոր է, սակայն եւ այնպէս արեւելեան Հնդկաստանի թռվիչներն՝ երաժշտութեամբ զատիկայ կը հրապուրեն, կը բռնեն, թունաւոր ահուաները կը թափեն եւ այլեւայլ ճարտարութիւններ կը սորվեցընեն: Եգիպտոս ալ ասոր նման անոցաւոր օձ մը կայ որ Քաբէ (Naja Haje) անուամբ ծանօթ է:

ՅԵՂ Բ. ԱՆԹՈՅՆ ՕՉԵՐ (Innocua)

Թոյնի ահուաներ չունին: Գլխաւոր տեսակներն են:

137. Բռն լողալի օձը կամ Լորդոն (Tropidonotus natrix). 1 մ.
30 հրճի չափ երկայն կ'ըլլայ, կռնակը կանանչ կամ կապուտակագոյն



Պտկ. 211. Բռն լողալի օձ (1/3):

գորշ է եւ պզտիկ թեփերով ծածկուած, իսկ փորի կողման մեծ թեփերը, փոփոխակի մէյ մը սեւ՝ մէյ մը ճերմակ են: Կագաթին վրայ ալ մեծ թեփեր ունի, քամակին վրայ 4 կամ 2 հատ մեծ գեղնկեկ ճերմակ բծեր ունի:

7 մետր երկայն է, եւ գլխաւորաբար կամ ջրոյ քովերը եւ կամ ջրոյ մէջ կը գտնուի: Արեւելեան Հնդկաստան եւ Ափրիկէ մասնաւոր Վիշապ օձերու տեսակներ կան, որոնք Պիթոն կ'անուանուին: Շիրտաւոր Պիթոն (Python tigris) ալ հաղիւ 5 մետր երկայն կ'ըլլայ. նոյն իսկ այս տեսակ օձերուն տմէնէն մեծերն ալ՝ ինչպէս երկբարկ Պիթոնը (Python bivittatus), շատ քիչ անգամ 8 մետր երկայն կ'ըլլան, եթէ չգրգռուին մարդուն վրայ չեն յարձակիր, եւ միայն այծեմնիկի մեծութեամբ անասուններ կրնան կլլել: Սովորաբար վիշապ օձերու մեծութեան ու ահաւորութեան վրայ շատ չափազանցութեամբ կը խօսուի: Բայց նաեւ շատ անգամ պզտիկ վիշապ օձեր տրտաբոյ կարգի զօրութեամբ՝ մարդիկներու փաթթուելով զանոնք մուցուցած են:

ՎԱՐԳ 4. ՄՈՂԻՋՆԵՐ (Sauria)

Մողէզները իրարմէ շատ տարբեր մարմին ունին, բայց հասարակօրէն երկայնաձիգ եւ թեփաւոր գլանաձեւ կենդանիներ են. հասարակօրէն 4 կարճ ոտուղներ ունին, որոնցմով կարծես իրենց մարմինը յառաջ կը մղեն քան կը քալեն. ոմանք միայն առջեւի անդամներ ունին, իսկ ոմանք միայն՝ ետեւի. մանաւանդ թէ ոմանք (ինչպէս Սլաիդ)՝ ամենեւին անգամ չունին: Ասոնց կզակներն իրարու միացած են, ուստի եւ ասոնց բերանը շատ չի լայնար, շարժական արտեւանույր ունին: Սրածայր ակուններն ըստ բաւականի մեծ են: Մողէզներն՝ իրենց լեզուին կազմութենէն առեալ 4 ցեղի կը բաժնուին, ա. Հերթալէզոնէր (Հաս. Մողէզ.), Բ. Թանջալէզոնէր (Վիշապակներ), Գ. Նիքալէզոնէր (Գետնառիւծ) եւ Դ. Կարճալէզոնէր (Սղոսկուկը):

ՑԵՂ Ա. ՀԵՐՉԱԼԵՁՈՒՆԵՐ (Fissilingua)

Երկայն, նուրբ, երկձիւղ լեզու մ'ունին, զոր կրնան դուրս երկընցընել: Գլխաւոր տեսակներն են:

139. Հասարակ հողէզը (Խլէզը) (*Lacerta agilis*) երկայնաձեւ՝ եւ մանր մանր թեփերով ծածկուած մարմին մ'ունի, կոնակի կողմը կանաչ կամ մոխրագոյն գորշ, իսկ փորը դեղնագոյն ձերմակ է: Ամբողջ կոնակին երկայնութեամբ՝ բաց գորշ գունով շերտ մ'ունի: Բերնի մէջ պզտիկ, սրածայր ակուններ կան, լեզուն՝ երկայն, բարակ եւ երկուքի բաժնուած է: Չորս երկայն ոտուղներուն ծայրը՝ մագիլներով երկայն մատուղներ ունի: Մարմինը կը վերջանայ՝ շատ երկայն պոչով մը, որ երթալով կը բարակնայ:

Արեւկայ եւ քարուտ տեղեր շատ կը գտնուի: Միջատներով, սարգերով եւ բոտոտներով կ'ապրի եւ իւր արագաշարժ երազութեամբն ամենուն ծառօթ է: Չմեռն՝ երկրիս ծակտիքը կը սողոսկի կը մտնէ: Բոլորովին անփնաս կենդանի մըն է,

Ջերմագոյն երկիրները կը գտնուի նաեւ Կանաչ հողէզը (*Lacerta viridis*), որ առաջին մեծ եւ շատ գեղեցիկ է: Բամբիկը կ'ա-

նուանէ այս կենդանին եւ Թունաւոր կը կարծէ: Շատ մը առասպելներ կը պատմուին:




Պտկ. 213. Հասարակ Մողէզ (Բ. մ.):

Հոս յիշատակելու արժանի է Վարանը կամ Զուռիի Բուլը (*Varanus niloticus*) որ Եգիպտոս կը գտնուի եւ կոկորդիլոսի ձուերուն հետամուտ ըլլալովը շատ օգտակար է:

ՑԵՂ Բ. ԹՈՆՉՐԵԼՆՁՈՒՆՆԵՐ (Crassilinguia)


Մսուտ լեզու մ'ունին, որ շատ չ'երկննար, լեզուին ծայրը սեպաձեւ կլորցած է, ոմանց ակռաները կողմնակի կը բուսնին, իսկ ոմանց՝ ուղղաձիգ: Գլխաւոր տեսակն է:

140. Թռչող վիշապակը (*Draco volans*) վզին տակը պարկ մ'ունի, նոյնպէս մարմնոյն երկու կողմանէ կողքի ոսկրները դուրս ցցուած, եւ մաշկով մը իրարու հետ միացած են, բարձրէն վար իյնալու ատեն ասոնց վըայ կ'իյնայ եւ փնաս մը չի կրեր: Արեւելեան Հնդկաստանի կըղզիներուն վըայ կ'ապրի:




Պտկ. 214. Թռչող Վիշապակ ($\frac{1}{2}$):

Չարատես մողէզներու տակը կ'երթայ Թագաւոր Բախլիւնը (Basiliscus mitratus). գլխուն վրայ բռնկի ձեւով յաւելուած մը՝ կռնակին



Պտկ. 215. Բասիլիսկոս ($\frac{1}{2}$):

վրայ ալ շարժական՝ փշէ սանդղ մ'ունի: Ծանօթ է այս անասնոյն նկատմամբ հիներու ունեցած սխալ կարծիքը:



Պտկ. 216. Իգուան ($\frac{1}{10}$):

ԿԵՆԴՐՆՈՐԴՆԵՐՈՒԹԻՒՆ

Յիշուելու արժանի են Գիլիերը, որոնք մատուռներուն ծայրը մորթէ յաւելուածներ ունին, եւ ասոնց մով նաեւ ողորկ առարկաներու վրայէն ալ կը քայեն եւ վեր կ'ելլեն. նաեւ հարաւային Եւրոպա ալ կը գտնուին:


Վիշապակին նման, բայց անկէ մեծ է Հագաւոր Իգուանը (Iguana tuberculata): Վզին տակի պարկն ատամնաւոր է, եւ ամբողջ կռնակին երկայ-

նութեամբ փշերէ կազմուած սանդղաձեւ ոսկր մ'ունի: Վիշապակի նման երկու կողմը մաշկեակ չունի:

ՑԵՂ Գ. ՆՐՐԱԼԵՂՁՈՒՆԵՐ (Vermilinguia)

Որդի նման երկայն լեզու մ'ունին, որուն ծայրը հաստ եւ կպչուն է եւ շատ կ'երկնայ:

141. ԱՓԵՐԷԼԷ ԳԵՊՆԱՐԻ-ՅՆ (Chamaeleo vulgaris), որ նաեւ Սպանիա ալ կը գտնուի, հինգ մատուրներով մագլելու յարմար ոտուրներ ունի. գլխուն վրայ սանդղի ձեւով յաւելուած մ'ունի, իսկ պոչը փաթթելու յարմար է:




Պտկ. 217. Գեոնաուիւծ (Դ):

Այս կենդանւոյն յատկութիւններն են հետեւեալները. իւր մարմնոյ գոյնը կը փոխէ, (եւ ասոր համար անհաստատ ու փոփոխամիտ մարդը՝ գեոնաուիւծ կ'անուանուի.) իւր մեծ աչուրներէն ամէն մէկը զատ զատ կրնայ շարժել, աչքին բոլորտիքը հաստ եւ բոլորաձեւ արտեւանունք մ'ունի, որ միայն բքին դիմացը բաց է, եւ ասով կրնայ տեսնել կենդանին եւ բոտոտի նման լեզուով իւր սրսը՝ միջատներ, կ'որսայ:

ՑԵՂ Դ. ԿՐՐՃԱԼԵՂՁՈՒՆԵՐ (Brevilinguia)

Գլխաւոր տեսակն է:

142. Սղոսկո-կը կամ Կո-բոյ՝ (Anguis fragilis)՝ օձի մը կը նմանի (բայց օձ չէ): Բարակ եւ գլանաձեւ մարմինն առանց ոտքի է եւ չորս



Պտկ. 218. Սղոսկուկ (Դ/ձ):

կողմը՝ հաւասար, տափակ եւ մանր թեփերով ծածկուած է: Կոնակը մոխրագոյն կարմիր է եւ երբեմն մութ գունով երկայն շերտեր կ'ունենայ, փորի կողմը միշտ վերինէն աւելի մութ է: Աչուրները պզտիկ եւ արտեւանուքով շրջապատած են: Լեզուն կարճ եւ հաստ է եւ քիչ կ'երկնայ:

Սղոսկուկը՝ խոնաւ եւ շքաւոր անտառներ կը սիրէ, կամ երկրիս ծակերուն եւ կամ թափուած տերեւներուն տակը կ'ըլլայ: Միջատներով, խղունջներով եւ որդերով կ'ապրի եւ կենդանի ձագ կը բերէ: Ինչպէս ամէն մողզներուն՝ նոյնպէս ասոր ալ երկայն պոչը դիւրաւ կը փրթի կ'իյնայ, բայց դարձեալ կ'աճի, եւ այս պատճառաւ «դիւրաբեկ օձ» ալ կ'անուանուի:

ՍՈՂԱՑՈՂ ԿԵՆԳԱՆՆԵՐՆԵՐ ՎՐԱՅ ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԳԻՏԵԼԻՔ

Սողապող կենդանիները կամ օւռ-ռանները՝ կաթնատուներու եւ թռչնոց պէս կարմիր՝ բայց պաղ արիւն ունին, հաստատուն ոսկորեայ կազմածք մ'ունին, եւ միշտ թռքով շունչ կ'առնուն: Ասոնց մարմինն եղջերանման թեփերով, եւ ոմանց նաեւ ոսկորեայ վահաններով ծածկուած է. ոմանք ոտք ունին, իսկ ոմանք՝ ոչ: Ասոնց սիրտը թէպէտ 2 նախախորշ ունի, բայց սրտախորշն կատարեալ բաժնուած չէ: Ըստ մեծի մասին այլանդակ եւ անճոռնի ձեւով կենդանիներ են, եւ մեծաւ մասամբ՝ կակուղ պատեաններով չոր ձուեր կ'ածեն, որոնք արեւու տաքութենէն կը թխսին: Չուերէն ելած ձագերը (կորիւնները) ի սկզբան անդ արդէն մեծերուն կը նմանին:



ԴԱՍ Դ. ԵՐԿԱԿԵՆՑԱՂՆԵՐ (Amphibia)

Չորրորդ դասը նշանաւոր է այնպիսի կենդանիներով որ թէ թռչող շունչ կ'առնուն (նախորդ դասերու պէս) եւ թէ խռիկներով (յաջորդ դասերու նման): Մինչեւ հիմայ 2000 տեսակ ճանչցուած է: Երեք կարգի կը բաժնուին:


ԿԱՐԳ 1. ԳՈՉԱՏ ԵՐԿԱԿԵՆՑԱՂՆԵՐ (Batrachia)

Պոչատ երկակենցաղները լեցուն, լերկ կենդանիներ են, 4 հատ աճած եւ հաւասար ոտուրներ ունին: Ասոնց գլուխը տափակ, իսկ երակքը՝ շատ լայն է: Մտուտ լեզու ունին, բայց ոմանց լեզուն կը պակսի: Երեք գլխաւոր ցեղերու կը բաժնուին, ծերութեան ատեն միայն՝ թռչող շունչ կ'առնուն:

ՑԵՂ Ա. ԳՈՐՑԱԳԻՆՆԵՐ (Ranida)

143. Կանանչ Զբա-
գորդը (*Rana esculenta*): Կանանչ գունով է, եւ կը զանազանուի ուրիշներէն՝ կռնակին վրայ ունեցած 3 դեղին գծերով եւ սեւ բծերով:


Արուն 2 հատ գրնդակածեւ փամփուշտ ունի, որոնք երգելու ատեն բերնին երկու կողմը կ'ուռին եւ դուրս կը ցցուին: Նտեւի ոտուրներն ամբողջ լողամորթով իրարու հետ միացած են, եւ առջեւիներէն աւելի երկայն են:



Պատկ. 219. Գորտի կմախք:

- | | |
|------------------|-------------------|
| ա. քիմք ու կզակ. | չ. ուսուսկր. |
| բ. վզի ոսկր. | է. կոնք. |
| գ. բղեղաման. | զ. դաստակ (ոտից). |
| դ. ծղիք. | թ. մատ. |
| ե. տիգք. | յ. սղնաշար: |

Այս գորտն ամեն տեղ մնայուն ջրերու մէջ կը գտնուի: Միջատներով, կողկնջներով եւ որդերով կ'ապրի: Ամէն տեղ աւելի շատ կը գտնուի՝ Թիւրքոյն Ջրագորտը (*Rana temporaria*). ասիկայ աւելի ցամաք քան Թէ Ջրոյ մէջ կ'ապրի եւ կը ճանչցուի քուչքերու քովերն ունեցած մսւթ բծերովը: Երկուքն ալ ձմեռը՝ խորունկ աւազաններու տղմին մէջ




Պտկ. 220. Թխագոյն Ջրագորտ (Գ/Ե):

կը թաղուին, ջրոյ մէջ գունդ գունդ ձու կ'ածեն, եւ ասոնցմէ շերեփիկները (ձագերը) կամ աամկին Գորտան Գորտ ըստծները կ'ելլեն: Ետեւի ոտուրներուն սրունքները կ'ուտուին: — Նոյնպէս երեւելի է իւր ուժգին եւ բառաչելու նման ձայնովը՝ Հիւսիսային Ամերիկէի Եղտորտը (*Rana mugiens*):

144. Ծառագորտ կամ Ծառասիւր Գորտ (*Hyla arborea*): Կոնակը բաց կանանչ, փորին տակը դեղնակեղ ճերմակ է, աչքին ետեւը գորշ գունով գիծ մը կայ որ երկու կողմը մինչեւ վար կ'երկնայ: Ամառն այս գորտը գորշ կ'ըլլայ, իսկ ամէնէն ետքը՝ մոխրագոյն: Արուն՝ վզին տակը փամփուռ մ'ունի, որ կարկաչելու ատեն կ'ուռի: Այս գորտին՝ ինչպէս նաեւ բոլոր միւս գորտերու եւ գորտններու, լեզուին առ-

ջեւի կողմը հաստ է, կզակներուն վրայ խողանաստեւի նման ակռաներ կան: Կարճ եւ լերկ մարմինը չորս ոտուկներուն վրայ կը հանգչի, ասոր մատուկներուն ծայրը կպչուն գնդակ մը կայ, որոնցմով այս գորտը կը մագլէ: Նստելի ոտուկները կէս լողամորթ ունին եւ առջեւի ոտուկներէն աւելի երկայն են:

Ծառասէր գորտերը՝ Թփերու եւ ծառերու վրայ կ'ապրին եւ պզտիկ միջատներուն դարանամուտ կ'ըլլան: Մատուկներուն ծայրի գնդակով տերեւներու եւ նոյն իսկ ողորկ եւ յղկուած ապակիներու վրայ կը կպչին



Պտկ. 221. Ծառասէր գորտ (Բ. մ.):

ու կը կենան: Կպչուն ձուերը ջրոյ մէջ դունդ գունդ կ'ածեն: Չմեռող մէջ կը Թաղուին: Ար կարծուի որ իրենց կարկաչը (հոստ հոստ աղաղակն) անձրեւի նշան ըլլայ, անոր համար իբրեւ «ծորափուշ» ապակեայ ամաններու մէջ կը պահեն եւ կենդանի ճանճերով կը կերակրեն:

ՑԵՂ Բ. ԱՐՋՆԱԳՈՐՑՅԵՐ (Bombinatorida)

Ասոնց լեզուին միայն եղելքներն ազատ են, իսկ լեզուին տակի մասերը միացած ու կպած են բերնին մէջ: Կոծիծնելով լի մորթ մ'ունին, վերի կզակին վրայ ակռաներ ունին: Գլխաւոր տեսակն է:


Արջնագորտը կամ Հրագորտը (Bombinator igneus): Փորի նարնջագոյն դեղին գունովը եւ միաձայն աղաղակովը շատ ծանօթ է:

Ամէն տեղ կը գտնուի:

ՅԵՂ Գ. ԳՈԳՈՆԻԲ (Bufonida)

Նախորդ ցեղին անանոց շատ կը նմանին ասոնք ալ, բայց կզակին վրայ ակոյա չունին: Ետեւի ոտքերուն վրայ լողամորթ չունին: Գլխաւոր տեսակներն են:

145. Հասարակ գլխաւոր (Bufo vulgaris). բոլոր մարմինը մեծ ու փոքր ուռեցքներով ծածկուած է, այս ուռեցքներուն ամէնէն մեծերը՝ ականջին ետեւն են, եւ «Գեղձ ականջաց», կ'անուանուին: Մարմինը տգեղ, անճոռնի եւ գորշ կամ կանանչկեկ մոխրագոյն է. ոտուրները կարճ եւ անհասարակ են:



Պտկ. 222. Հասարակ գետնագորտ (1/2):

Այս դոդոշը՝ քարերու տակ, խոռոչացեալ ծառերու մէջ՝ մուրձ, խոնաւ եւ շուք տեղեր կը գտնուի: Գիշերային եւ առանձնական կեանք կ'անցընէ. կերպարանքը տգեղ, քալուածքը՝ դանդաղ, մորթը՝ տոգոյն եւ զաղիւր է, գրգռուելու ատեն կ'ուռի, ժանտահոտ հոտ մը կը բուրէ, եւ վրայի կոծիծնեքէն՝ ճերմակ կիզիչ հիւթ մը դուրս կու տայ: Թէպէտ եւ ամենեւին վնասակար չէ, սակայն այս իւր վերոյիշեալ յատկութիւններուն համար շատերը կը դարչին ասկէ ու կը հայածեն: Միջատներով, խղուռներով եւ սրգերով կ'ապրի, ասոր համար շատ օգտակար է եւ շատ տարիներ կ'ապրի:

Ամերիկէի ջերմ գաւառներու ծահնային տեղերը կը գտնուի՝ Ամերիկէի կոբոբ (Pipa americana). ասիկա մեծ, անճոռնի եւ տգեղ գետնագորտ մըն է, կռնակին վրայ փեթակի բջիջներու նման ծակափկներ կան, ձուերն ասոնց մէջ կամաց կամաց կ'աճին: Ձուերէն ելած ձագերը՝ մինչեւ որ բոլորովին կատարեալ վիճակի հասնին, իրենց մօրը կռնակին վրայ կը մնան եւ ասդին անդին մէկտեղ կը շրջին:



Պտկ. 223. Կոբոբ (1/2):


ԿԱՐԳ 2. ՊՈՉԱՒՈՐ ԵՐԿԱՎԵՆՑԱՂՆԵՐ (Caudata)

Միայն երկու ցեղ կը ճանչնանք այս կենդանիներէն:

ՑԵՂ Ա. ՍԱԼԱՄԱՆԻԴՆԵՐ (Tritonida)

Սալամանդրները՝ թէ՛ վերի եւ թէ՛ վարի կզակներու վրայ՝ եւ նոյնպէս քիմքին վրայ աճածներ ունին. ասոնց ալ լեզուն կպած է բերնի մէջ. լերկ մորթ, երկայն մարմին եւ երկայն պոչ ունին, ասոնց ոտուքները կարճ, հաստաւոր եւ անկատար կազմուած են: Իրենց խռիկները բոլորովին կը կորսնցընեն, նոյնպէս աչքի արուետանուկներ ունին: Բազմաթիւ տեսակներու մէջէն յիշուելու արժանի է՝

146. Խալսարաքղէփ սալամանդրը (*Salamandra maculata*). Գորտի նման գլուխ մ'ունի, իսկ ուրիշ կողմանէ մողէզի կը նմանի: Լերկ մորթին վրայ բշտիկներ կան, գլխաւորաբար ականջին ետեւը եւ կոնակին եր-



Պտկ. 224. Դս. Սալամանդր ($\frac{1}{2}$):

կայնութեամբը գտնուող այս բշտիկներու մէջէն՝ կիզիչ հիւթ մը դուրս կու տայ: Գոյնը թաւիշի պէս սեւ է եւ վրան՝ մեծ, ականանոն կերպով խիստ դեղին բծեր կան:

Սալամանդրները խոնաւ եւ հոգմանաւոր անտառները՝ քարերու եւ թափուած տերեւներու տակ կը պահուբտին, եւ երկարատեւ անձրեւներէն ետքը ծակերէն դուրս կ'ելլեն եւ միջատներով, որդերով եւ խղունջներով կ'ապրին: Յառաջագոյն սխալմամբ կը կարծէին որ ասոնք չեն այրիւր: Չաղերը վճիտ ջրերու մէջ կ'ապրին:

147. Տրիտոն կամ Սանդրափափ Սալամանդրը (*Triton cristatus*)



Պտկ. 225. Տրիտոն ($\frac{1}{2}$):

կը տարբերի առաջինէն իւր կանանչ գունովը եւ պոչի վրայի աստմանաւոր մորթովը:

Տրիտոններն յստակ եւ մնայուն ջրերու մէջ կ'ապրին. շատ կայտառ կենդանիներ են, ջրոյ մէջ ասդին անդին կը լողան, եւ շուտ շուտ իրենց մորթը կը փոխեն: Եթէ իրենց ոտուքները, պոչն եւ աչքերը կորսնցընեն, շուտ մը դարձեալ անոնց տեղը նոր կ'ունենան: Ասոնց կերակուրն է միջատ, որդ, խղուկջ եւ ուրիշ ջրային կենդանիներ:



Պտկ. 226. Պրոտեւս (Proteus):

Այս ցեղին տակ կ'երթայ Պրոտեւսը (Proteus anguineus) որ մատի մը հաստութեամբ կ'ըլլայ: Գետնի տակ քարայրներու մէջ կը գտնուի:

ՅԵՂ Բ. ԱՆՈՏՆ ԵՐԿԱՆՆՈՒՆԵՐ (Apoda)


Որդի նման, անոտն կենդանիներ են: Յառաջ օձի տեսակ մը կը կարծէին բնապատու մներէն ոմանք այս կենդանիները, բայց որովհետեւ քանի մը թեփ ալ ունին՝ ձկնրու կարգին տակ ալ դասուեցան: Որդերու պէս՝ խոնաւ հողին մէջ կ'ապրին եւ որդերով կը սնանին: Ասոնց կը վերաբերին՝

Կոբելիլները (Coecilia), որոնք գրեթէ իրենց ցեղին մի միակ ներկայացուցիչներն են: Հարաւային Ամերիկա եւ Արեւելեան Հնդկաստան կը գտնուին: Ամենէն նշանաւորն է Կոյր Գեփնալիլը (Coecilia lumbrioides):

ԵՐԿԱՆՆՈՒՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԻՏԵԼԻՔ

Երկալէնցալ կը կոչուին այս կենդանիները, վասն զի թէ ջրոյ եւ թէ ցամաքի վրայ կ'ապրին: Ջրոյ մէջ ապրած ատեն խոլկներով (= ձկան ականջներով) շունչ կ'առնուն, իսկ երբ ցամաք ելլեն՝ այսինքն երբ բողբոլովն մեծնան, կը սկսին թոքով շունչ առնուլ. Կոբելիլ բայց պաղ արիւն, եւ հաստատուն ոսկրէ կմախք ունին (Համեմատե գորտին կմախքը): Երեք խորշով է ասոնց սիրտը: Ո՛չ թեփ եւ ո՛չ ալ վահանակներ ունին, այլ ասոնց մորթը լերկ եւ կպչուն է, մարմինը կամ կարճ եւ լայն եւ առանց պոչի է (Գոբելիլ), եւ կամ երկայնաձիգ եւ պուչաւոր (Սալամանդրներ): Գլխաւորաբար ասոնց մտադրութեան արժանի

բանն այն է, որ պղտիկութեան ատեն բոլորովին ուրիշ կերպարանք ունին, իսկ ծերութեան ատենն ալ՝ ուրիշ: Կպչուն ձուերէն նախ եւ յառաջ շէրեփիկներ կ'ելլեն. ասոնք ձկերու կը նմանին, ոտք չունին, խոիկներով շունչ կ'առնուն եւ ղեկի պէս պոչ մ'ունին եւ ասոր օգնութեամբ կը շարժին: Գորտերու նախ ետեւի ոտուրները կը բուսնին, եւ ետքը առջեւինները, խոիկները կը չորնան, պոչը կ'իյնայ եւ ասով ջրէն դուրս



Պատկ. 227. Գորտի մը փոփոխութիւնը:

- ա. Կը ջուցընէ ձուն՝ որուն մէջ պղտիկ շերեփիկը կայ.
- բ. շերեփիկը դուրս ելած.
- գ. գորտի շերեփիկ վերի կողմանէ.
- դ. նոյնը կողմակի (Պատկ. — դ մեծցուցած).

- ե. գորտի շերեփիկն՝ ետեւի ոտուրներով.
- զ. նոյնը 4 ոտուրներով, պոչն ալ պղտիկցած:

կ'ելլէ անասունն եւ կը սկսի թորով շունչ առնուլ. ինչպէս որ արտաքին կերպարանքը կը փոխուի, նոյնպէս ապրելու կերպն ալ, իսկ շատ անգամ կերակուրն ալ կը փոխէ: Իսկ սալամանդներուն նախ եւ առաջ առջեւի ոտուրները կը կազմուին, ասոնց պոչը կը մնայ, իսկ ոմանց նաեւ խոիկներն ալ: Ուրեմն երկակնեցաղները կատարեալ կ'երաւարանափոխութիւն (Metamorphose) կը կրեն, ինչպէս թիթեռներու վրայ պիտի տեսնենք:




ԴԱՍ Ե. ԶԿԵՐ (Pisces)

Զկերը գրեթէ առանց բացառութեան ջրոյ մէջ կ'ապրին: Իրենց մարմնոյն ձեւովը շատ դիւրաւ կը ճանչցուին: Մինչեւ հիմայ 12.000 տեսակ ձուկ ճանչցուած է: Երկրիս ամէն գօտիներու մէջ տարբեր տեսակ ձկեր կը գտնուին: Ծովեզերքները եւ ջրանցքներու մէջ աւելի բազմաթիւ տեսակներ կը գտնուին, քան բաց ծովու մէջ: Վեց կարգի կը բաժնուին, որոնց տակ շատ մը յեղէր կան:

ԿԱՐԳ 1. ԿՐԿՆԱՇՈՒՆԶՔ (Dipnoi)

Կրկնաշունչ կ'անուանուին, վասն զի նախընթաց դասի կենդանեաց պէս թէ թորով շունչ կ'առնուն եւ թէ խռիկներով. բայց իսկ ձուկ են, վասն զի թեփերով ծածկուած են, եւ իրենց մարսողութեան գործարանները ձկան գործարաններուն հետ նոյն են: Գլխաւոր տեսակներն են:


148. Քարաճորը (*Lepidosiren paradoxus*) թեփերով ծածկուած է, եւ կռնակին վրայ մինչեւ իւր տտուններկայն լողարան ունի, կուրծքի եւ փորի լողարանները բարակ դերձանի կը նմանին: Մարմնոյն ներսի կողմը՝ ձկան խռիկն զատ՝ նաեւ ուրիշ երկու հատ պարկ ունի, որոնք



Պտկ. 228. Քարամոր ($\frac{1}{10}$):


Թորքերու գործողութիւնը կը կատարեն, եւ ամառը՝ չոր տղմերու մէջ կը թաղուի եւ այս երկու պարկերու միջնորդութեամբը շունչ կ'առնու:

կ'որոացուի: Հատ փուշ ունի եւ կռնակի առաջին լողարանովը շատ
դիւրաւ կը վերաւորէ:




Պտկ. 230. Պերկէս ($\frac{1}{2}$):

150. Հիլաշո-կը (Lucioperca sandra) երկայնաձիգ է եւ կռն-
կաձկան կը նմանի: Մեծ, բռնող ակռաներ ունի, եւ կապարի գունով
կռնակին վրայ
շատ մը թուխ
շերտեր կան,
երկու կողմն եւ
փորը՝ արծա-
թափայլ սպի-
տակ է: Թե-
փերը մանր են:



Պտկ. 231. Շիղաձուկ ($\frac{1}{2}$):

Միջին Եւրոպայի անոյշ ջրայ համեղ ձկերէն մէկն է: Գլխաւորաբար
Հունգարիայի ծովակներուն մէջ բաւական մեծ կ'ըլլայ եւ ձմեռը սա-
ռայցներու տակէն ուռկաններով կ'որոան:



Պտկ. 232. Արքայաձուկ ($\frac{1}{2}$):


Միջերկրական եւ Ատլանտեան ծովերուն խայծոտն ձկերն են: Լա-
բրաշ (աճ. լեփէի) (Laprax lupus) եւ Արաշո-կը կամ Ժգռաշո-կը

(տճ. բարբուռիա) (*Mulus barbatus*). Կենդանի եղած ատեն բոլորովին կարմիր կ'ըլլայ, իսկ փոքրին կողմը արծաթագոյն կը փայլի. կ'ըսուի թէ հին ատենները շատ մեծագին կը գնուէր, բայց գինը քիչ մը չափազանցուած է: Այս ձուկը սատկելու ատեն գոյնը կը փոխէ, Հռոմայեցիք՝ դիւստորաբար այս տեսարանով զուարճանալու համար շատ կը պահէին այս ձուկը:

ՑԵՂ Բ. ՎԵՐՏՈՒՐՆԵՐ (*Cataphracti*)

Վերտուր կը կոչուին այս ձկերը, վասն զի ասոնց գլխուն վրայ սաղաւարտի ձեւով շարուած՝ ոսկրէ դրուագներով ծածկուած է:


151. Եւրոպայի հաւօն-լը (*Dactylopterus europaeus*). գլուխը վերտաւոր է, իսկ լողարաններուն վարի մասը հողմահարի ձեւով է: Փորի լողարանները՝ նեղ են:



Պտկ. 233. Եւրոպայի հաւձուկ (1/2):

Ծիջերկրական ծովն՝ այս թռչող ձուկէն շատ կայ: Յափշտակիչ ձկերէն հալածուած ատեն՝ իւր թռչող թեւի նման կուրծքի լողարաններով ծովու երեսէն քանի մը մետր բարձր կը թռչի, բայց լողարանները շուտ չորնալուէն պատճառաւ, արագութեամբ դարձեալ ծով կ'իջնայ: Հնդկաց Ուկկիանոսն ալ ասոր նման ձուկ մը կը գտնուի, այսինքն Արեւելեան հաւօն-լը (*Dactylopterus orientalis*):


Հաւձկան մերձաւոր մէկ սեռն է՝ Ծիջեւն-լը (տճ. կըրլանգը) (*Trigla hirundo*). բոլորեւ-րոպայի ծովեզերքը շատ կը գտնուի եւ յարգի ձուկ մըն է. ջրէն դուրս ելլելու ատեն յատուկ ձայն մը կը հանէ. կուրծքին լողարաններն երկայն են եւ կրնայ անոնց օգնութեամբ ջրոյ վրայէն քիչ մը վեր բարձրանալ:



Պտկ. 234. Արեւելեան հաւձուկ (1/2):

Այս ձկներուն կը վերաբերի նաեւ Կադուպը (կամ գետի «կապուտ ձուկը») (*Cottus gobio*). այս ձուկը՝ քարերու ծակերուն մէջ կ'ածէ ձուերն, եւ քաջութեամբ ու յարատեւութեամբ ամէն յարձակման դէմ զանազն կը պաշտպանէ:

152. Ուփէյո-կը (աճ. դիւրգէր բալըղը) (*Chrysophris aurata*) արծաթի պէս փայլուն մոխրագոյն մարմին մ'ունի, աչուրներուն վրայ




շքեղ ոսկեգոյն շերտ մը կայ, նոյնպէս երկու կողմերն ալ բազմաթիւ ոսկեգոյն շերտեր: Կոնակի լողարանը միայն է (բաժնուած չէ), եւ ամէն մէկ կզակին վրայ վեց վեցական ամուր աւաններ ունի:

Պտկ. 235. Ոսկեծուկ (1/2):

Միջերկրական ծովը կը գտնուի, յարգի ձուկ մըն է, պատենաւոր կենդանիներով կ'ապրի, եւ իւր գեղեցիկ գունովը դիւրաւ կը ճանչցուի: Հոն կը գտնուի դարձեալ Հասարակ Ժուր-ը կամ Արաբիոյ-կը (*Dentex vulgaris*), վերինին շատ կը նմանի եւ արտաքոյ կարգի շատակեր է:

Ցեղ Գ. ԹԻՒՆԻՅՆԵՐ (*Scomberoidei*)

153. Թիւնիկը (աճ. ուսկումրու) (*Scomber scombrus*) արտաքոյ կարգի մանր թեփերով ծածկուած է: Կոնակի կողմը մութ կապոյտ գունով կը փայլի եւ վրան սեւ գծեր կան, փորին կողմը՝ արծաթագոյն սպիտակ է: Կոնակի առաջին լողարանը՝ երկրորդէն շատ հեռու է, եւ




Պտկ. 236. Թիւնիկ (1/2):

այս երկրորդին ետեւը՝ ինչպէս նաեւ յետսակողման լողարանին ետեւը 5 հատ փոքրիկ՝ իրարմէ բաժնուած թեւեր կան:

Եւրոպայի ամէն ծովերուն մէջ կը գտնուի, Հոլանդայի, Անգղիայի եւ Գաղղիայի համար շատ կարեւոր է այս ձուկը: Ամէն տարի ամառը գաղթելու ատեն միլիոններով կ'որսան. ծանօթ է Բոսփորի թիւնիկ-

որսութիւնն. այս ձուկը աղած կամ չորցած (չիրոյ) ալ կ'ուտուի: Հին ասեանը՝ Թիւնիկներէ *garum* անուամբ շատ յարգի կերակուր մը կ'եփէին:

154. Թիւննուր (աճ. փալամութ) (*Thynnus vulgaris*) մեծ ձուկ մըն է, որ երբեմն 5 մետր երկայն եւ 150—200 քիլոգրամ ծանր




Պտկ. 237. Թիւննուս (1/2):

կ'ըլայ: Կռնակի 2 լողարանները քովէ քով են, երկորդ լողարանին՝ ինչպէս նաեւ յետսկողման լողարանին ետեւը 8—9 պզտիկ թեւեր կան:

Միջերկրական եւ Սեւ ծովու մէջ խմբերով՝ երբեմն մինչեւ հազար հատ մէկտեղ, կ'ապրին: Բայց ափսոս որ իւր համեղ միսը շատ շուտ կ'ապականի: Ասոր որոտրգութիւնը՝ Բոսփորի, Սարգիսիայի եւ Սիկիլիայի համար անհրաժեշտ կարեւոր է եւ զանազան կերպով կ'որսան, թէ ուռկաններով եւ թէ ցանցերով, արձողով եւ այլն: Դաղմատիայի ծովեզերքը նաեւ առանձին առանձին երեքժանիներով եւ կամ կարթով ալ կը բռնուին:


155. Եփնիէի կամ Նաաակալը (*Echeneis remora*) վերի կողմը տափարակ գլուխ մ'ունի, որուն վրայ հակթաձեւ՝ 10 շեղ գծերէ



Պտկ. 238. Նաաակալի զլուխը:

կալ անոնը: Այս իւր կպչելու յատկութեամբը կրիայ որսալու կը գործածեն զինքը Ատլանտեան ծովու ձկնորսները. կը կապեն եւ ծովու մէջ կը թողուն, ձուկը կ'երթայ, այնպէս ամուր կը կպչի կրիային, որ կրնան մինչեւ նաւ քաշել բերել, առանց կրիայէն բաժնուելու:

156. Բաճ Գորշյուղ (Lophius piscatorius) որոշաց Կորդի մեծ, լայն եւ սափակ գլուխ մանր, իսկ բերանը շատ կը բացուի եւ որանայ սկզբներ անի: Մորմինը մեծ գորշ եւ շատ բարակ է եւ շատ աչքի կը զարնէ. մանուկները երբ խախնուա գորշը առնցնէ:



Պտկ. 241. Գորտնուկ (Մս):

Պարի կզակին եւ մարմնոյն երկու կողմը բազմաթիւ շարժական բլթակներ կան: Արորնքի լողարանները հողմահորի կը նմանին եւ կոթանի պէս բաժն մ'ունենան: Առնակի առաջին լողարանը՝ երեք չորս հաս զատ զատ փշերէ կազմուած է:

Այս ագեղ եւ ծանրամարմին ձուկը ծովուն յառաւել ծովոյին անկոց մէջ կը գտնուի, հոն իւր սրսին դարանակաւ կ'ըլլայ, զորոնք իւր շարժական թելերովը կը հրապուրէ: Շատ շատակեր է, բայց ձկնորսաց աչքին յարդի չէ: Եւրոպայի գրեթէ ամէն ծովերը կը գտնուի: — Ասոր շատ կը նմանի Կորճորիոյն փոքր (աճ. ինքորփիւդ) (Cottus scorpius) որ իւր գիւրաբեկ փշերովը շատ վտանգաւոր է, վտան զի շատ գիւրաւ կը վիրաւորէ:


Բ. Սորորաքաթանոմ Կակղաթեւեր (Anacanthini):

Կակղաթեւ ձկներն ոսկրէ կմախք ունին. ասոնց ամենուն լողարանները՝ նոյն իսկ կռնակի լողարաններն ալ՝ կակուղ, ճիւղացեալ եւ վերի ծայրը փնջաձեւ բաժնուած ճառագայթների ունին: Անոյշ ջրոյ ձկանց մեծ մասն ասոնց կը վերաբերի: Գլխաւոր ցեղերն են:

ՅԵՂ Ա. ՓՐՓՐՈՒԿՆԵՐ (Gadoidei)

Փրփրուկները 2—3 փափուկ ճառագայթներով կոնակի լողարաններ եւ լորձնոտ մորթ մը ունին. փափկաթեւ ծովային ձկեր են:

157. Փրփրուկը կամ Բրաշուկը (աճ. Բասալա) (Gadus morrhua) հասարակ ձկան կերպարանքն ունի, 3 հատ կոնակի, 2 հատ ալ յետասկողման լողարան ունի, եւ վարի կզակին ծայրէն ալ վար կախուած



Պտկ. 242. Փրփրուկ (1/12):

մօրուային թեւ մը կայ: Փորի լողարանները սովորականէն դուրս՝ կուրծքի լողարաններէն առաջ են: Գոյնը դեղին մոխրագոյն է եւ վրան գորշ բծեր կան:

Հիւսիսային Եւրոպայի եւ Ամերիկէի ծովերը բազմութեամբ կը գտնուի: Այս ձուկն որսալու համար ալ ամէն տարի Գաղղիայէն, Անգլիայէն եւ հիւսիսային Ամերիկայէն բազմաթիւ նաւեր, գլխաւորաբար դէպ ի նոր ֆունդլանդի առաջակողար կը ղրկուին: Միայն հոն ամէն տարի 100 միլիոն քիլոգ. է աւելի փրփրուկ կը բռնուի:

Փրփրուկին մօր (ինչպէս նաեւ բոլոր Եւրեթիանոսի մօր) խաւեայ է եւ զիւրաւ մօտ մօտ կը բաժնուի, թէ թարմ, թէ չոր եւ թէ աղացած կ'ուտուի եւ ճարպոտ լեարդէն ալ «Չիւն Էլ» կ'ընէ, որ իբրեւ գեղ շատ յարգի է: Ուրիշ ասոր նման՝ ուրիշ Եւրեթիանոսի ալ կան, որ վաճառականութեան մէջ զանազան անուններ ունին: Բաւալ կ'անուանուի չորացուածը, Լեփեդուս աղացած ու չորացուածը: Այս ձուկն արտաքոյ կարգի շատ կը բազմանայ, որովհետեւ մի միայն փրփրուկի մը ձուակի՞կը քանի մը միլիոն կիթ ունի:


ՅԵՂ Բ. ՏԸՓԱՎԱԶԿԵՐ (Pleuronectae)

Տափակ մարմին մ'ունին, եւ ասկէ կ'անունն իրենց անունը, շեղանիստ մարմին մ'ունին, երկու աչուքներն ալ աւելի մէկ կողմը ուղղուած են: Աչքերուն գտնուած կողմը գունաւոր է, իսկ միւս կողմը սոժգոյն: Գլխաւոր տեսակներն են:

158. Լեդուսայուկը (աճ. դիւ բալըղ) (Solea vulgaris): Ասոր մարմինն երկու կողմանէ խիստ տափակցած ճնշուած է, գլուխն ալ այնպէս ձեւ մ'առած է, որ երկու աչուքներն ալ մէկ կողմն են: Գլխուն վերի կողմը գմբեթաձեւ եւ մութ գունով է, իսկ տակի կողմը՝ տափակ եւ ճերմակ: Կոնակի լողարանը բոլոր մարմինը կը պատէ, իսկ յետաս-

կողման լողարանն ալ՝ փորը, բայց կռնակն ու փորը ուրիշ ձկանց պէս մէկը վեր միւսը վար չէ, այլ մէկը աջ միւսը՝ ձախ: Աս ձկերն՝ իրենց տափակ եւ լայն կողմովը կը լողան, ասոր համար Պառակալող ալ կ'ըսուին:

Եւրոպայի ամէն ծովերու մէջ աւագուտ եւ խոնաւ փուկներ կը գտնուի, բայց ամէնէն աւելի ծովուն յատակը կը սիրէ: Տափակաձկանց միւս շատ յարգի է: Ուրիշ մեզի ծանօթ տեսակներն են. վահանոյւնը




Պտկ. 243. Հասարակ տափակածուկ (Ն.Ս.):

(տճ. քալքան բալըը) (*Rombus maximus*): Հասարակ Գառնոյնը (*Platessa vulgaris*) եւ Հայ Գառնոյնը (*Hypoglossus maximus*) որ մեծ ձուկ մըն է եւ 1—200 քիլոգր. կը կշռէ. այս ամէն ձկերը գլխաւորաբար Հիւսիսային եւ Արեւելեան ծովերը կը գտնուին:

159. Թռչող յոնիկ (*Exocoetus volans*) փաթրիկ ձուկ մըն է, կուրծքի լողարաններն արտաքոյ կարգի երկայն են:

Ատլանտեան Ովկիանոսին տաք կողմերը կը գտնուի, եւ բոլոր Թռչող ձկանց մէջ ամէնէն լաւ Թռչողն է: Սակայն ասոր ալ Թռչելու զօրութիւնն երեւելի բան մը չէ, վասն զի ամէնէն աւելի միայն 10 մէտր կրնայ բարձրանալ, 130 մէտր ալ ճամբայ ընել. օդի մէջ հազիւ կէս վայրկեան կրնայ կենալ: Շատ անգամ անցնող նաւերու տախտակամածին վրայ կ'իյնայ, եւ ճամբորդներու հաճոյական որս կ'ըլլայ:




Պտկ. 244. Թռչող ձուկ (Ն.Ս.):

ՑԵՂ Գ. ԾԵՐՈՒԹՆԵՐ (Siluroidei)

Գետի ձկեր են, լերկ մորթ մ'ունին, ոմանք միայն ոսկրէ վահանակներ ունին իրենց մարմնոյն վրայ, եւ բերնի քովերը մօրուակերպ թեւեր: Գլխաւոր տեսակներն են:

160. Շաքոնիլ կամ Սիլուրը (*Silurus glanis*) Թառափէն ետքը՝ Եւրոպայի ամենամեծ գետային ձուկն է: Գտնուի շանաձուկն կրնայ

անուանուիլ, որովհետեւ 1—2 մետր երկայն կ'ըլլայ եւ 200—250 քիլոգրամ ծանր կը կշռէ: Բոլորովին անթեփ է, կռնակի կողմը մուժ կանանչ, իսկ տակը՝ ճերմակ: Գլուխը մեծ ու տափակ է, երակքը՝ լայն, որուն վրայ բազմաթիւ սանտրաձեւ ակունքեր կան, եւ այս երակս



Պտկ. 245. Շաքուծ (1/16):

քին բոլորաթիւը 4 հատ կարճ՝ 2 հատ ալ երկայն եւ դէպ ի ետեւի կողմը ծռած խողանաձեւ թելեր կան: Մարմինը՝ լեւրկ եւ դէպ ի պոչն երթալով կը բարակնայ. եւ կռնակին առջեւի կողմը յառաջացեալ փոքրիկ լողարան մ'ունի, ընդհակառակն յետսակողման լողարանը շատ երկայն է եւ մինչեւ տանաթեւը կը հասնի:


Հաբուժը խիստ շատակեր յափշտակիչ ձուկ մըն է, Դանուբի եւ ուրիշ քանի մը լճերու խորունկ եւ հանգաւտ ծոցերը՝ տղմի մէջ կը պահուրտի, եւ խողանաձեւ թելերը խաղընեղով ձկեր կը հրապուրէ, բայց դի ալ կ'ուտէ, նաեւ լողացողներուն ալ վտանգ հասցուցած է: Միայն մանրշաբուժներու միւր համեղ կ'ըլլայ, իսկ մեծերուն միւր կարծր է եւ շատ յարգի չէ: Եգիպտոսի Թափէջա-ցիւ շափաւին ալ (*Mala-pterurus electricus*) ասոր մէկ մերձաւոր տեսակն է:

ՅԵՂ Դ. ԺԱՅՈՒՆԻԻ (Cyprinoidei)

Գետային ձկեր են, որ ըստ մասին տնկային՝ եւ ըստ մասին կենդանական նիւթեր կ'ուտեն: Ասոնց լողափամփուշան երկու մասի բաժնուած է, ետեւի մասին մէջն է օդոյ խողովակը (տես Պատկեր 266): Տկար եւ ատամնաւ կզակներ ունին, իսկ երակքին ներքին ոսկրներուն վրայ՝ ընդհակառակն, մեծ ակունքեր ունին: Գլխաւոր տեսակներն են:

161. Գէրային Ծաթանը (տճ. սազան բայլըղ) (*Cyprinus Carpio*): Կռնակը բարձր եւ կոր է եւ մեծ թեփերով ծածկուած: Գոյնը կապուտակագոյն կանանչ, իսկ երկու կողմն ու փորը՝ դեղնագոյն: Վերի

կզակին վրայ 4 հատ խողանաձեւ թերեր ունի: Կոնակը միայն լողարան մը կայ, որուն առաջին ճառագայթը՝ ամուր, խայթոցաձեւ ու ատամնաւոր է, իսկ միւսները՝ կակուղ, բազմաճիւղ եւ ծայրերը փնջաձեւ բաժ-



Պտկ. 246. Ծածան (C¹/₁₂):

նուած: Կուրծքի լողարանները փորի լողարաններէն յառաջ են. պոչին լողարանն երեքժանիի ձեւով է, յետսակողման լողարանները՝ կարճ են:

Ամենէն յաճախ գտնուող՝ անոյշ ջրոյ ձկերէն մէկն է, կը սնանի փափուկ կակուղ տնկերով, աւազաններու սեւ տղմով, որգերով եւ միջատներով: Բուն հայրենիքն է հարաւային Եւրոպայի մնայուն եւ դանդաղ հոսող ջրերը, բայց որովհետեւ դիւրաւ սնունդ կը գտնէ ու շատ կ'աճի, անոր համար կամաց կամաց Եւրոպայի հիւսիսային կողմերն ալ տարածուած եկած է: Աւազանի ձկնորսութեան գլխաւոր առարկան է, երբեմն 1 մէտր երկայն կ'ըլլայ եւ 20 քիլոգ. կը կշռէ: Ծածանը շատ տեսակներ ունի, որոնց Սեփայր Ծածան կամ Հփայ Ծածան կ'անուանուին. ասոնց միաշար թերեր ունին. կան նոյնպէս Անիէ Ծածաներ, որոնց մարմինը մերկ եւ անթեփ է:


Եւրոպայի գետերու, աւազաններու եւ լճերու ձկանց մեծագոյն մասը՝ իրենց ատամնաւոր կզակներովը, երախքին ատամնաւոր սակրովը, իրենց սննդգեամբը, ապրելու կերպսն եւ արտաքին ձեւով Ծածանի կը նմանին: Միջին Եւրոպայի ծովու ձկանց պակասութիւնը կը լեցնեն անոյշ ջրոյ ձկերն, որոնց կէսէն աւելին ծածանի նման ձկեր են: Ամենէն մեծերն՝ որոնք երբեմն 0.30 հրէ.էն աւելի երկայն կ'ըլլան, հետեւեալներն են. Տէլին (Cyprinus tinca), Կարփայն (Cyprinus barbatus) եւ Բարփայն (Cyprinus alburnus) եւ ճերմիկ Իսթրիականը:

Ծածանազգի օտարերկրեայ ձկերէն մէկն է ճերմակ (Cyprinus auratus), իբրեւ զարդ աւազաններու եւ ապակիէ ամաններու մէջ կը պահուի:

ՑԵՂ Ե. ԼՍՊԻՆԵՐ (Salmones)

Այս ցեղին ձկանց լողափամփուշտը պարզ է (երկու մասի բաժնուած չէ), կոնակի լողարանին ետեւը ճարպէ լողարան մ'ունին: Յափը տակող ձկեր են եւ շատ համով: Գետերու մէջ կը գտնուին: Գլխաւոր տեսակներն են:


162. Սաղմոն կամ Լոստի (տճ. սալամոն բալդը) (*Salmo Salar*):
Ծնօտը, քիմքը, լեզուն եւ կողորդն՝ ամուր են, դէպ ի ետեւ ծռած ալ-
ռաներ ունի, կոնակի վրայ երկու լողարան կայ, որոնց առաջինն՝ որ
բուն լողաթեւն է, փորի լողարանին վրայ է, իսկ երկրորդը՝ պզտիկը, յետ-



Պտկ. 247. Լոստի (1/10):

սակողման լողարանին վրան է: Կոնակի գոյնը մութ կապույտ կամ մո-
խրագոյն է, երկու կողմերն եւ փորն արծաթափայլ կը շողան. գլխուն,
կոնակին եւ պառակներուն վրայ սեւ բծեր կան:

Լոստին բուն ծովային ձուկ մըն է, որ կիթ ձգելու ատեն՝ Արեւե-
լեան եւ Հիւսիսային ծովերէն գետերը կու գայ, եւ ջրվէժներու եւ
ասոր նման արգելքներու յաղթելով մինչեւ պզտիկ առուակները կու
գայ կը հասնի: Կարմրագոյն միսը՝ բայց գլխաւորաբար Հռենոսի սաղ-
մոնին միսը, շատ յարգի է: Զարմանալի կերպով Դանուբի մէջ չի
գտնուիր: Ասոր փոխարէն՝ Դանուբ ուրիշ տեսակ սաղմոն կը գտնուի,
որ Հո-+ (*Salmo hucho*) կ'ըսուի, շատ ծանօթ է՝ երկայն գլխով
եւ ճերմակ մտով: Այլեան լեռանց լիճերուն մէջ կը գտնուին Կարճա-
խայր սաղմոն (*Trutta lacustris*) մեծ տեսակներն, որոնց միսը շատ ա-
խորժահամ է: Սաղմոնի տեսակ պզտիկ ձկներն են. Փարեզը, Կարճա-
եւ Զարճալը: Բաւ է Բարեղին (*Salmo fario*) կոնակի կողմը ձիթապտղոյ



Պտկ. 248. Փարեզ (1/10):


կանանչ, երկու կողմերը՝ գեղնագոյն կամ մեխրագոյն են, որուն վրայ՝
կարմիր կամ թուր գունով բազմաթիւ կլոր բծեր կան: Ամենէն աւելի՝
ցուրտ, յստակ եւ արապահոս ջրերու մէջ կը գտնուի եւ գլխաւոր կե-
րակուրը ճանճ է, զոր շատ յաջողութեամբ ջրէն դուրս ցատկելով կ'որ-
սայ: Ուտի եւ այս ձուկն որսալու ատեն իբրեւ կեր՝ արուեստական

ճանճեր կը գործածուին: — Ալյեւն կորիս-կը (Salvo salvellinus)՝ Ալյեւան ընկերու՝ համար եւ գեղեցիկ ձկներէն մէկն է: — Ջաթ-կը (Salmo thymallus)՝ սովորաբար բուն փարեղներու հետ ընթանց առուակներն ընկերաբար կ'ապրի, եւ շատ յարգի է:

ՑԵՂ Զ. ԿԵՆԿԱՅԵՐ (Esoces)

Տափակ գլուխ մ'ունին, բերնի մէջ ամուր ակուններ: Ճարպէ լողարան չունին, իսկ կռնակի լողարանն պոչին քովերն է: Գլխաւոր տեսակն է:

163. Կռնկայո-կը կամ Գայլայո-կը (տճ. թուրքա բաղըը) (Esox lucius) շատ շատակեր ձուկ մըն է, մարմինն՝ երկայնաձիգ եւ գլանաձեւ, գլուխը՝ տափակ, կզակներուն եւ քիմքին վըայ՝ մեծ, անհասարակ մեծութեամբ դէպ ի ետեւը ծռած սրածայր ակուններ ունի:



Պտկ. 249. Կռնկաձուկ (1/12):

Պանր թեփերով ծածկուած է, կռնակի կարճ լողարանը՝ յետսակողման լողարանին վըայ է, ընդհանուր գոյնը՝ մոխրագոյն կամ թուխ կանանչ է, իսկ տակը՝ ճերմակ:

Գայլաձուկն ամէն տեղ անոյշ ջրերու մէջ կը գտնուի, եւ չէ թէ միայն որդ, ջրային միջատներ, ձուկ եւ անոնց ձուերը, կրիայ, օձ եւ մուկ կ'ուտէ, այլ նաեւ սեւ փարփարներ, բազեր եւ օագեր ալ ջրոյ տակը կը քաշէ. եւ լողացողներն խածնելով վիրաւորելը՝ լսուած բան է:


Մի միայն մեծ կռնկաձուկ մը ծածաններու աւազանին մէջ մեծ աւեր կրնայ գործել: Անոր համար կռնկաձկերը մասնաւոր աւազաններու մէջ կը պահուին, եւ ասոնց մէջ մանր եւ հասարակ ձկներ ալ կը դնեն, որպէս զի կռնկաձկան կեր ըլլան: Կռնկաձուկը՝ 1—2 մետր երկայն կ'ըլլայ, եւ 25—30 քիլոգրամ ծանր կը կշռէ:

ՑԵՂ Է. ՑԼԱՅԻՆԵՐ (Clupeidi)

Միայն մէկ հատ կռնակի լողարան ունին, մեծ եւ դիւրաթափ թեփեր. փորի կողմը՝ սղոցաձեւ անկիւն մը կը կազմէ: Մի եւ նոյն տեղը բազմաթիւ տեսակներ մէկտեղ կը գտնուին: Գլխաւոր տեսակներն են:

164. Ծովային Կաթիլ (տճ. բինգա բաղըը) (Clupea harengus): Մարմինն երկու կողմանէ խիստ ճնշուած տափակ-ցած է, մեծ եւ դիւրաքակ թեփերով ծածկուած է, կռնակի կողմը մութ

կապոյտ-մոխրագոյն, իսկ տակը՝ արծաթագոյն սպիտակ է: Ծնօտին, քիմքին եւ լեզուին վրայ բարակ ակուսներ կան, որոնք շոշափելու առան կը զգացուին աւելի՝ քան կը տեսնուին: Առնակի կարճ լողարանը գրեթէ մարմնոյն ճիշտ մէջտեղը՝ փորի լողարանին վրայ է:




Պտկ. 250. Տառնիս (1/3):

Հարինգն ահագին բազմութեամբ Հիւսիսային Եւրոպայի խորքը, բայց նաեւ Վանայ ծովային ծն կը գտնուի: Այլ թիւ տառն (Ապրիլ, Մայիս եւ Յունիս ամիսները) խորունկէն վեր կ'ելլէ կը սկսի ահագին բազմութեամբ Ուկրաինայի երեսն երեւալ, եւ Նորուեգիայի, Անգլիայի եւ Գաղղիայի մէջտեղը ծանծաղունները կ'երթայ: Ճամբորդութիւնն երբեմն մղոններով երկայն կ'ըլլայ, եւ այնպէս խիտ առ խիտ կը քալեն, որ կրնայ մարդ զատնը ձեռքով բռնել եւ ամաններով ժողովել: Ասոնց կիթերէն եւ թափուած թեփերէ ծովուն երեսը պղտոր կ'երեւայ: Այլ թ ձգելէն ետքը բոլորովին անհետ կ'ըլլան, որովհետեւ չէ թէ ծովուն երեսէն, այլ ըստ բաւականի խորունկէն իրենց սովորական բնակութեան տեղերը կը դառնան: Չկայ ձուկ մը, որ այնչափ բազմութեամբ գտնուի եւ այնչափ շատ որսացուի, ինչպէս հարինգը: Ամէն տարի Հոլանդայէն, Նորուեգիայէն, Անգլիայէն, Գաղղիայէն եւ Գերմանիայէն ամբողջ նաւատորմներ կը ղրկուին այս ձկան որսորդութեան, եւ հազարաւորներ կը զբաղին զատիկայ որսալու, պատրաստելու եւ այլեւայլ տեղեր խաւրելու: Բայց շատ անգամ ծովային տառններն իրենց ճամբորդութեան տեղը կը փոխեն, եւ քանի մը ծովեզերեայ տեղեր՝ արդէն այնչափ հալածուելով եւ բռնուելով զգալի կեր-

պով քիչցած են: Հարինգը չէ թէ միայն թարմ կ'ուտուի, այլ Ախլ-հէլմ Բոյկէլ Հոլանդացւոյն հնարած կերպովը՝ նախ եւ յառաջ խռիկ-ներն եւ փորոտիքը կը հանեն, յետոյ ծովու ջրով կը լուան, աղաջրի մէջ կը թողուն, ետքէն աղի հաստ կտորներով կ'աղեն եւ յատուկ տակառակներու մէջ լաւ մը գոցելէն ետքը աշխարհիս ամէն կողմը կը շրկեն:

Միջերկրական ծովը շատ մը հարինգի մանր տեսակներ կան, սրոնք կ'անուանուին Անյրո-ի (տճ. անշա բալըղը) (*Engraulis encrasicolus*) եւ Հըյո-ի կամ Աշիեր (տճ. սարգելա) (*Clupea sardina*) եւ ամենուն



Պտկ. 251. Անձրուկ (1/2):

ծանօթ են. նոյնպէս բազմութեամբ քով քով կը գտնուին եւ հարինգներու պէս առատ կ'որսացուին եւ ամէն տեղ կը շրկուին: Անձրուկները սովորաբար ճիշդ հարինգներու պէս տակառներու մէջ կ'աղուին, բայց առանց գլխոյ, իսկ մանրիկ եւ փափուկ հրձուկներն օգտինս թիթեղէ տփերու մէջ՝ ձէթով կը պահուին եւ ասոնցմով մեծ վաճառա-կանութիւն կ'ըլլայ:

Գ. Սորոսաթաթանոմ Անտեսաններ (Apoda):


Ասոնցմէ երկու գլխաւոր ցեղ կը ճանչնանք Թաֆէլեցո-յի Ենթե-ղէաներ եւ Օյաճիեր:

ՑԵՂ Ա. ԹՄՐԵՆՈՒԹԻՆՆԵՐ (Gymnotini)

Հատ նշանաւոր են այս ձկներն իրենց թմրեցրնելու զօրութեամբ. ծանրութեան երրորդական մասը կը կացուցանէ իրենց ելեկտրական գործարանը: Բաց կարմիր գունով վանգուած մըն է՝ երկու մասէ բաղ-կացած, անասնոյն փորի կողմը կը գտնուի, եւ սրբանին վարի կողմէն սկսեալ մինչեւ պոչին ծայրը կ'երկարի: Հատ մը խաւիխաւ շերտերէ կը բաղկանայ. ասոր մէջը 200ի չափ ջիղ կը տարածուի: Եւ ասով ելեկտրական հարուած կու տան այս ձկները: Գլխաւոր տեսակներն են:

165. Թաֆէլեցո-յի Ենթեղէ-ը (*Gymnotus electricus*): Կռնակի լողարան չունի եւ ասով շատ դիւրաւ կը ճանչցուի:


Բրասիլիայի եւ Վենեզուելայի ճահճներու եւ ծովակներու մէջ կը գտնուի, եւ ելեկտրական զօրութեամբ նոյն իսկ ձիեր ալ կրնայ թըմ-բեցընել:



Պտկ. 252. Բրասիլիայի Թմբրեցուցիչ Ննք. (1/6):

ՅԵՂ Բ. ՕՉԱԶԿԵՐ (Murenoidei)

166. Հասարակ Օջաշուկ (Anguilla vulgaris) 0-60 հրժ.էն մինչև 1 մետր երկայն կ'ըլլայ, երկայնաձիգ, գլանաձեւ, օձանման մարմին ունի. հաստ մորթն արտաքոյ կարգի լպիրծ է, մանր մանր թեփերն մորթին մէջ մտած, ընկղմած են: Գլուխը՝ փոքր, վերի կզակը՝ վարինէն



Պտկ. 253. Օձաձուկ (1/6):

կարճ է: Խռիկի ճեղքուածքները՝ երկու կողմ կուրծքի լողարաններուն քովերն են: Փորի լողարաններ չունի, կոնակի եւ յետսակողման լողարանները մարմնոյն բոլորաթիւ վերջաւորներ (սք. սալաթ) կը կապմեն եւ պոչի լողարանին հետ միացած են: Գոյնը՝ սղտոր կանանչ է, փորը՝ դեղնագոյն:

Օձաձուկը՝ բաց ի Սեւ ծով թափուող գետերէն, Եւրոպայի ամէն գետերու մէջ կը գտնուի: Օձաձուկը՝ սաղմոններու եւ թառափներու ըրածին հակառակ, կիթ ձգելու ատեն գետերէն ծով կ'երթայ:

Ձագերն՝ որոնք հազիւ 0-08 հրժ. երկայնութիւն կ'ունենան, երկայն եւ նեղ շարքեր կապմելով գետերը կը դառնան, եւ նաեւ առուակներն եւ աղբիւրներն ալ կու գան: Ինչպէս յայտնի է, օձաձուկն՝ որ շատ տոկուն է, կրնայ երկայն ատեն ցամաքի վրայ կենալ եւ գիշերը մերձակայ դաշտերն այց կ'երէ: Կերակուրն է մանր կենդանիներ:

Մի-հելեն կամ Փ-դ-ը (Muraena helena) Միջերկրական ծովը կը գտնուի. երեւելի է՝ գեղեցիկ խայտաբղէտ գունովն եւ կուրծքի լողաբաններ չունենալովը. յղփակեաց եւ փափկաոտունդ Հռոմայեցիք զասիկայ մասնաւոր շինուած աւազաններու մէջ կը պահէին եւ երբեմն գերիներու մոովը կը կերակրէին:

Յստեղոսաժ:


Ուլը-դ յիբը- կը վերաբերին նաեւ քանի մը ծովային ձկեր, որոնք զարմանալի կազմածք ունին, ինչպէս Ձի-յ-ը կամ Ծ-ւ-ն-ն (Hippocampus brevirostris). ողջ եղած առեն երկայնաձեւ եւ ուղիղ կը



Պտկ. 254. Ժովածի (1/2):

կենայ. իսկ չորցած առեն կը կարճնայ եւ հայերէն տպագիր օր ձեւով կը գլորի: Փնջաձեւ խռիկներ ունի:


Դի-դ-ը կամ Ուն-ն-ը (Diodon tigrinus): Բոլոր մարմինը՝ ամուր



Պտկ. 255. Ողնծով (1/2):

եւ սուր փշերով ծածկուած է, այս փշերուն արմատները՝ երեքանկիւնի ձեւով են:

Փշ-դ-ը կամ Գն-ն-ը (Tetraodon hispidus)՝ անհամար պզտիկ փշեր ունի: Այս վերջին երկու ձկերն ըստ ինքեան երկնկեկ եւ նուրբ



Պտկ. 256. Գնդակաձուկ (1/4):

ձկեր են, բայց շատ օդ ծծելով կրնան գնդակի ձևն առնուլ: Ասոնց կզակը՝ ակռայի ձևով իրենց բերնէն դուրս ելած է եւ թռչնոյ կացին կը նմանի: Փորի լողարան չունին:

ԿԱՐԳ 3. ՃԱՐՊԱԹԵՓ ՉԿԵՐ (Ganoidei)

Ճարպալեփ ձուկ կ'անուանուին այս կարգի ձկերը, վասն զի ասոնց թեփերը գրահոնտիկոնի կամ աւելի՝ ճարպի պէս փայլուն, թափանցիկ նիւթով մը պատած են (ասկէ առեալ «փայլաձուկ» անունն ալ տուած են ոմանք), բայց ոսկրէ վահանակներով (ոսկրաթեփ)՝ կամ նոյն իսկ բոլորովին լերկամորթ ձկեր ալ կան այս կարգին մէջ: Ասոնց գլխաւոր ծանուցիչն է՝ շնչերակի մէջ գտնուած բազմաթիւ ծածկոյթներն, որ արեան դէպ ի սիրտը ետ դառնալը կ'արգելեն: Երկու ցեղի կը բաժնուին. ոսկրոյ ճարպալեփեր եւ կռծիկաւոր ճարպալեփեր:

ՅԵՂ Ա. ՈՍԿՐՈՑ ՃԱՐՊԱԹԵՓԵՐ


Ասոնց կմախքը բոլորովին ոսկրէ է եւ մարմինը թեփերով ծածկուած: Գլխաւոր տեսակն է Տղձայո՝ (Amia calva):

ՅԵՂ Բ. ԿՈՃԻԿԱՆՈՐ ՃԱՐՊԱԹԵՓԵՐ

Ասոնց կմախքն ըստ մասին կռծիկաւոր է, իսկ արտաքին մորթը ոսկրէ վահանակներով ծածկուած եւ կամ բոլորովին լերկ: Գլխաւոր տեսակներն են:

167. Ե-+ալնէաւ Ռա-ափը (Acipenser huso) երկայնաձիգ ճընգ-անկիւնի մարմին մ'ունի, միայն մարմնոյն անկիւն կազմած եզերքը՝ մէյ մէկ կարգ գրահոնտիկոնի նման ոսկրէ վահանակներ կան: Գլուխն

ալ նոյնպիսի վահանակներով ծածկուած է, սրածայր եւ դուրս ցցուած ցուռկ մ'ունի, կակուղ եւ աստամաւ բերանն այս ցուռին տակը կողմնակի կեցած է, այս բերնէն ալ չորս հատ ժապաւենի ձեւով խողաններ կախուած են: Խոիկը մի միայն ծակ մ'ունի, որ շատ լայն է, պոչի լողա-



Պտկ. 257. Եւքսինեան Թառափ (1/10):

րանին երկու ծայրերն իրարու անհաւասար են, եւ մորթը՝ խորտուրոր է եւ սրածայր թեփուկներով ծածկուած: Գոյնը կաթի պէս սպիտակ է, կռնակը՝ կապոյտ մոխրագոյն:

Թառափը՝ Սեւ եւ Կասպից ծովերը կը գտնուի եւ հոս թափուող գետերն ալ կը մտնէ: Ամենէն շատ եւ ամենէն մեծերը՝ Արգա գետը կը գտնուին, եւ հոս արտաքոյ կարգի շատ կ'որսացուին:


Այս գետին մէջէն՝ 6—8 մետր երկայնութեամբ եւ 1100—1500 քիլոգրամ ծանրութեամբ թառափ ալ որսացուած է, եւ միայն մէկ ձկան փորեն՝ 400 քիլոգրամ կիթ հանած են: Համազ մսէն զատ՝ Չինկիթ (= խաւիար) շինելու համար ամենէն շատ կիթ կու տայ, ասկէ զատ «Չկան օտինձ» (ichthyocolla) կ'ելլէ ասկէ, որ շատ օգտակար է, ասը ջրոյ մէջ շատ գիւրաւ կը լուծուի, ամենէն լաւ օտինձն այս ձկան մեծ լողալու փամփշտէն կ'ելլէ:

Եւքսինեան Թառափը՝ Մոսկովի կամ Մոսկովի ըստուած ձկանց ցեղէն է, այս մորէները՝ կերպարանքին կողմանէ թառափին շատ կը նմանին:


Բաւ Մորէն (Acipenser Sturio)՝ (Տես Պտկ. 258՝ գիմաքի էջին վրայ) Ադրիական, Հիւսիսային եւ Արեւելեան ծովերն եւ ասոնց մէջ թափուող գետերը կը գտնուի: Եւքսինեան Թառափէն կը զանազանի՝ կարծ խողաններովն եւ անհարթ մորթին վրայ ունեցած բթածայր թեփուկներով: Իսկ Դանուբ գետը պզտիկ մորէ մը կը գտնուի Ստրէլի (Acipenser ruthenus) անուամբ, սովորաբար միայն 0-30 հրժ. երկայն կ'ըլլայ եւ 1—2 քիլոգրամ ծանր կը կշռէ:

ԳԱՐԳ 4. ԱՃԱՌՈՒՑ ԿԱՄ ԹԱՆՁՐԱՓՈՒՇ ԶԿԵՐ (Chondracanthi)

Աճառաւոր յիշերուն կմախքը աճառուտ (այսինքն՝ կարծր կռճիկէ կազմուած) է, իսկ բազմաթիւ ափսանները շատ կարծր են: Ասոնց մարմինը լերկ է կամ մանր ոսկրէ թեփերով ծածկուած, եւ երկու կողմն ալ ճական կամ աւելի խոիկի ծակեր կան. խոիկները ծածկոյթ չունին: Հատերը շնչածակեր ունին, որոնցմէ՝ բերնէն առած ջուրը դուրս կը ժայթքէ: Լողափամփուշտ ալ չունին: Չորս գլխաւոր ցեղերու կը բաժնուին:



Պտկ. 258. Բուն մորէ (1/100):



Պտկ. 259. Ա. շանաճուկ (1/100):


ՅԵՂ Ա. ՅԸՆՈՉԿԵՐ (Squalidi)

168. Անարի շանայոյն (Carcharias glaucus) ամենամեծ եւ բուն ձկներէն մէկն է. երբեմն՝ թէպէտ շատ ցանցառ, 6 մետրէն աւելի եր-

կայն կ'ըլլայ, իսկ հասարակօրէն շատ փոքր կ'ըլլայ: Դիւրաշարժ, երկայն բարակ մարմինը դէպ ի ետեւ երթալով իլաձեւ կը բարակնայ եւ կարծր մորթ մ'ունի, որուն վըայ մանր ոսկրէ թեփեր կան: Մեծ եւ ընդարձակ շեղ բերանը՝ դուրս ցցուած ցռկին տակն է, եւ շատ մը՝ երեքանկիւնի եւ ծայրերը սղոցաձեւ ակռաներ ունի, զորոնք ուղած տանը կը տնկէ: Գլխուն ետեւն՝ երկու կողմը, հինգ հինգ հատ խռիկի ծակեր կան, կռնակին վըայ ալ 2 հատ լողարան: Վերի կողմը մոխրագոյն գորշ, իսկ տակի կողմը դեղնագոյն ճերմակ է:

Ծովային զարհուրելի գազաններէն մէկն է, եւ թէպէտ քիչ անգամ, սակայն պատահած է դէպք, որ ամբողջ մարդ ալ կլլած է, բայց սովորաբար մեծութեան վըայ շատ չափազանցութեամբ կը խօսուի: Զարմանալի յարատեւութեամբ եւ արագութեամբ շանաձուկն ամէն ծովերու մէջ կը լողայ եւ օրերով՝ երազընթացնաւորուն ետեւէն կ'իջնայ: Երկաթէ ճանկերով կ'որսան: Կարծր մորթէն եւ եղոտ լերդէն զատ պիտանացու բան մը չունի: Շանաձկանց բազմաթիւ տեսակներու մէջէն ոմանք իրենց արտաքին կարգի կերպարանքովը շանաւոր են: Զոր օրինակ.

Զիգն կամ Ուն-յու-լը (*Zygaena malleus*), որուն գլուխը մըճի ձեւով երկնցած է, եւ աչուրները գլխուն երկու ծայրերն են:




Պտկ. 260. Ջիգն (Դա):

ՑԵՂ Բ. ԹՔԹԱԿՆԵՐ (*Rajae*)

Այլանդակ ձեւերով ձկեր են, կուրճի լողարանը սովորաբար գլխուն ետեւի կողման (ծործորակին) հետ միացած կ'ըլլայ, ասով երբեմն բոլորակ, երբեմն քառակուսի ձեւ կ'առնու կենդանոյն գլուխը: Կատուաձկէն զատ՝ այս ցեղին տակ գացողներն կենդանի ձագ կը բերեն: Գլխաւոր տեսակներն են:

169. Թճբրեյո-յիւ ներիէ կամ Թճբրայո-իւ (Torpedo marmorata) տափակ, սկաւառակի ձեւով այլանդակ մարմին մ'ունի, խարտեաշ կռնակին վրայ բազմաթիւ պիսակ բծեր կան, եւ կռնակի երկու լողարաններով՝ կարճ եւ հաստ պոչ մ'ունի: Մարմինը լերկ եւ կակուղ է, աչուրներն եւ ըթի ծակերը մարմնոյն վերի կողմն են, իսկ բերանը կը




Պտկ. 261. Թմբրաձուկն (աջ՝ փորք, ձախ՝ կռնակը) (1/2):

գտնուի՝ մարմնոյն տակի կողմը. երկու կողմն հինգ հինգ հատ խռիկի ծակեր կան: Գլխուն՝ եւ տափակ ու տարածեալ կուրծքի լողարանին մէջտեղը մասնաւոր գործարան մ'ունի, որով Թմբրաձուկն ելեկտրական հարուածներ կու տայ:

Ուրիշ ներկէսի տեսակներուն պէս՝ այս ալ Միջերկրական ծովուն մէջ շատ կը գտնուի, բայց իբրեւ ուտելի ձուկ՝ շատ յարգի չէ:

170. Փշոյ ներիէ-ալ կամ Կապո-այո-իւ (տճ. փիփի) (Raja clavata) կուրծքի լողարանները տարածելով մարմինը շեղանկիւնի ձեւը կ'առնու,



Պտկ. 262. Կատուաձուկ (1/20):

ԿԵՆԴՐՈՐԵՆՈՒԹԻՒՆ


պոչը բարակ է, որուն վրայ կռնակի շրջարաններ կան: Մարմնոյն վերի կողմն անհարթ է եւ վրան շատ մը հակթաձեւ ոսկրէ ուռուցիկներ կան, որոնց ծայրը ճանկի կը նմանի:

Եւրոպայի ծովերը՝ բայց գլխաւորաբար Հիւսիսային եւ Ատլանտեան Ովկիանոսը շատ կը գտնուի, իբրեւ ուտելի ձուկ՝ շատ քիչ յարգ ունի. եւ միայն աղքատներուն սեղանը կը զարդարէ:

Պրիստիս կամ Սլոյզոն-ի (Pristis antiquorum). զարմանալի ձուկ մը է, յուկին ծայրն՝ թրածական նման երկայն թուր մը ունի, որուն երկու կողման եզերքը ուր սկաւաններ կան եւ ճիշդ սղոցի կը նմանի:


ՑԵՂ Գ. ԲԱՍՐԱՐՆԵՐԸ ԶԿՐ (Cyclostomi)

Բալթիկէրան կ'ըսուին այս ցեղի ձկները, որովհետեւ կը բերան ունին, բայց նախընթաց կարգերու եւ ցեղերու ձկներէն այնչափ կը տարբերին, որ ոմանք զառ կարգ եւ նոյն իսկ զառ կը համարէին: Գլխաւոր տեսակն է:



Պտկ. 263. Զարադիացի
բնրանը (Ք. մ.):

171. Գեորգի Կարապետեանը կամ Քարապետեանը (Petromyzon fluviatilis) օձի՝ կամ օձաձկան ձեւով անթեփ ձուկ մըն է, ոչ կարծրի եւ ոչ ալ փորի լողարան ունի: Այլը եւ ձագաւ ըստեւ բերանը ծծելու յարմար է. գլխին ետեւն երկու կողմը 7 հաս խռիկի ծակեր կան եւ մարմնոյն վերջի ծայրն ալ երկու բլթակով՝ առանց ճառագայթի տեսակ մը կոնակի-լողարան ունի: Գոյնը՝ կոնակի կողմը սեւագոյն կանանչ, իսկ փորին կողմը արծաթագոյն սպիտակ է:




Պտկ. 264. Զարադիաց (1/2):

Հիւսիսային եւ Միջերկրական ծովերու համեղ ձուկ մըն է. մեծ եւ նաեւ կենդանի անասնոց վրայ կը կաշի եւ կը ծծէ, նոյն իսկ մեծ մեծ ձկներն ալ կամաց կամաց կը ծակէ եւ բոլորովին կ'ուտէ կը լնցնէ: Հիւսիսային ծովը կը գտնուի նաեւ Ծովա-Քարապետեանը (Petromyzon marinus) որ օձաձկան կը նմանի, բայց երկու կողմը 8ական խռիկի ծակեր եւ ծծան բերան մ'ունի:

ՑԵՂ Դ. ՆՐԲԱՐՆԵՐ (Leptocardi)

171. Նշարաձուկ (Amphioxus lanceolatus) հազիւ նորագոյն աստիճանի իրեւ ողնայարաւոր պզտիկ ձուկ ճանչցուած է: Ի բաց ա-




Պտկ. 265. Նշարաձուկ:

ռեալ փոքրիկ տոնաթեւը՝ ոչ գլուխ եւ ոչ ալ ուրիշ լողարան ունի, ոչ ըղեղ, ոչ ոսկր, ոչ կռճիկ եւ ոչ ալ մասնաւոր յատուկ սիրտ մը, արիւնն ալ՝ որոշ գոյն չունի: Քանի մը ծովերու ծովափունքը՝ աւազի մէջ կ'ապրի:

ՉԿԱՆՑ ՎՐԱՅ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԻՏԵԼԻՔ

Չկերը կարծիք եւ ցոյց արին ունին, եւ միշտ խռիկներով շունչ կ'առնուն: Չկերուն մորթը թեփերով կամ վահանիկներով ծածկուած է, իսկ լերկամորթ ձուկ շատ քիչ կը գտնուի: Խռիկներն անմիջապէս գլխուն ետեւն են, եւ սանդրի ձեւով իրարու քով շարուած թերթերէ կը կազմուին, այս թերթերը կամարաձեւ ոսկորի մը վըայ հաստատուած են, նոյնպէս շատ մը տափակ ոսկրներով (որ «խռիկի ծածկոյթ» կ'ըսուին) ծածկուած են: Շունչ առնելու ատեն ջուրը բերնէն ներս կը մտնէ, ետքը բերնի խոռոչին ետեւը գանուող խռիկները կը լուայ, եւ խռիկի ծածկոյթը քիչ մը բացուելով՝ խռիկի ծակերէն դուրս կ'ելլէ: Չկերն առանց օդի չեն կրնար ապրիլ: Ամախքը կամ ոսկր



Պտկ. 266. Լողափամկուշտ:

— . փամփշտին երկու մասերը. Բ. որկորն ու փամփուշտը կցող խողովակ. Գ. որկոր:

է կամ կռճիկ եւ կամ աճառ: Սրտի մէջ միայն մէկ խորշ կը նշմարուի: Ամէնն ալ ձու կ'ածեն, շատ քիչ բացառութիւն կը կազմեն՝ կենդանի ձագ բերողները: Այս ձուն՝ կէլ կը կոչուի, եւ մինչեւ 9 միլիոն մէկտեղ հաշուած է: Շարժելու գործարանն է լողաքանը, կամ լողալիւսը: Բաց ասկից որպէս զի ջրոյ մէջ վեր վար կարենան շարժիլ, ձկերէն շատերը՝ մարմնոյն մէջը մորթով պատած ըստ մեծի մասին երկակուր, օդալիւր փամփուշտ մը ունին, ասիկայ կամ բերնին հետ հաղորդակցուլթիւն ունի եւ կամ բոլորովին գոց է (տես Պտկ. 266):



ՏԻՊԱՐ 2. ԿԱԿՂԱՄՈՐԹՆԵՐ ԿԱՄ ԹՈՒԼԱՏԱՐՈՆԵՐ (Mollusca)

Կենդանաբանութեան 2. Տիպարը կը կացուցանեն Կակղամորթներն, որոնցմէ մինչեւ հիմայ 50.000 ճանչցուած է: Ըստ ոմանց՝ այս կենդանիներուն եւ կաթնատուներու մէջ կան երկու ուրիշ տիպարներ ալ, բայց որովհետեւ շատ քիչ ճանչցուած են, զանց կ'առնուիք: Երեք գլխաւոր դասերո՞ւ կը բաժնուին. Գլխոտանիներ (Cephalopoda), Փոքրոտանիներ (Gastropoda) եւ Խեցիներ (Conchifera):

Գ Լ Ս Ա. Գ Լ Խ Ո Տ Ա Ն Ի Ն Ե Ր (Cephalopoda)

Գլխոտանիներո՞ւ գլուխն ու իջանն իրարմէ զգալի կերպով բաժնուած է: Գլուխն գնդաձեւ է, բերնին բոլորտիքը բռնելու յատուկ բազուկներ կան: Այս բազուկները մեծաւ մասամբ ծծելու ծակեր (ծծոցներ) ունին, օձաձեւ կամ բոտոսի պէս կ'ոլորին եւ կէս մը ծովուն յատակին վրայ սողալու՝ կէս մըն ալ իրենց որսը բռնելու կը ծառայեն, իսկ իրանն երբեմն գնդաձեւ՝ իսկ երբեմն երկայնաձեւ է: Գլխոտանիները խռիկներով շունչ կ'առնուն, եւ ներս առած ջուրը ուժգնութեամբ դուրս ցայտեցընելով՝ նետի պէս արագ դէպ ի ետեւը կը լողան: Երբնո՞ւ կարգի կը բաժնուին:


ԿԱՐԳ 1. ԵՐԿԽՌԻԿԵԱՆՆԵՐ (Dibranchiata)

Միայն երկու խռիկ ունին, գլխաւորներն են:

172. Հասարակ կամ մեծ ուլի (ուլի, լոտ. *Sepia officinalis*): Մարմինը լերկ ու հաւկթաձեւ՝ եւ քսակի նման մորթով մը շրջապատուած է, գլխուն վրայ մեծ աչուքներ ունի, եւ պապկայի կացի նման բերնին բոլորտիքն ուլի ճատ կարծ, երկու ճատ ալ երկայն թեւեր կամ բազուկներ կան, եւ այս վերջիններուն ծայրը ծծակներ ունի: Մորթին գոյնը՝ սպիտակագոյն է եւ կարմրաբիծ, եւ կենդանի եղած

ատենը՝ գետնառիւծի նման՝ գոյնը կը փոփոխէ։ Կռնակի մորթին տակը՝ հաւկթաձեւ տափակ եւ ծակոտկէն՝ ոսկրի նման աման մը կայ, որ սպին-ոսկը (os sepiae) կ'անուանուի եւ փորին վարի կողմը՝ սեւագորշ նիւթով լի քսակ մը կայ։

Այս անճոռնի ու տձեւ կենդանին Եւրոպայի բոլոր ծովերը, բայց ի մասնաւորի Ադրիական ծովը շատ կը գտնուի։ Ցատկուտելով դէպի ետեւ




Պտկ. 267. Հասարակ սպին (՛/):

կը լողայ եւ կամ իւր թեւերովն յատակին վրայ գլխիվայր կը սողայ, բազում կենցաղը մանրիկ կենդանիներ կ'որսայ եւ հաստատուն կը բռնէ։




Եթէ գրգռուի կամ հալածուի՝ թանաքի նման նիւթ մը դուրս կու տայ, եւ ասով քուրք բաւական տեղ մը այնպէս կը պղտորէ, որ շատ դիւրաւ կրնայ ինքը պրծիլ փախչիլ։ Չուերն (կիթերը) ոլուռի չափ մեծ կ'ըլլան, զորոնք կենդանին քարերու կամ ծովային տակերու վրայ կը կպցնէ ողկուզի ձեւով եւ Տրալային խաղաղ (nae marinae) անուամբ ծանօթ են։ Կարծր ու դժուարաբանց միտը՝ միայն աղքատ ժողովուրդը կ'ուտէ։ Կռնակի սպիտակ եւ փխրուն տախտակն՝ ակռայի փաշի շինելու եւ ուրիշ առարկաներ յղկելու կը գործածուի. մեւթ գորշ թանաքն ալ նկարչութեան մէջ կը գործածուի։

Սիպեի նման՝ բայց անկէ քիչ մը մեծ է «Հնոյ», ծովային Պոլիպոդները կամ Ութաթմբիկներն (Octopus, տառ. ըփոփոթ). ութ հասակաւ երկայնութեամբ թեւեր ունին, որոնցմով երբեմն լողացողները կը փաթթեն եւ ծովուն յատակը կը քաշեն: Միջերկրական ծովուն Հասարակ Պոլիպոդը (Octopus vulgaris) տարածուած բազումներովը մէկտեղ հազիւ 0.60 — 100 հրժ. երկայն կ'ըլլայ: Ստոյգ է ուրիշ ծովերու մէջ ալ շատ մեծ կ'ըլլան, բայց առասպելեալ Ընդլայներու (գղ. pieuvre) մեծութեան եւ զօրութեան չափ չեն:



Պտկ. 268. Ծ. Պոլիպոդ (1/10):

173. Արգոնաւորդը (Argonauta Argo) խղունջաձեւ ոլորուած, արտաքոյ կարգի նուրբ, եւ կանոնաւոր կերպով ոլորուն սպիտակ պա-



Պտկ. 269. Արգոնաւորդ (1/10):

.. կենդանին ծովու մակերեսութիւն վրայ կը քայլէ. բ. պատեանը. գ. կենդանին պատեանէն ելած. դ. կենդանին ցատկելով դէպ ի ձախ կը լողայ:

տեան մ'ունի, բայց պտուտի տեղերը սեւագորշ են: Այս պատեանին մէջ ծովային պոլիպոդի նման կենդանի մը կայ, բայց այս պատեանին

կպած չէ. ութը թեւ ունի, որոնցմէ երկուքը լողարանի պէս տարածուած են, պատեանը կ'ընդգրկեն եւ մարմնոյն վրայէն կը հանեն:

Այս կենդանին ուրիշ գլխոտեաններուն պէս ցատկելով դէպ ի ետեւ (բնդ կրուկն) կը լողայ, բերանը ջուր կ'առնու եւ խտիկներու հետ հաղորդակցութիւն ունեցող՝ «Չաբար», ըսուած մէկ ծակէն, դուրս կը հանէ: Միջերկրական ծովը կ'ապրի:

ԿԱՐԳ 2. ՔԱՌԱՆՈՒԿՆԵՐ (Tetrabranchiata)

Այս կենդանիներն առաջիններուն շատ կը նմանին: Գլխաւոր յեղծ է:

Բո՛ւ Նաւիկիւս (Nautilus Pompilius) որուն ամուր, հաստ եւ խղնջաձեւ ուրբուն պատեանը՝ կողմնական պատերով խցիկներու բաժնուած է, անասունն՝ այս խցիկներուն ամէնէն վերջինին եւ ամէնէն մեծին մէջ կը բնակի: Ամանին ներքին շարքը զաղտակուրէ (== սէգէֆ) է եւ ծիածանի ամէն գոյները կը ցոլացընէ: Հնգկաց եւ խաղաղական Ովկիանոս կը գտնուի:



ԴԱՍ Բ. ՓՈՐՈՏԱՆԻՆՆԵՐ ԿԱՄ ԽՂՈՒՆՋՆԵՐ (ՌՄ. ԿՈՒՍԼԱՆՋՆԵՐ) (Gasteropoda)


Խղունջներն որոշ գլուխ մը, փորի կողմն ալ սկաւառակի ձեւով տարածուած մսեղէն դնդերաւոր յաւելուած մը ունին, որ «պ» (նէր-
քան) կ'անուանուի, որովհետեւ կենդանիներն ասով կը քայեն եւ աս-
կէ առեալ Փոքրոպանիէ կ'ըսուին: Ասոնց մարմինը պատող վերարկուէն՝
միափեղէ կրային պատեան մը կը կազմուի: Մինչեւ հիմայ 6000 կեն-
դանի եւ 500 քարացած տեսակներ ճանչցուած են: Իրենց շնչառու-
թեան գործարանէն առեալ 3 գլխաւոր կայքէ կը բաժնուին:

ԿԱՐԳ 1. ԹՈՒՔԱՒՈՐ ԽՂՈՒՆՋՆԵՐ (Pulmonata)

Բոլոր ցամաքի խղունջներն՝ եւ անոյշ ջրոյ խղունջներուն մեծագոյն
մասը, այս կարգին տակ կ'երթայ: Թոքով շունչ կ'առնուն. ոմանք բոլո-
րովին լերկ են. գլխաւոր յեղէրն են:


174. Բառն Խղունջ (Helix pomatia) կոնաձեւ ոլորուած, դեղին
գորշ բոլորակ պատեան մ'ունի, որուն վրայ անորոշ կարմիր-խարտեաշ
շերտեր կան, պատեանին վերջին դարձուածքը՝ ամենամեծն է. կլոր
բերան մ'ունի, իսկ լեզուն խորտուբորդ է եւ իւր կերակուրը լցելու
յարմար: Կենդանին կրնայ բոլորովին իւր պատեանին մէջ քաշուիլ,
նշմարելի գլուխ մ'ունի, որուն վրայ չորս բողկուկներ կան, կրնան ներս
քաշուիլ, երկու երկայններուն ծայրերը մէյ մէկ աչք կայ, եւ պատե-
նով մէկտեղ՝ փորին վրայի մնոտ եւ լայն ներքանով կամաց կամաց յա-
ռաջ կը շարժի:

Այս ամենուն ծանօթ խղունջն՝ ամենամեծ ցամաքային խղունջներէն
մէկն է: Շուք տեղեր, անտառները, պարտեզներն եւ այգիները կը գտա-
նուի: Իրիկուան գէմ՝ նոյնպէս անձրեւէն ետքը, դուրս կ'ելլէ եւ իւր
կերակուրը՝ հիւթեղ տնկեր կը փնտռէ: Չմերուան գէմ՝ կրի պէս ծած-
կոցով մը իւր ամանին բերանը կը գոցէ: Այս խղունջը կ'ուտուի, բայց
պէտք է նախ 3—4 անգամ մաքուր ջրոյ մէջ զարնելով փրփուրն բա-
լրովին հանել: Հարաւային Գերմանիա այս խղունջն մասնաւոր պար-
տեզներու մէջ կը տածեն ու կը բազմացնեն, եւ յետոյ նաւերով հա-
րաւային երկիրներ կը տանին:



Պտկ. 270. Այգեստանի խղունջներ (ծառերու վրայ):

175. Կողնիճ (Շողոփ, Լորանս-ի *Limax agrestis*) առանց պատեանի կարմրագոյն գորշ մարմին մը՝ եւ գլխուն վրայ չորս սեւ բող-



Պտկ. 271. Կողնիճ (Բ. մ.):

առջեւի կէս մասին վրայ՝ համակենդրոն շերտերով թաղանթեայ ծածկոյթ մ'ունի:

կուկ ունի, զորոնք կրնայ ներս քաշել, որոնցմէ երկուքն աւելի երկայն են, ևւ աչքեր ունին: Երկայնաձիգ մարմնոյն փորի կողմը մնտա ներքան մ'ունի, ասով անասունը սողալով յառաջ կ'երթայ, կրնակի

Այս շողորմը պարաէզներու եւ դաշտերու վրայ շատ կը գտնուի, եւ իւր շատակերութեամբը շատ անգամ մեծամեծ փնասներ կու տայ: Բազերն ու կրիաները զասոնք շատ օիրով կ'ուտեն. այս կենդանին ջրնջելու համար սովորաբար խոնաւ տեղեր՝ մոխիր կամ կանեփ եւ կամ քիթանի կտորուանք կը ցանուի: Անտառները, ինչպէս նաեւ մառաններն ալ երբեմն շատ մեծ՝ սեւ կամ ժանկագոյն կարմիր գունով կողինջներ կը գտնուին, որոնք իրենց դորշ տեսքովը գիւրաւ կը ճանչցուին. ասոնցմէ մէկն է՝ Կարբ-էոյն Լիմաք (Limax empiricum):

176. Գէորաիդոն-նի (Planorbis corneus) տափակ, պնակաձեւ, դէպ ի ձախ ոլորուած պատեան մ'ունի: Գոյնը սեւ է, գալարուածներուն վրայ կողմնակի շերտեր ունի: Միայն երկու հատ երկայն, դերձանի պէս բողկուկներ ունի, եւ աչուքներն ալ ասոնց յատակին վրայ են: Թոքով շունչ կ'առնու, եւ շնչառութեան համար ջրոյ երեսը կ'ելլէ:



ա




բ

Այս խղունջն՝ որ հազիւ 0.25 երջ. լայն պատեան մ'ունի գիւրաւ կը ճանչցուի, ամէն տեղ բազմութեամբ մնայուն ջրերու մէջ կը գտնուի:

Պտկ. 272. Գետախղունջ (1/2):

... կռնակը, Բ. Ժորը:

Տղմ-իդոն-նի (Limnaeus stagnalis) հաւկիթաձեւ, գողաւոր նուրբ աման մ'ունի, որուն ծայրը՝ սրածայր եւ կոնաձեւ դարձուած մը կայ, բերանն ալ լայն, երկայնաձեւ եւ բոլորակ է: Երկու հատ լայն, երեքանկունի բողկուկներ ունի, որոնց յատակին վրայ են աչուքները եւ Թոքով շունչ կ'առնու: Մնայուն




Պտկ. 273. Տղմախղունջ (Բ. մ.):

ջրերու եւ մօրերու մէջ շատ կ'ըլլայ, ծովային ոսպերով եւ ուրիշ ծովային տնկերով կ'ապրի, եւ ձուերը ասոնց վրայ՝ մաղասի պէս կը կպցընէ:

ԿԱՐԳ 2. ՅԱՌԱՋԱԽՈՒԻԿ ԽՂՈՒՆՋՆԵՐ (Prosobranchia)

Այսպէս կ'անուանուին այս խղունջները, վասն զի իրենց խոփներն՝ որոնցմով շունչ կ'առնու, մարմնոյն առջեւի կողմը, վերարկուին տակ կը գտնուին: Ասոնցմէ 8500 կենդանի, իսկ 5500 քարացած փէսակ ճանչցուած է: Մեծագոյն մասը ծովերու մէջ կ'ապրի, իսկ շատ քիչերը՝ անոյշ ջրոյ մէջ: Չարմանալի կերպով ոմանց շնչառութեան խոփներն իրենց ոտնարմատին քովերն են: Գլխաւոր տեսակներն են:

177. Ճահնային խղ-նիզը (*Paludina vivipara*) կանանչ-գորշ գունով է, եւ իւր հաւկթաձեւ, սրածայր պատեանին ամէն մէկ դարձուածքին վրայ 3 ական խարտեաշ երկայն գծեր կան: Միայն 2 բողկուկ ունի, աչուրներն ալ ասոնց յատակին վրայ են: Խռիկներով շունչ կ'առնու եւ կենդանի ձագեր կը ծնանի:




Ճահիճներու ջրային տնկոց մէջ շատ կը գտնուի:

178. Կարճաթիւրան ըստ-րոմը (*Strombus gigas*) ամուր պատեան մ'ունի, որուն տակի կողմը շատ գոգաւոր է, իսկ վերի ծայրը կոնաձեւ սուր գալարուած մըն է: Բերին եղբրքը՝ թեւի պէս դուրս տարածուած մաս մ'ունի: Գոյնը ճերմակ կամ մարմնոյ գունով է, իսկ ընդարձակ բերանը՝ գեղեցիկ վարդագոյն կարմիր:

Այս մեծ խղունջին ամուր պատեանը՝ Անտիլեան կղզիներէն կը բերուի եւ սուտ քարեր (կոթ) կը շինուի:

Պտկ. 274. Կարմրաբերան ստրոմ (1/2):


179. Օրժ կամ ճէնական խղ-նիզը (*Cypraea Tigris*) հաւկթաձեւ եւ բոլորովին յղկուած հաստատուն պատեան մ'ունի, որուն գալա-



Պտկ. 275. Օրժ (1/2):


րուածքները ներսի կողմն են եւ արտաքուստ չեն երեւար: Ասոր նեղ բերանը ճեղքուածի կը նմանի եւ երկու կողմանէ՝ կողմնական ծալքերով ակռաներ ձեւացած են: Բռունցքի մը չափ մեծ է, եւ կապուտագոյն ճերմակ յատակին վրայ գեղեցիկ խարտեաշ բծեր ունի:

Այս գեղեցիկ խղունջը Հնդկաց ծովուն մէջ կ'ըլլայ, որչափ յառակին գոյնը կապուած զարնէ, նոյնչափ աւելի յարգի է: Ասոր եւ ուրիշ զարգարուն ճենական խղունջներու պատեանէն քթախոտի տփեր, արկղիկներ եւ ասոնց նման արուեստական իրեր կը շինեն: Դեղնագոյն ճերմակ գունով ճենական խղունջի փոքր տեսակ մըն ալ կայ, որ հազիւ 0.025 հզմ. երկայն կ'ըլլայ եւ Հնդկաց Ովկիանոսը կը գտնուի: Սեւա-մորթներն ու Հնդկիկները Կօլէթ- (Cypraea moneta կամ aurica) անուամբ դրամի տեղ կը դործածեն: Արաբացի կարգի շատ դրամներուն շատ քիչ յարգ ունի, 30 մինչեւ 40 կտորը հազել 4 փարայ կ'ընէ:



Պտկ. 276. Կովրիս. առջնիկ եւ նստնի կողմանէ: (Ք. մ.)

Ասոր պէս գեղեցիկ պատեան եւ միաճեղք բերան ունեցող խղունջը




Պտկ. 277. Հիւսկէն կոն (Ք. մ.):

ներն են. Մարմարադոս կոն (Conus marmoreus) եւ սողացող Հիւսկէն կոն (Conus textilis). Հնդկաց Ովկիանոսը կը գտնուին:

180. Ծիրանաբէր խղունջը (Purpura patula) սեւագորշ գունով հաւկթածեւ, ուռուցիկ պատեան մ'ունի, գալարուածները՝ կարծ, ցից ցից եւ հանգուցաւոր են, բերանը շատ ընդարձակ եւ աղեղնաձեւ է: Կենդանին պատեանին մէջ տեսակ մը ծիրանագոյն հիւլթ կ'արտադրէ:


Այս խղունջն իւր քանի մը տեսակներովը Միջերկրական ծովը կը գտնուի: Հին ատենները զասիկայ կը ժողվէին եւ տիւրացի ծիրանիով՝ բուրդ ներկելու կը դործածէին: Բայց այս ներկը շատ սուղ էր, որովհետեւ ծիրանաբերն այս նիւթէն քիչ ունի, եւ խղունջն ալ դժուարաւ կը գտնուի: Բայց գոյնն ալ Ամերիկէի որդան կարմիրին պէս ո՛չ գեղեցիկ եւ ո՛չ ալ վառվռուն է: —



Պտկ. 278. Պարսիկ ծիրանաբեր (Ք. մ.):


Ուրիշ տեսակ մըն ալ՝ Հնդկաց Ովկիանոսը կը գտնուի, վերինին նման է, եւ Պարսիկ ձիւրն-բէր (Purpura persica) կ'ըսուի:

181. Հաղեովորէրը կամ Ծովակաւնջը (Haliotis tuberculata) գաղտակրի մը պատեանին կերպարանքն ու ձեւն ունի:



Պտկ. 279. Ծովակաւնջ (Ք. մ.):

Բոլոր Միջերկրական ծովուն ափունքը շատ առատ կը գտնուի: Այս խղունջին կենդանին գեղեցիկ կանանչ գունով է եւ զարդարուն վերջաւոր-ներով թաղանթ մ'ունի: Խռիկները կռնակի վրայ պատենին ծակերուն տակն



Պտկ. 280. Ալիսաւոր նաւախղունջ (Ք. մ.):

են: — Ուրիշ ծովային խղունջներուն երեւելներն են. Ալիսաւոր նաւախղունջը (Chiton sulcatus): Ասոր պատեանը միաշար եւ իրարու կպած 8 մասերէ կազմուած է, եւ խղունջին միայն կռնակի կողմը կը ծածկէ: Հաւարակ Ուրտիկաւնջը (Vermetus lumbricalis): Փողի ձեւով պատեան մ'ունի, որուն միայն ծայրը կանոնաւոր կերպով գալարուած է, տակի որրուածներն ալ անկանոն կերպով քաշուած ու իրար մէ բաժնուած են:

182. Տրիտոնիւմը (Tritonium nodiferum) մեծամեծ խղունջներէն մէկն է, պատեանը 0.50 հրճ. երկայն կ'ըլայ: Հակթի պէս կոնաձեւ է, դեպ ի վարը՝ գոգաւոր, ճերմակ եւ խարտեաշ բծերով:

Այս մեծ խղունջը՝ Միջերկրական եւ Աւաւանտեան ծովերը կը գտնուի: Սուր ծայրը քիչ մը կոտրելէն ետքը փողի կամ շեփորի տեղ կրնայ գործածուիլ եւ սուր ձայն մը կը հանէ: Ասոր պատեանները խոցող-եղջիւր կամ փողբոբ ալ կ'անուանուին, վասն զի ականջին քով բռնած ժամանակ կը դռնչեն, նոյնպէս ուրիշ մեծամեծ խղունջներու

գալարուած պատեաններն ուլ պոպոխի ձայներ կը հանեն: Ասոր նման ծովու խղունջներն են. Նրբագուշ տրեպանուլ (Murex tenuispina) երկայն կոթով, գէղ ի առջեւի կողմը դողաւոր կամ ուռուցիկ տման մ'ունի, որուն վրայ երեք կարգ փոփուկ փշեր կան եւ Հնդկաց Ովկիանոսը կը գտնուի: Լեփեկը (Murex brandaris)՝ Միջերկրական եւ



Պտկ. 281. Տրեպանուլ (1/4):



Պտկ. 282. Լախտիկ (1/2):

Ադրիական ծովերը կը գտնուի, թակի ձեւով՝ երկու կարգ հաստ փշերով պատեան մ'ունի եւ միսը կ'ուտուի:

Գեղեցիկ գալարուած ծովային խղունջներէն քանի մը հասար նշանակենք. Հեռագի խղունջը (Trochus perspectivus) եւ Աշտարակայնի խղունջը (Turritella terebra). այս վերջինը Հնդկաստանի ծովերը կը գտնուի, պատեանին ծայրը սրածայր է եւ երթալով կը բարակնայ:



ԳԼՍ Գ. ԽԵՑԻՆԵՐ ԿԼՄ ԹԵՐԹԱԽՈՒԻԿՆԵՐ (Lamellibranchiata)

Խեցիկները զարմանալի կենդանիներ են, ոչ թե միայն որոշ գլուխ չունին, այլ գլխաւոր գործարաններն ալ մարմնոյն այլեւայլ կողմերը բաժնուած են, Անգլո-ի ալ կ'անուանուին: Թաղանթին (վերարկուն) վրայ երկփեղկեան պատեան մը կը կազմուի: Կենդանին երբեմն այս պատեանը բանալու համար մէկ կամ երկու մկունք (շնորհեր) կ'ունենայ, եւ ասկէ առեալ կը բաժնուին երեք կարգի. *Մոնոմիա* (Monomya), *Երկշնորհեր* (Dimya) եւ *Ֆոկալ* (Tubicolae): Այս վերջինները կամ երկու կտորէ բաղկացեալ խեցի մ'ունին եւ կամ խեցի մը եւ կրային մասնաւոր խողովակ մը: Խեցիներն երկու մանր ծակեր ունին, որոնցմէ մէկը՝ խոփները թրջելու եւ անդեան կարեւոր ջուրը ներս կ'առնու (ուրեմի քերան է), իսկ երկրորդը՝ աւելորդ ջուրն ու կղկղանքը դուրս կը հանէ (ուրեմի սրբան է): Եթէ կենդանին սատկի, պատեաններն ինքնին կը բացուին:


ԿԼՄԳ 1. ՄԻԱԴԵՐԵՐՆԵՐ (Monomya)

Այս խեցիներուն՝ որ միայն մէկ փակիչ մկունք (շնորհեր) ունին, գլխաւոր տեսակներն են:

183. Մարգարաթեր կամ Բոն Գաղափոքը (*Meleagrina margaritifera*) կիսաբոլոր, ծանր եւ հաստ պատեաններ ունի: Պատեաններն արտաքուստ՝ կապուտագոյն կանանչ, ճառագայթաձեւ, թեփոտ եւ խաւ ի խաւոյ է, իսկ ներսի կողմը՝ գաղտակրի (սպարափ) պէս կը փայլի: Ասոր մէջ բնակող կենդանին՝ գեղեցիկ եւ կանոնաւոր մարգարիտ կու տայ: Մարգարիտը գաղտակրի նիւթէ շինուած է, եւ ակտաւոր մասերն են, զորոնք անասունը՝ արտաքին առարկայէ մը գրգռուելով, այս առարկային բոլորաթիւր խաւ ի խաւոյ կը պատէ: Մարգարիտներէն ոմանք ազատ իսկ ոմանք պատեանին վրայ կպած կ'ըլլան:

Բուն մարգարտաբերը՝ Պարսից ծովածոցն եւ Հնդկաց Ովկիանոսը՝ քարերու կպած կը գտնուի: Շատ անգամ մինչեւ 12 մէտր խո-


բուլբենէ դուրս կը հանեն սուզակները, եւ անքոյթ ծովափուները կը տարածեն մինչեւ որ անասունները սատկին ու փտտին: Ետքը կը սկսին գաղտնաբերել եւ ասոնց մէջ գլտնուած ազատ մարգարիտները կը ժողվեն: Ոմանց մէջ ամենեւին մարգարիտ չի գտնուիր, իսկ ոմանց մէջ մինչեւ 20 հատ կ'ըլլայ:



Նոր հանուած մարգարիտները կաթի պէս ճերմակ կ'ըլլան եւ շատ գեղեցիկ կը փայլեն, ետքէն աւելի կը դեղնանան: Մարգարիտներն՝ ազնիւ քարերու պէս կերպով կը կշռուին (= մէկ կերպար 0.2 գրամ է), եւ երեք տեսակի կը բաժնուին՝ Հատով մ., խմբով մ. եւ (կեղեւին ներքին կողմը՝ մարգարիտներով. կեղեւը՝ արտաքուստ.) մանր մարգարիտ. առաջինը՝ մեծ եւ կլոր, երկրորդը՝ փոքր եւ անկիւնաւոր, իսկ երրորդը՝ բոլորովին անշաբէ է: Ի մասնաւորի՝ մեծ եւ գեղեցկատես մարգարիտները Բարոկ (գլ. Baroque) կ'անուանուին: Մարգարտաբերին պատենին ներսի կողմը՝ որ գաղտնակուր կամ սառտափ (= սեղէֆ) կ'ըսուի, շատ գործածական նիւթ մըն է եւ գեղեցիկ շողացող գունովն ու փայլունութեամբը շատ երեւելի է:


Պտկ. 283. Մարգարտաբեր բուն գաղտնակուր (1/4):
(կեղեւին ներքին կողմը՝ մարգարիտներով. կեղեւը՝ արտաքուստ.)

184. Ոստիլէ ոստիլէն (Ostrea edulis) կլոր, թեփի պէս թերթերով կոհակաձեւ ծածկուած, անհաւասար պատեաններով խեցի մըն է, արտաքին կողմը՝ գորշ-մոխրագոյն, իսկ ներսի կողմը՝ սպիտակագոյն: Վարի պատեանը վերինէն աւելի մեծ եւ խորունկ է եւ անասունն ասոր վըայ կպած է, իսկ վերի պատեանը տափակ խուփ մը կը կազմէ: Կենդանին երկու կողմանէ ճնշուած մարմին ու-



Պտկ. 284. Ոստիլէ (մէկ պատեանը հանուած):
ա. Թաղանթին առջեւի կողմը զբերանը կը ծածկէ. բ. Թաղանթ (վերաբիւ). գ. Խափկներ. դ. Կռնակին վըայ Թաղանթին երկու թերթերն իրարու կը խառնուին. է. փակիչ ղնդերը:

նի, եւ գրեթէ բոլորաձեւ է. եզերքը վերջաւորներով երկընթեան թաղանթ մ'ունի, տերեւակերպ խռիկներն այս թաղանթին տակն են, եւ միայն փակիչ (կամ կծկիչ) դնդերք մ'ունի, որ գրեթէ պատենին մէջտեղն է:



Պտկ. 285:

Ա. մէկ տարեկան ոստրէ.
Բ. վեցամսեայ ոստրէ.
Գ. երեքամսեայ ոստրէ.


Դ. մէկ — երկու ամսուան ոստրէ.
Ե. երկու — երեք շաբաթուան ոստրէ:

Ոստրէն Եւրոպայի ամէն ծովեզերքն եւ ծանծաղ տեղեր կը գտնուի: Հասարակօրէն ժայռերու, ցիցերու եւ ուրիշ առարկաներու վրայ բազմութեամբ կ'պած կ'ըլլայ:

Արտաքոյ կարգի բազմածին է (վասն զի մի միակ ոստրէն մէկ միլիոն կէթէն աւելի կը ձգէ), ուստի եւ պատասխարուած տեղեր շատ գիւրաւ եւ անհետնաւորութիւն:


ևստեղ ընդհանուր: Նորագոյն ժամանակներու մարդիկ առաջինն էլ չեն, որոնց ծախս խորք թմբերով էլ պատեն եւ մէջ չարի կտրելու եւ մի-
 փոք էլ նեանն, ապրենքն առնոց փայլ էլ կըլին: Ընդհանր թմբերու մէջ
 անոց խոր թմբերով պատուց կտրել համալ կըլին կենդանոց փայլ:
 Պատենքն թմբերու նաեւ ուրիշ կտրել պատենքն առնոց կտրելով
 գործարանուոր նիւթեր են, որոնք խոր իրենց էլ թմբ: Ընդհանր փ-
 թմբերով ապրել կտրուցով եւ թմբ թմբ: որոնքն ուր ուր կտրուցն:
 Նորագոյն ապրանքներու մէջ իմա առ իմա էլ շարունակ: որոնքն ուր շարունակ
 նաեւ իրենց թմբերով բանալ եւ իրենց առնոց խոր նեղ պահեն: Պատ-
 կած ապրեն՝ կտրուցն առնոցն թմբերով էլ նաեւ:

185. Կոթի (Pecten Jacobaeus) անհատաւոր, շաւաղայթանեւ
 ապրանքով եւ եղանակով պատենքն ունի: Վերի պատենը՝ առօրե,
 իսկ վարինը գոգաւոր է: Պատենքն ունի եւ առնոց ապրել փ-
 կել եղանակ մ'իրարու հետ փայլած են:



Պատկ. 286. Կոթին (վերի մասը) (1/2):


Հարաւային Եւրոպայի ծովերը, բայց գլխաւորաբար Սպանիայի քո-
 վերի շատ կայ, պանդուխտները կ'առնուն այս կոթինը եւ իրենց գըլ-



Պատկ. 287. Նոյն (կողմնակի նայուած):

խարկին ու վերարկուին վրայ հաստատելով՝ «Ս. Եագո» դի Գոմբոստե-
 Լայոյ ու խառնուցին կը տանին:

Նշանաւոր միադնդերներէն մէկն ալ Կաւնիւնի կամ Ունիւնի-
կոխն (*Malleus vulgaris*) է, որուն նեղ եւ կոր պատեաններուն փակիչ
եզերները՝ մուրճի պէս
տարածուած են:




ԿԱՐԳ. 2.
ԵՐԿԴՆԴԵՐՆԵՐ
(Dimya)

Այսպէս կ'անուա-
նուին այս կարգի
կենդանիներն՝ իրենց
երկու փակիչ մկուռ-
քին համար: Հատ
բազմաթիւ են այս
կարգին տակ գացող
սեսակները:

Պտկ. 288. Կոսնախեցի ($\frac{1}{2}$):

186. Սոս-մարգարիտաբերը (*Margaritana margaritifera*) հաւ-
կթածեւ, երկնկեկ, հաստ եւ արտաքուստ սեւ գունով պատեաններ ու-



Պտկ. 289. Սուտ մարգարտաքեր ($\frac{1}{2}$):


նի, որոնց ներսը երբեմն խարմեայ մարդարիտ կը կազմուի: Երկու
հաւասարաչափ պատեանները կոնակի վրայ ունեցած՝ ատամնաձեւ մա-
սերով իրարու մէջ մտած են:

Վճիտ եւ յստակ առուակներու եւ գետերու մէջ կը գտնուի, բայց
ոչ ամէն տեղ: Ընդհակառակն գրեթէ ամէն վազուն ջրերու մէջ կը

գտնուի նիւրաւ խեղ (Unio pictorum) ըստածը՝ վերինն շատ կը նմանի եւ արտաքին կարգի շատ կը բազմանայ. պատեանները հաստ եւ արտաքուստ դեղնագոյն կանանչ են: — Ասոնց շատ կը նմանի՝

187. Ասոնալի խեղին (Anodonta cygnea):


188. Հսկայալի-խեղին (Tridacna gigas) խեցաւոր կենդանեաց մէջէն ամենամեծն է, 1—1.5 մէտր երկայն կ'ըլլայ, եւ անասունն ալ միատեղ առեալ 2—300 քիւլոգրամ ծանր կը կշռէ:



Պտկ. 290. Հսկայածեւ խեղի (1/10):

Հսկայածեւ խեղին՝ Հնդկաց Ուկիանսուր կ'ապրի, բայց ծանծաղ տեղեր: Տեղատուութեան ատեն կայնոյ մօրուքին թելերը կը կտրեն, եւ այս միջոցին՝ խեղին՝ որ սովորաբար բաց կ'ըլլայ, այնպէս շառաշմամբ եւ ուժով պատեաններն իրարու կը զարնէ, որ եթէ նաեւ հաստ պարան մը մէջը երթայ, երկու կը կտրէ: Տեղացիք այս կենդանին կ'ուտեն, պատեաններն ալ ջրոյ կոնքի տեղ կը գործածեն:


189. Պինն կամ Եպիննալ (Pinna squamosa) սեպածեւ եւ դիւրաբեկ պատեաններ ունի, որոնք արտաքուստ մոխրագոյն են, եւ մանր խիտ առ խիտ թեփերով ծածկուած են, խկներսի կողմը՝ կարմիր եւ ուղորկ են: Իրենց սուր ծայրովը ծովուն յատակը՝ աւազուտ տեղեր կը մխին, եւ երկու պատեաններուն



Պտկ. 291. Պինն (1/10)

մէջտեղը մետաքսի պէս ոսկեգոյն-կանանչ գունով մազէ փունջ մը կայ, որ քեփեղ կ'անուանուի:

Այս մեծ խեղին, ինչպէս նաեւ ասոր նման բայց պզտիկ՝ Անի-Եպինն (Pinna nobilis), Միջերկրական եւ ուրիշ հարաւային ծովերը կը գտնուին: Գլխաւորաբար պիններն՝ իրենց մետաքսանման փնջովը նշա-




Պտկ. 292. Ձկնականջ (Ք. մ.):

Ա. Բուռն ձկնականջ. Բ. Աւաղի ձկնականջ, աւաղի վրայ կեցած՝ չնչու խողովակը գուրս կը կարկառէ. Գ. Թաղուած աւաղի ձկնականջ:

Նաւոր են, վառն զի ասոր թեւերէն Նէապոլիս՝ ձեռնոց, զանկապան եւայլն եւայլն կը շինուին: — Ուլիանջը կամ Ձկնականջն (տճ. Ժգէս Mytilus edulis)

ողորկ եւ մանուշակաւոյն պատեաններ ունի, որոնց ծայրը լայն է, եւ մէջի կենդանւոյն մետաքսանման մօրուքն ալ հոս է: Գրեթէ ամէն ծով՝ ափանց քով աւաղակոյտներու վրայ կը գտնուի, երբեմն այնչափ շատ կ'ըլլայ, որ ծովուն յատակը ծածկուած կ'ըլլայ: Նոյն




Պտկ. 293. Սիրտխնցի (1/2):

պէս այս տեսակէն է Առդի յնաւնջը (*Mya arenaria*): — Ծովաբնակամ Բարիէրը (*Lithodomus lithophagus*) Ագրիական ծովուն՝ ձկնականջի նման ուտելի խեցիներէն է. նեղ գլանաձեւ եւ գրեթէ արմաւի կուտին կը նմանի: Քարերու եւ կորաղիոններու մէջ ինքնափոր ծակերու մէջ կ'ապրի եւ համեմաւոր ճաշակին համար շատ սիրով կ'ուտուի: Նոյնպէս Վենետիկի ծովալճերը՝ Սոլը կամ Դանալաճը (տճ. սիւլիւնէզ *Solen vagina*) անուամբ խեցի մը կը գտնուի, որուն պատեանները 0.06—15 հրժ. երկայն, հաւասար լայն եւ բարակ են, կենդանին ալ շատ համով է: — Բազմաթիւ երկդնդերաւոր խեցիներէն մէկն է Ուրտի Սիրտեյնի (*Cardium edule*) Հիւսիսային կողմերը եւ Միջերկրական ծովու մէջ շատ կը գտնուի եւ համով կ'ուտուի:

ԿԱՐԴ 3. ՓՈՂԱԶԵՆԻ ԽԵՑԻՆԵՐ (Tubicolae)

190. Վիմափորը կամ Սորակեաց իւլցին (*Pholas dactylus*) սեպաձեւ պատեաններ ունի, որոնք տակի կողմանէ լայն կը բացուին, բայց մարմինը կրային խողովակով պատած չէ:



Պտկ. 294. Վիմափոր (Ք. մ.):

Ագրիական, Միջերկրական ծովերը շատ կը գտնուի, հաստ եւ ամուր փայլուն եւ քարերն անգամ կը ծակէ, բայց մինչեւ հիմայ ճշդիւ չի գիտցուիր, թէ ինչ եղանակաւ, հաւանական է որ իւր պատեաններու խարտոցաձեւ ծայրովը եւ փակիչ գնդերները փոփոխակի շարժելովը:

191. Շաղափուկը (Teredo navalis) որդի էր նմանի: Երկայնաձիգ եւ գլանաձեւ մարմինը կրային խողովակով մը պատած է, առջեւի ծայրը մատանոյ կամ ողակի ձեւով ընդարձակ բացուող խեցեղէն աման մը կայ, վերջի ծայրն ալ երկու հատ կրային մանր հարթակներ:



Այս աննշան՝ բայց արտաքայ կարգի մնասակար կենդանին, կ'ըսուի թէ տաք կողմերէն նաւերով Եւրոպա բերուած ըլլայ, բայց շատ մը ծովերու մէջ ասոր մերձաւոր՝ նոյնչափ ալ մնասակար, տեսակները գտնուած են:

Պտկ. 295. Շաղափուկ (քիչ մը պզտիկցած):

Առջեւի ծայրով՝ ամէն տեսակ փայտէ բաներ՝ գլխաւորաբար նաւահանգիստներու եւ ծովու թմբերուն ջիղերն ու գերանները, նոյնպէս՝ պղնձով չորուագուած նաւերու ողնափայտերը կը ծակէ ներս կը մտնէ: Ամէն ուղղութեամբ կը փորէ, եւ քիչ ժամանակէն բոլորովին անգործածական կ'ընէ: Շատ անգամ արդէն Հոլանդա սաստիկ վախերու մէջ ինկաւ որ այս կենդանին իրեն թմբերն ապականելով չըլլայ թէ սղողուի: Նոյնպէս Վենետիկի լճակներուն մէջ ալ երբեմն երբեմն արտաքայ կարգի մնաս հասցուցած է: Ուստի եւ փայտերն այս անասնէն պահպանելու համար կամ կ'այրեն եւ կամ վրան սոռուարագլուխ գամեր կը գամեն խիտ առ խիտ, որպէս զի թանձր ժանկ կապելով այս անասնոյն մուտքն արգելուն:

ԿՈՒՂԱՄՈՐԹՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ ԸՆԳՀԱՆՈՒՐ ԳԻՑԵԼԻՔ

Կուղամորթն կամ Թուլապարը անասունները նշանաւոր են իրենց մորթովը՝ որ շատ մը մկուռններ ունի, եւ միայն փորին կողմը շարժելու անդամ մ'ունին, որ իբր օդ կը գործածուի: Այս մորթին կռնակի կողմը վահանաձեւ լորձնոտ ու թոյլ մորթ (թաղանթ) մըն ալ կը գրտնուի: Այս մորթը հասարակօրէն կրային պատեան մը կը կազմէ արտաքուստ, որ երբեմն Տիափեղէնաձի է (տես գլխատեսաններն ու խողունները), երբեմն ալ Երկէղէնաձի (տես խեցիները): Իսկ ոսկրէ ողնայար չունին: Թուլատարր կենդանեաց՝ որոնց մեծ մասը ջրային կենդանիներ են եւ խռիկներով չունչ կ'առնուն, ներքին կազմութիւնը շատ կատարեալ է, իսկ ընդհակառակն արտաքին կազմութիւնն այնպէս թերակատար է, որ ոմանք նաեւ գլուխ ալ չունին:



ՏԻՊԱՐ 3. ՅՕԴՈՒԱԾՈՏՈՒՆՔ (Arthropoda)

Կենդանաբանութեան 3. տիպարը կը ներկայացընէ այնպիսի կենդանիներ, որոնց մարմինն օղակներէ կազմուած է, իսկ անդամները՝ գլխաւորաբար ոտքերը, յօդաւոր են, եւ ասկէ կ'առնուն իրենց անունը: 2-րդ դասերու կը բաժնուին. 1. Միջատիւն (Insecta). 2. Սարդապղնիւն (Arachnoidea). 3. Հազարոտոտիւն (Myriapoda) եւ 4. Խեցեճորիւն (Crustacea):

ԴԱՍ Ա. ՄԻՋԱՏՆԵՐ ԿԱՄ ԺՃԻՆԵՐ (Insecta)

Միջատ՝ այսինքն մէջտէղէն տիպար (Insecta), կ'անուանուին այս կենդանիները, վասն զի ասոնց մարմինն 3 որոշ մասերու բաժնուած է.


1. Դիւրիւ՝ որուն վրայ կան մեծ ու բաղադրեալ ալիւնքն ու քողկոնները. բողկոնները թիւ իբր շրջափէլէ կը գործածուին, եւ թիւ իբր հոսքաւորութեան գործարան. քեյանն երկու ամուր կզակներ ունի, որոնցմէ վարինը տկար է: Ասոնց բերնի գործարանը կամ քաթիւն՝ յարմար է, կամ լիւն, կամ քթիւն եւ խայլիւն, բնականապէս այս չորս գործողութեան համեմատ է բերնի ալ կազմութիւնը:

2. Կուրծք, որ երեք օղակներու կը բաժնուի, յաւաքակողմեան, միջին եւ յետադիմեան օղակ. միջին օղակին վրայ կայ վահանալըսուած երեքանկիւնի եղջերեայ մաս մը, օր. Ուլիւն Եղջեայ (Cetonia aurata) վրայ կը տեսնուի որոշ: Կուրծքի ամէն մէկ օղակին փորի կողմը մէկ մէկ զոյգ ոտքեր կան, որոնք 5 մասէ բաղկացած են: Կուրծքի միջին եւ յետադիմեան օղակներուն վրայ երկու զոյգ թեւեր ունին, որոնցմէ միջին օղակին վրայ եղջերները կարծր պատեաններ են, իսկ յետադիմեան օղակին վրայինները կակուղ թաղանթներ:

3. Փոք կամ յետոյ, որուն վրայ կան շնչական խողովակիկներ, որոցմով կենդանին շունչ կ'առնու. ասոնք շնչակաւ կ'ըսուին եւ մանր կլոր ծակեր կ'երեւան:

Միջատները ճերմակ ու ցուրտ արիւն ունին: Մինչեւ հիմա 230.000 միջատ ճանչցուած է, այսինքն բոլոր կենդանեաց թուին (366.000)

2 երրորդական մասը կը կազմեն: Նշանաւոր է միջատներու կրած կէր-պարանափոխութիւնը (Metamorphosis), որով իրենց արտաքին տեսքն քիչ շատ կը փոխուի: Մեկնենք այս երեւոյթը:



Պտկ. 296. Զորեակի անդամադաստութիւն:

- | | |
|---------------------|------------------|
| ա. գլուխը. | ե. թեւը. |
| բ. կուրծքի յառաջա- | զ. յետոյքը. |
| կողման օղակը. | է. ծալուած թեւը. |
| գ. կուրծքի միջին օ- | զ. պատեանը. |
| ղակը. | թ. բողկուկը: |
| դ. կուրծքի յետա- | |
| կողման օղակը. | |

Հիփոթեւ: Վերջապէս այս պատեանն ալ կը ծածկէ կաղմուած կերպարանքովը դուրս կ'ելլէ եւ ալ այնուհետեւ ամենեւին չի փոխուիր: Բոլոր միջատները՝ վերոյիշեալ կերպով նկարագրուած փոփոխութեան չորս վիճակներէն ալ (որոնք են, ձու, թրթուր, կծկած եւ կատարեալ միջատ) չեն անցնիր: Քանի մը միջատներու թրթուրներն իրենց բուն կատարեալ միջատին շատ կը նմանին, բայց բոլորովին անթեւ են: Կծկած վիճակի մէջ կը շարժին, սնունդ կ'առնուն եւ շատ անգամ նաեւ թեւոց յաւելուածներ ալ կ'ունենան: Իսկ ամենէն կատարեալ միջատները՝ թեւ ալ կը ստանան, եւ ասով կարող կ'ըլլան օդի մէջ թռչել: Այսպիսի միջատներու փոփոխութիւնը կ'անուանուի ափսոսար փոփոխութիւն: Միջատներն 7 կարգի կը բաժնուին (իսկ բնապատումներէն ոմանք կը բաժնեն 13 կարգի). որոնց առաջինն է:

Միջատաց շատ մանր յոտերէն նախ եւ յառաջ որդի նման լըբ-լոտերէր կ'ելլեն: Ատոնք արտաքին կարգի դիւրաշարժ եւ շատ կեր են, շատ արագ կը մեծանան՝ եւ մինչեւ որ որոշ մեծութեան հասնին շատ անգամ իրենց խորիւր կը փոխեն. առ այս ոմանք քանի մ'օրուան կամ շաբաթուան կը կարօտին, իսկ ոմանք նաեւ շատ տարիներու: Յետոյ միջատին կենացը մէջ դադարում մը կը մտնէ, ուտելէ եւ շարժելէ կը դադրի եւ դարձեալ ուրիշ կերպարանք մը կ'առնու: Ամբողջ միջատին բոլորտիքը թաղանթեայ կեղեւ կամ պատեան մը կը կազմուի, որուն մէջ դադարի մէջ հանգչելու պէս հանդարտ կը մնայ եւ այս կ'անուանուի ձկնաձի: Շատ անգամ ասոր վրան ալ քոշոք մը կ'ըլլայ, զոր միջատն ինքնին բարակ, մետաքսի նման հիւսուածքէ կը շինէ: Այս մեկնակ կամ կրկին պատեանի մէջ միջատն երկայն ատեն (կամ կարճ) կը մնայ, եւ ասոր մէջ երթալով կամաց կամաց կատարեալ միջատի կը փոխուի: Պէտք չէ ձկնաձին ու քոշոքն իրարու հետ ծակի եւ միջատն իւր վերջի անգամ կաղմուած կերպարանքովը դուրս կ'ելլէ եւ ալ այնուհետեւ ամենեւին չի փոխուիր: Բոլոր միջատները՝ վերոյիշեալ կերպով նկարագրուած փոփոխութեան չորս վիճակներէն ալ (որոնք են, ձու, թրթուր, կծկած եւ կատարեալ միջատ) չեն անցնիր: Քանի մը միջատներու թրթուրներն իրենց բուն կատարեալ միջատին շատ կը նմանին, բայց բոլորովին անթեւ են: Կծկած վիճակի մէջ կը շարժին, սնունդ կ'առնուն եւ շատ անգամ նաեւ թեւոց յաւելուածներ ալ կ'ունենան: Իսկ ամենէն կատարեալ միջատները՝ թեւ ալ կը ստանան, եւ ասով կարող կ'ըլլան օդի մէջ թռչել: Այսպիսի միջատներու փոփոխութիւնը կ'անուանուի ափսոսար փոփոխութիւն: Միջատներն 7 կարգի կը բաժնուին (իսկ բնապատումներէն ոմանք կը բաժնեն 13 կարգի). որոնց առաջինն է:

ԿԱՐԳ 1. ՊԱՏԵՆԱԹԵՒԻՆԻ ԿԱՄ ԲՆԴԵՌՆԵՐ (Coleoptera)

Պատենաթեւերը ծամող բերան ունին, երկու կարծր պատեանք եւ երկու թաղանթեայ թեւեր, կատարեալ փոփոխութիւն կը կրեն: Ասոնցմէ մինչեւ 80.000 տեսակ կը ճանչցուի, իսկ քարացած միայն 1000 տեսակ:

Պատենաթեւերը կը բաժնուին 18 գլխաւոր ցեղերու:

ՑԵՂ Ա. ԲԸՋՄԱԹԵՐԻ ԲՈՂԿՈՒԿԱԹԵՐՆԵՐ (Lamellicornia)

192. Զորեակը (Melolontha vulgaris): Ընդհանուր գոյնը սեւ է, բայց թեւերն, ոտուղներն ու թեւերու ծածկոյթները կարմրագոյն գորշ



Պտկ. 297. Զորեակ (վարը՝ թրթուրն ու կծկածը):

են: Գլխուն երկու կողմն են բողկուկները, որոնց ծայրը՝ հաստ է, եւ հողմահարի պէս շարուած 6—7 թերթիկներէ կազմուած է, ասկէ ա-

ռած են Բազմաթերթի Բողկոտկա-որ անունը: Կուրծքն ալ երեք կտորէ կամ օղակներէ կազմուած է, որոնց վրայ ոտուկներն ու թեւերը կան: Փորը՝ 6 հատ եղջերային, սեւ օղակներէ կազմուած է, որոնց եղբրքը՝ ճերմակ գունով երեքանկիւնի կողմնական բծեր կան, ետեւի ծայրն՝ երկայն եւ վար ծռած յաւելուած մ'ունի:



Ջորեակն՝ որ նաեւ «Մարերի բզէզ», կ'անուանուի, Ապրիլին վերջերը կամ Մայիսի սկիզբները կը սկսի երեւալ, այսինքն այնպիսի ատեն մը, որ ծառերու մեծ մասը տեղաւայեց կը զարդարին, եւ տերեւները, ծաղիկներն եւ պողպ կոկոնները կրծելով շատ անգամ ահագին փնաս կու տայ, մանաւանդ եթէ՝ ինչպէս տեղին տեղին ամէն չորս տարի կ'ըլլայ, ահագին բազմութեամբ ըլլայ:

Ցերեկը հանդարտ ծառերու վրայ կը կենայ, բայց իրիկունը կը սկսի ատենը բոլորտիք բզզալ: Չու անելու համար ճճիները գետինը կը փորեն եւ մէջը կը մտնեն: Իսկ ձուերէն՝ 4—6 շաբաթ-կտրք սաստիկ փնասակար թրթուրներ կ'ելլեն, հոգին մէջ 3—4 տարի կը մնան: Չորրորդ ամառուան վերջերը կը կծկին եւ յաջորդ գարնան իրեւ կատարեալ միջատ երեւան կու գան: — Ջորեակը ջնջուլու ամենալաւ միջոցն է ծառերը թրթուրէն ու միջատները ժողովելու. երկին ալ պէտք է բռնլ կամ հերկել, որով թրթուրները հոգին երեւոյ կ'ելլեն, թռչունները զատնք կը ժողովեն կը սպառեն: Յունիսին խտաւէտ դաշտերուն վրայ կ'երեւայ բաց գեղին խոտիկը (Rhizotrogus solstitialis), որ նոյնպէս վերինին չափ թէ՛ շատ կ'ըլլայ եւ թէ՛ փնասակար է:



Պտկ. 299. Ոսկի եզնակ (Բ. մ.):

193. Ոսկի Եշնակը (տճ. զնա.) (Cetonia aurata): Ջորեակէն քիչ մը պզտիկ է, բողկուկներն երեք թերթերէ կազմուած են, մարմինը՝ ոսկեգոյն կանանչ, տափակ եւ վերջի ծայրը՝ բլրածայր է, իսկ փորի կողմը պղնձի կարմիր գունով կը ցոլանայ:

Պարտէզներու մէջ վարդենիներու վրայ առատ կը գտնուի եւ վարդերը կը բզկտէ. արտաքոյ կարգի զարմանալի եղանակաւ թրթուրը մըջնոցներու մէջ կ'ապրի:

194. Կոյաղնդիւր (Geotrupes stercorarius) սեւ գունով է, կռնակի կողմը մետաղի կանանչ, իսկ փորին կողմը՝ երբեմն կապոյտ: Բողկուկներուն ծայրը հողմահարի ձեւով երեք-թերթեայ սեպ մը կայ, մարմինը խիստ կոր է, կարծր պատեան մ'ունի, եւ շատ զօրաւոր է, պարանոցի վահանը՝ հարթ է, իսկ պատեանները՝ կէտ կէտ խողովակաձեւ:



Պտկ. 300. Կոյաղնդիւր (Բ. մ.):

Կոյաղնդիւրները դանդաղ եւ շատ ծանր կը քալեն, իրիկունները բզզալով կը թռչին, թէ իրենք եւ թէ իրենց թրթուրներն ընտանի անասնոց քակորներու եւ աղբերու մէջ կ'ապրին:

պէս այս տեսակէն է Աւալի յինկանջը (*Mya arenaria*): — Ծովաբնակ կամ Քուրկերը (*Lithodomus lithophagus*) Ագրիական ծովուն՝ ձկնականջի նման ուտելի խեցիներէն է. նեղ գլանաձեւ եւ գրեթէ արմաւի կուտին կը նմանի: Քարերու եւ կորաղեղեններու մէջ ինքնափոր ծակերու մէջ կ'ապրի եւ համեմատոր ծաշակին համար շատ սիրով կ'ուտուի: Նոյնպէս վենետիկի ծովալճերը՝ Սոլյէր կամ Դանալաբունը (տճ. սիւլիւնէզ *Solen vagina*) անուամբ խեցի մը կը գտնուի, որուն պատեանները 0.06—15 հրժ. երկայն, հաւասար լայն եւ բարակ են, կենդանին ալ շատ համով է: — Բազմաթիւ երկղնդեբաւոր խեցիներէն մէկն է Ուրեթի Սիւրդիէցի (*Cardium edule*) Հիւսիսային կողմերը եւ Միջերկրական ծովու մէջ շատ կը գտնուի եւ համով կ'ուտուի:

ԿԱՐԳ 3. ՓՈՂԱԶԵՒԻ ԽԵՑԻՆԵՐ (Tubicolae)

190. Վէմափորը կամ Սոքակեաց իւեցին (*Pholas dactylus*) սեպածեւ պատեաններ ունի, որոնք տակի կողմանէ լայն կը բացուին, բայց մարմինը կրային խողովակով պատած չէ:



Պատկ. 294. Վիմափոր (Ք. մ.):

Ագրիական, Միջերկրական ծովերը շատ կը գտնուի, հասա եւ ամուր Ժայռեր եւ քարերն անգամ կը ծակէ, բայց մինչեւ հիմայ ճշդիւ չի գիտցուիր, թէ ինչ եղանակաւ, հաւանական է որ իւր պատեաններու խարտոցաձեւ ծայրովը եւ փակիչ դնդերները փոփոխակի շարժելովը:

191. **Շաղափոկ** (Teredo navalis) որդի կը նմանի: Երկայնաձիգ եւ գլանաձեւ մարմինը կրային խողովակով մը պատած է, առջեւի ծայրը մատանոյ կամ օղակի ձեւով ընդարձակ բացուող խեցեղէն աման մը կայ, վերջի ծայրն ալ երկու հատ կրային մանր հարթակներ:



Այս անշան՝ բայց արտաքին կարգի մնասակար կենդանին, կ'ըսուի թէ տաք կողմերէն նաւերով Եւրոպա բերուած ըլլայ, բայց շատ մը ծովերու մէջ ասոր մերձաւոր՝ Նոյնչափ ալ մնասակար, տեսակները գտնուած են:

Պտկ. 295. Շաղափուկ (քիչ մը պզտիկցած):

Առջեւի ծայրով՝ ամէն տեսակ փայտէ բաներ՝ գլխաւորաբար նաւահանգիստներու եւ ծովու թմբերուն ցեղերն ու գերանները, Նոյնչափ պղնձով չգրուագուած նաւերու ողնափայտերը կը ծակէ ներս կը մտնէ: Ամէն ուղղութեամբ կը փորէ, եւ քիչ ժամանակէն բոլորովին անգործածական կ'ընէ: Շատ անգամ արդէն Հոլանդա սաստիկ վախերու մէջ ինկաւ որ այս կենդանին իրեն թմբերն ապականելով չըլլայ թէ ողողուի: Նոյնպէս վենետիկի լճակներուն մէջ ալ երբեմն երբեմն արտաքին կարգի մնաս հասցուցած է: Ուստի եւ փայտերն այս անանէն պահպանելու համար կամ կ'այրեն եւ կամ՝ վրան ստուարագլուխ դամբը կը դամեն խիտ առ խիտ, որպէս զի թանձր ժանկ կապելով այս անասնոյն մուտքն արգելուն:

ԿԱԿՂԱՄՈՐԹՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ ԸՆԳՀԱՆՈՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔ

Կակղամորթ կամ Թոմարաբր անասունները նշանաւոր են իրենց մորթովը՝ որ շատ մը մկունքներ ունի, եւ միայն փորին կողմը շարժելու անդամ մ'ունին, որ իբր րոպէ կը գործածուի: Այս մորթին կոնակի կողմը վահանաձեւ լորձնոտ ու թոյլ մորթ (թաղանթ) մըն ալ կը գրտնուի: Այս մորթը հասարակօրէն կրային պատեան մը կը կազմէ արտաքուստ, որ երբեմն Դիաֆեղէան է (տես գլխոտեաններն ու խղունջները), երբեմն ալ Ելէֆէղէան (տես խեցինները): Իսկ ոսկրէ ողնայար չունին: Թուլատարը կենդանեաց՝ որոնց մեծ մասը ջրային կենդանիներ են եւ խոհիներով շունչ կ'առնուն, ներքին կազմութիւնը շատ կատարեալ է, իսկ ընդհակառակն արտաքին կազմութիւնն այնպէս թերակատար է, որ ոմանք նաեւ գլուխ ալ չունին:



ՏԻՊԱՐ 3. ՅՕԴՈՒԱԹՈՏՈՒՆՔ (Arthropoda)

Կենդանաբանութեան 3. տիպարը կը ներկայացընէ այնպիսի կենդանիներ, որոնց մարմինն օղակներէ կազմուած է, իսկ անդամները՝ գրգռաւորաբար ոտքերը, յօդաւոր են, եւ ասկէ կ'առնուն իրենց անունը: Չորս դասերու կը բաժնուին. 1. Միջատներ կամ ճիւղներ (Insecta). 2. Սարդապղնձեր (Arachnoidea). 3. Հազարոտոտներ (Myriapoda) եւ 4. Խեցե՛մարմնէր (Crustacea):

ԴԱՍ Ա. ՄԻՋԱՏՆԵՐ ԿԱՄ ԺՃԻՆՆԵՐ (Insecta)

Միջատ՝ այսինքն Դեփրէդէն Կարուսթ (Insecta), կ'անուանուին այս կենդանիները, վասն զի ասոնց մարմինն 3 որոշ մասերու բաժնուած է.


1. Գլուխ՝ որուն վրայ կան մեծ ու բազադրեալ աչքերն ու քողկոյնները. բողկուկները թէ իբր շրջափէլէ՜ կը գործածուին, եւ թէ իբր հոսքաւորութեան գործարան. քերանն երկու ամուր կզակներ ունի, որոնցմէ վարինը տկար է: Ասոնց բերնի գործարանը կամ Զամբելո՜ւ յարմար է, կամ լղելո՜ւ, կամ Զծելո՜ւ եւ Խայլելո՜ւ, բնականապէս այս չորս գործողութեան համեմատ է բերնի ալ կազմութիւնը:

2. Կո՛րծո՜ւ, որ երեք օղակներու կը բաժնուի, յաւաքահոդման, Դիջն եւ յեփաակոդման օղակ. միջին օղակին վրայ կայ վահանակ ըսուած երեքանկիւնի եղջերեայ մաս մը, օր. Ոսկի Եղնակի (Cetonia aurata) վրայ կը տեսնուի որոշ: Կուրծքի ամէն մէկ օղակին փորի կողմը մէկ մէկ զոյգ ոտքեր կան, որոնք 5 մասէ բաղկացած են: Կուրծքի միջին եւ յետսակոդման օղակներուն վրայ երկու զոյգ թւեւոր ունին, որոնցմէ միջին օղակին վրայ եղածները կարծր պատեաններ են, իսկ յետսակոդման օղակին վրայինները կակուղ թաղանթներ:

3. Փոք կամ յեփոյո՜ւ, որուն վրայ կան շնչական խողովակիկներ, որոցմով կենդանին շունչ կ'առնու. ասոնք շնչահան կ'ըսուին եւ մանր կլոր ծակեր կ'երեւան:

Միջատները ճերմակ ու ցուրտ արիւն ունին: Մինչեւ հիմայ 230.000 միջատ ճանչցուած է, այսինքն բոլոր կենդանեաց թուին (366.000)

2 երրորդական մասը կը կազմեն: Նշանաւոր է միջատներու կրած կէ-
պարանափոխութիւնը (Metamorphosis), որով իրենց արտաքին տեսքն
քիչ շատ կը փոխուի: Մեկնենք այս երեւոյթը:



Պտկ. 296. Զորեակի անդամաճատութիւն:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| ա. գլուխը. | ւ. թեւը. |
| բ. կուրծքի յառաջա-
կողմեան օղակը. | շ. յետոյքը. |
| գ. կուրծքի միջին օ-
ղակը. | է. ծալուած թեւը. |
| դ. կուրծքի յետոս-
կողմեան օղակը. | զ. պատեանը. |
| | թ. բողկակը: |

Հիմնութեւ: Վերջապէս այս պատեանն ալ կը
գամ կազմուած կերպարանքովը գուրս կ'ելլէ եւ ալ այնուհետեւ ամենեւին
չի փոխուիր: Բոլոր միջատները՝ վերոյիշեալ կերպով նկարագրուած փոփո-
խութեան շորս վիճակներէն ալ (որոնք են, ձու, թրթուր, կծկած եւ կա-
տարեալ միջատ) չեն անցնիր: Քանի մը միջատներու թրթուրներն իրենց
բուն կատարեալ միջատին շատ կը նմանին, բայց բոլորովին անթեւ են:
Կծկած վիճակի մէջ կը շարժին, սնունդ կ'առնուն եւ շատ անգամ նաեւ
թեւոց յաւելուածներ ալ կ'ունենան: Իսկ ամէնէն կատարեալ միջատները՝
թեւ ալ կը ստանան, եւ ասով կարող կ'ըլլան օդի մէջ թռչել: Այսպիսի
միջատներու փոփոխութիւնը կ'անուանուի անկարգ փոփոխութիւն: Միջատ-
ներն 7 կարգի կը բաժնուին (իսկ բնապատումներէն ոմանք կը բաժնեն
13 կարգի). որոնց առաջինն է:

Միջատաց շատ մանր յոտերն
նախ եւ յառաջ որդի նման լըը-
նութիւն կ'ելլեն: Ասոնք արտա-
քոյ կարգի դիւրաշարժ եւ շատ-
կեր են, շատ արագ կը մեծնան՝
եւ մինչեւ որ որոշ մեծութեան
հասնին շատ անգամ իրենց
խորիւր կը փոխեն. առայս ոմանք
քանի մ'օրուան կամ շաբա-
թուան կը կարօտին, իսկ ոմանք
նաեւ շատ տարիներու: Յետոյ
միջատին կենացը մէջ դադարում
մը կը մտնէ, ուտելէ եւ շարժելէ
կը դադրի եւ դարձեալ ուրիշ
կերպարանք մը կ'առնու: Ամբողջ
միջատին բոլորտիքը թաղան-
թեայ կեղեւ կամ պատեան մը
կը կազմուի, որուն մէջ դադարի
մէջ հանգչելու պէս հանգարտ
կը մնայ եւ այս կ'անուանուի
իծկած: Շատ անգամ ասոր վրան
ալ քոճոճ մը կ'ըլլայ, զոր մի-
ջատն ինքնին՝ բարակ, մետաղա-
ծէ նման հիւսուածքէ կը շինէ: Այս
մեկնակ կամ կրկին պատեանի
մէջ միջատն երկայն ատեն (կամ
կարճ) կը մնայ, եւ ասոր մէջ
երթալով կամաց կամաց կատա-
րեալ միջատի կը փոխուի: Պէտք
չէ իծկածն ու քոճոճն իրարու հետ
ծակի եւ միջատն իւր վերջի ան-

ԿԱՐԴ 1. ՊԱՏԵՆԱԹԵԻԵՐ ԿԱՄ ԲՆԴԵՌՆԵՐ (Coleoptera)

Պապենախե-էրը ծամող բերան ունին, երկու կարծր պատեան եւ երկու թաղանթեայ թեւեր, կատարեալ փոփոխութիւն կը կրեն: Ասոնցմէ մինչեւ 80.000 տեսակ կը ճանչցուի, իսկ քարացած միայն 1000 տեսակ:

Պատենաթեւերը կը բաժնուին 18 գլխաւոր ցեղերու:

ՑԵՂ Ա. ԲԱՋՄԱԹԵՐԻԹ ԲՈՂԿՈՒԿԱԹԻՐՆԵՐ (Lamellicornia)

192. Զորեակը (Melolontha vulgaris): Ընդհանուր գոյնը սեւ է, բայց թեւերն, ոտուրներն ու թեւերու ծածկոյթները կարմրագոյն գորշ



Պտկ. 297. Զորեակ (վարը՝ թրթուրն ու կծկածը):

են: Գլխուն երկու կողմն են բողկուկները, որոնց ծայրը՝ հաստ է, եւ հողմահարի պէս շարուած 6—7 թերթիկներէ կազմուած է, ասկէ ա-

ուած են Բազմաթիւ Բողմանա-որ անունը: Կուրծքն ալ երեք կտորէ կամ օղակներէ կազմուած է, որոնց վրայ ոտուկներն ու թեւերը կան: Փորը՝ 6 հատ եղջերային, սեւ օղակներէ կազմուած է, որոնց եզերքը՝ ճերմակ գունով երեքանկիւնի կողմնական թերի կան, ետեւի ծայրն՝ երկայն եւ վար ծռած յաւելուած մ'ունի:



Պտկ. 298. Զորեակի բողմանը (5 անգամ մեծ):

Բեւալից կը զարգարին, եւ տերեւները, ծաղիկներն եւ պողպ կոկոնները կըծելով շատ անգամ ահագին փնաս կու տայ, մանաւանդ եթէ՝ ինչպէս տեղիս տեղիս ամէն չորս տարի կ'ըլլայ, ահագին բազմութեամբ ըլլայ:

Ցերեկը հանգարա ծառերու վրայ կը կենայ, բայց իրիկունը կը սկսի ասոնց բոլորտիքը բզզալ: Չու անելու համար ճճիները գետինը կը փորեն եւ մէջը կը մտնեն: Իսկ ձուերէն՝ 4—6 շաբաթ ետքը սաստիկ փնասակար թրթուրներ կ'ելլեն, հոգին մէջ 3—4 տարի կը մնան: Չորրորդ ամառուան վերջերը կը կծկին եւ յաջորդ դարնան իրեն կատարեալ միջատ երեւան կու դան: — Զորեակը ջնջելու ամենալաւ միջոցն է ծառերը թռթուրէն ու միջատները ժողովելը. երկիրն ալ պէտք է բրել կամ հերկել, որով թրթուրները հոգին երեսը կ'ելլեն, թռչունները զատուք կը ժողովեն կը սպառեն: Յունիսին խոտակէտ դաշտերուն վրայ կ'երեւայ բայց դեղին խոտէն (Rhizotrogus solstitialis), որ նոյնպէս վերինին չափ թէ շատ կ'ըլլայ եւ թէ փնասակար է:



Պտկ. 299. Ոսկի եզնակ (Բ. մ.):

193. Ոսկի եզնակը (տճ. գլխ.) (Cetonia aurata): Զորեակէն քիչ մը պզտիկ է, բողմուկներն երեք թերթերէ կազմուած են, մարմինը՝ ոսկեգոյն կանանչ, տափակ եւ վերջի ծայրը՝ բլրածայր է, իսկ փորի կողմը պղնձի կարմիր գունով կը ցոլանայ:

Պարտեզներու մէջ վարդենիներու վրայ առատ կը գտնուի եւ վարդերը կը բզկտէ. արտաքոյ կարգի զարմանալի եղանակաւ թրթուրը միջնոցներու մէջ կ'ապրի:

194. Կոյադնիքի (Geotrupes stercorarius) սեւ գունով է, կոնակի կողմը մետաղի կանանչ, իսկ փորին կողմը՝ երբեմն կապոյտ: Բողմուններուն ծայրը հողմահարի ձեւով երեք թերթեայ սեպ մը կայ, մարմինը խիստ կոր է, կարծր պատեան մ'ունի, եւ շատ զօրաւոր է, պարանոցի վահանը՝ հարթ է, իսկ պատեանները՝ կէտ կէտ խողովակաձեւ:



Պտկ. 300. Կոյադնիքի (Բ. մ.):


Կոյադնիքիները դանդաղ եւ շատ ծանր կը քալեն, իրիկունները բզզալով կը թռչին, թէ իրենք եւ թէ իրենց թրթուրներն ընտանի անասնոց քակորներու եւ աղբերու մէջ կ'ապրին:

Տնկաստաններն եւ անուներու մէջ շատ կը գտնուի նաեւ շագանակագոյն գորշ Եղջիբէշիւը (*Oryctes nasicornis*) որ նշանաւոր է գլխու վահանին վրայ ունեցած կոր եղջիւրովը:

Հերիւլի Բէշիւն (*Dinastes Hercules*) ալ՝ որ բոլոր ճճիներու մէջէն աւելին մեծն է, եւ Հարաւային Ամերիկէ կը գտնուի, վերինին պէս՝ ճակտին



Պտկ. 301. Եղջիբէշիւ (Բ. մ.):




Պտկ. 302. Հերակոյի բզէզ (Գ/Ե):

վրայ եղջիւր մ'ունի, բայց պարանոցի վահանին արմատէն ելած՝ գէպի վար ծռած երկրորդ եղջիւրն առջինէն աւելի մեծ է:

ՑԵՂ Բ. ՍՆԵԳՐՈՂԿՈՒԿՆԵՐ (*Pectinicornia*)

195. Եղնածճին (*Lucanus cervus*) Եւրոպայի մեծամեծ ճճիներէն մէկն է: Գոյնը սեւ, իսկ վերի կողմը շագանակագոյն գորշ է. վերի մեծ կզակովը նշանաւոր է. արուին կզակը եղջիւրներու պէս ճիւղաւոր



Պտկ. 303. Արու եղնածճի (մեծը) եւ էգը (փոքրը) (Բ. մ.):

րեալ է: Երկայն, սանդրաձեւ բողկուկներուն մէջտեղը ծունգի ձեւով կորացած է, ասկէ կ'առնուն իրենց անունը: Գլուխն արտաքոյ կարգի լայն եւ քառակուսի է, եւ նոյնակազմ պարանոցի վահանակէն շատ մեծ է:

Այս մեծ ճճին՝ կաղնիի անտառներու մէջ կը գտնուի, եւ իւր զօրաւոր վերի կզակով մատաղ ճիւղերը ծակելով անոնց հիւթով կը մնան: Չուերը՝ փտած կաղնիի բուններուն մէջ կը գնէ, որոնց մէջ որդանման թրթուրները վեց տարի կը մնան մինչեւ որ կատարելապէս կերպաւորուին: Այս ճճին մեծութեան կողմանէ շատ զանազան է: Իգբերը զգալի կերպով պզտիկ են եւ միայն փոքրիկ կզակներ եւ մանր գլուխ ունին:

ՅԵՂ Գ. ՍԵՊԱՐԱՂԿՈՒԿՆԵՐ ԿՈՄ ԴԻՈԿԻՐՆԵՐ (Clavicornia կամ Silphida)

196. ՄԵՆԵԼԱՄԻԱՂԸ (Necrophorus Vespillo) սեւագոյն է, եւ թեւերուն ծածկոցներուն վրայ երկու հատ նարնջի դեղնութեամբ շերտեր ունի. սկաւառակաձեւ վզի վահանին առջեւի կողմը խիտ, ոսկեգոյն-դեղին մազերով ծածկուած է, կարճ բողկուկներուն ծայրը հաստ է, (այս ցեղն ասկէ կ'առնու սեպաքողկոսէ անունը): Թեւերուն կարճ պատեանները մինչեւ փորին վերջի ծայրը չեն հասնիր:




Պտկ. 304. Մենելամիալը (քիչ մը մեծց.):

Այս օգտակար ճճին՝ սատկած մկներու եւ խլուրդներու դիակներուն քովը շատ կը տեսնուի, անոնց տակի հողը կը փորէ, մեկդի կ'առնու եւ զանոնք բուրուրովն կը թաղէ: Յետոյ այս դիակին վրայ իւր ձուերը կ'ածէ, որպէս զի նոր ելած ձագերն անմիջապէս ուտելու կերակուր գտնեն:

ՅԵՂ Դ. ԴԻԻՐԱԴԱՐՁՆԵՐ (Elaterida)

197. ԴԵՐԱԴԱՐՁՆԵՐ (Elater segetum) գորշագոյն է եւ մոխրագոյն մազերով ծածկուած. խորունկ գծերով պատեաններ ունի, իսկ բողկուկներն ու ոտուրները կղմնարի պէս կարմիր են: Մարմինն՝ երկայն բարակ, գլուխը՝ փոքր, բողկուկները՝ սղոցանման, իսկ վզի վահանը պայտի ձեւով եւ շատ մեծ է:



Պտկ. 305. Դիւրադարձ (Բ. մ.): բար թրթուրն արմատներ կրծելով ըստ բաւականի շնաս կը հասցընէ:


Ջերմագոյն Ամերիկա այնպիսի դիւրադարձներ կը գտնուին, որ դիւրը պայծառ լոյս մը կը տարածեն. (օրինակի աղաքաւ Կոֆու կղզոյն

վրայ գտնուած՝ Լ-սառնակը կամ Գիշերա-տիլա (Pyrophorus noctilucus):

Այս ցեղին տակ կ'երթան ջերմ գաւառներու ուրիշ բազմաթիւ ձգիներ, որոնք իրենց կենդանի եւ պայծառ գոյներովը նշանաւոր են, դիւրագործներու կը նմանին եւ ըստ բաւականի ալ մեծ կ'ըլլան, ասոնք ընդհանուր անուամբ Հիշ ձգիներ կ'անուանուին. ամէնէն երեւելին է Հիշ իռլիէրը (Buprestis Mariana), որ նոյնպէս Եւրոպա ալ կը գտնուի:

ՑԵՂ Ե. ՓԱՓԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ (Malacodermata)

198. Բոռն փոստ-բոռն (Կայծառ-իլ, Լ-սառնակ, Lampyris noctiluca) կակուղ մարմին մ'ունի երկայնաձեւ. տափակ եւ գորշ է: Գլուխն եւ մեծ աչուքները վզի վահանին տակ ծածկուած են, իսկ բողկուկները սանդղաձեւ են: Էգն անթեւ է եւ որդանման թրթուրի կը նմանի: Փորին վարի կողմը՝ բաց դեղին գունով բիծ մը կայ՝ որ կենդանին ողջ եղած ատեն գիշերը՝ զօրաւոր եւ փոսփորի պէս փայլուն լոյս մը կ'արձակէ:



Պտկ. 306. Փոստուա:

էգը. թրթուրը. արուն:

Կայծառիկը՝ գիշերային միջատ է, ամառուան տաք իրիկունները՝ ի մասնաւորի Յունիս ամուռան վերջերը՝ հրային կայծերու պէս օդի մէջ ասդին անդին կը թռչտին, եւ կամ վառած հրատի մը պէս խոտի կամ մացառներու մէջ կը գտնուին: Ամէն տեղ հաւատարապէս շատ չի գտնուիր, թըռռչող արուելի լոյսը՝ անթեւ էգին լոյսէն տկար է:

Այս ցեղին տակ կ'երթայ Գորշափոստ չիւն-ձգի (Telephorus fuscus):

Յափշտակիչ միջատ մըն է, գլխաւորաբար վարդի լուծներու կամ ափսններու ետեւէն կ'իլ-նայ. Չիւն-ձգի ըսուած է այս միջատը, վասն զի ասոր՝ թաւշի պէս սեւ թրթուրը՝ երբեմն ձմեռը դուրս կ'ելլէ եւ ձեան վրայ ասդին անդին կը սողայ:



Պտկ. 307. Գորշ ծիւնաձոծի (Բ. մ.):

ա. միջատ. բ. թրթուր.

ՑԵՂ 2. ՓՆՏՆԿԱՅԻՆՆԵՐ (Xylophaga)

199. Ուրիշ կամ Փայտի ձգի (Anobium pertinax) սեւագոյն գորշ մանր միջատ մըն է եւ դէպ ի երկայնութեան կէտ կէտ բծերով պատեաններ ունի: Մարմինը՝ կարծր եւ գլանաձեւ է, բողկուկները՝ բարակ, վզի վահանակն ալ գրեթէ բոլորովին կը ծածկէ գլուխը: Այս փնասակար միջատը զանազան փայտէ կարասեաց մէջ կը գտնուի, զասոնք կը կրծէ ու կը ծակծկէ: Կարծասորուն թրթուրը՝ որդի կը նմանի, եւ փայտն ամէն ուղղութեամբ կը փորէ:



Պտկ. 308. Ուտիծ կամ Փայտի ձոծի:

Այս միջատը *Թախ* (pertinax) կոչուած է, վասն զի ամենաթեթեւ կերպով գպչելու գ պէս ոտուքները կը քաշէ, մեռած կը ձեւանայ, եւ ամենեւին չի շարժիր, նոյն իսկ եթէ ասեղով մը շամփրես ու շարժես: Գլուխը փայտին զարնելով՝ ծոցի ժամացուցին զարնելուն նման ձայն մը կը հանէ, անոր ժամար աւելորդապաշտ մարդիկ իհարկէ իհարկէ (horloge de la mort) անուանած են:



Պտկ. 309. Հացի ծոցի:

Փայտակերտ կազմածքներու մէջ ասոր նման ուրիշ մանր միջատներու տեսակներ ալ կը գտնուին: Հոցի ճճին (*Anobium paniceum*) կամրագորշ գունով մանր միջատ մըն է, չոր տակերու ժողովածոյքները կ'ապականէ:

200. Հասարակ մորմակեղը (*Dermestes lardarius*) սեւագոյն է, թեւերու ծածկոցներուն առջեւի կէսը մոխրագոյն է եւ երկու կողմը՝ երեք-աւան սեւ բծեր կան: Մարմինը՝ հաւկթածեւ է, բողկուկները՝ կարճ եւ սեպաձեւ, իսկ գլուխը մինչեւ աչքերը՝ վզի վաճառին մէջ ծածկուած է:



Պտկ. 310. Մորթակեր (*Յպատիկ մեծ*.) մէջտեղը՝ թրթուրեւ կծկած (զծերը՝ քն. մեծութեան չափերն են):

Այս արտաքոյ կարգի ֆնասակար միջատին թրթուրը՝ կարծր մազերով ծածկուած եւ սեւագոյն գորշ է եւ անասնոց մորթերուն, մուշտակներու, նաեւ տան կահ կարասեաց եւ բնական պտածութեան ժողովածոյքներու մէջ կը գտնուի: Այս ճճին ալ շօշափուելուն պէս մեռած կը ձեւանայ: Նոյնպէս մանր՝ Թանգարանաց ճճին (*Anthrenus museorum*) կենդանաբանութեան թանգարաններու անհաշտ թրշնամին է, եւ շատ անգամ ծաղիկներու եւ երբեմն նաեւ խցերու մէջ ալ կը գտնուի. գպչելուն պէս մեռած կը ձեւանայ:

ՑԵՂ Է. ԿՐՐԱԹՅԻՆԻՐ (Staphylinida կամ Brachyelytra)

201. Կարմրալէւ խաղողէփեացը (*Staphylinus erithropterus*) երկայն բարակ մարմին մ'ունի, որուն վրայ տեղիս տեղիս բաց դեղին գունով մազեր կան: Բողկուկները թելի պէս են, գլուխը՝ կլոր, մեծ եւ պարանոցի վահանէն աւելի լայն է: Մութ կարմիր գունով թեւերու ծածկոյթները զգալի կերպով կարճ են եւ փորին միայն առաջին օղակը կը ծածկեն:




Արագաշարժ միջատ մըն է, մարմնոյն ձեւովը՝ ունկնամուտին շատ կը նմանի, բռնուելու ատեն փորը վեր կը տնկէ եւ սաստիկ հոտ մը կ'արձակէ: Թէ ասիկայ եւ թէ ասոր ուրիշ տեսակները՝ դիերով, աղբով եւ փտած տնկային նիւթերով կ'ապրին:

Պտկ. 311. Կարմրալէւ խաղողէփեաց (*Ք. մ.*):

ՅԵՂ Ը. ԼՈՒՂԱԿՆԵՐ (Dyticida)

202. Ծրագդեղ կամ Ծրո՛ղ ջրեղեղ (Dytiscus marginalis): Թեւեւ բոլոր պատեանները սեւ են, բայց եզերքը ժապաւենի ձեւով լայն դեղին գիծ մը կայ եւ վրան դէպ ի երկայնութեան խորունկ գծեր կան: Երկայն բողկուկները՝ գերձանի պէս բարակ են: Ետեւի սրունքներն առջեւիներէն աւելի զօրաւոր են եւ կողմնակի ճընշուած, երկայն աղուամազերով ոտուրներ ունի:



Պտկ. 312. Ծրագդեղ
(Բ. մ.):

Ծրագդեղը՝ արտաքոյ կարգի շատակեր միջատներէն է, աւազաններու եւ ուրիշ մնայուն ջրերու մէջ կ'ապրի: Շատ քաջ կը լողայ եւ միայն գիշերը կը թռչի, շունչ առնելու համար իւր մարմնոյն կէտը (ետեւի մասը) ջրէն դուրս կը հանէ եւ թեւերուն պատեաններն ալ քիչ մը վեր կը վերցընէ: Ասոր թրթուրը շատ երկայն եւ բարակ կ'ըլլայ, վերի կզակը շատ մեծ է, վեց ոտք եւ մարմնոյն ետեւը՝ շունչ առնելու համար երկու հատ խողովակիկներ ունի: Ոչ միայն միջատ, որդ եւ խղունջ, այլ նաեւ ձկան կիթ եւ պզտիկ ձկնիկներ ալ կ'ուտէ, եւ նոյն իսկ մեծ ձկերու մարմնոյն վրայ ալ ծակեր կը բանայ:

ՅԵՂ Թ. ԶՐԱԴԱՐՁԻԿՆԵՐ (Gyrinida)


Հասարակ ջրալըջիկը (Gyrinus mergus): Զարմանալի մանր կենդանի մըն է. սեւ գմբեթաձեւ մարմին մ'ունի, աչուրներն երկու մասի կը բաժնուին, այնպէս որ կեսովը ջրոյ մէջ կը տեսնէ, իսկ միւս կեսովը՝ օդի մէջ: Կարճ եւ իլաձեւ բողկուկներ ունի: Արտաքոյ կարգի յափըշտակիչ է ասոր թրթուրը, եւ սնամէջ խողովականման կզակներով իւր որսը կը ծծէ:

Ամառ ատեն մնայուն ջրերու մէջ եւ վրան՝ բազմութեամբ կը գլուխուրի:


ՅԵՂ Ժ. ԶՐԻՋԻՋՆԵՐ (Hydrophilida կամ Palpicornia)

203. Սեւաւոյր ջրեղեղ (Hydrophilus piceus) տափակ հաւկթաձեւ է եւ կարաձիւթի սեւութեամբ, իսկ սեւագոյն գոյշ փորը՝ արտաքոյ կարգի ողորկ եւ փայլուն է, միայն կուրծքին վրայ՝ կարծր եւ պառկած մազեր կան: Սեպաձեւ բողկուկները կարճ են, ընդհակառակն գերձանի ձեւով երկու ուտելու շոշափուկները շատ երկայն են, ոտուրները՝ տափակ, երկու կողմանէ ճնշուած եւ թանձր մազերով պատած են եւ լողալու շատ յարմար են:

Այս մեծ, ծոյլ եւ դանդաղ միջատը մնայուն ջրերու մէջ կ'ապրի, եւ իրիկունը դուրս կ'ըլլէ եւ կը սկսի թռչիլ: Թրթուրը՝ ջրոյ մէջ կ'ապրի, 0.05 հր. երկայն կ'ըլլայ եւ ջրային ձգիներով ու խղունջներով կը սնանի, իսկ ընդհակառակն միջատը տնկային նիւթեր կ'ուտէ:



Պտկ. 313. Սեւաթոյր ջրբզէզ (Բ. մ.):



Պտկ. 314. Արջնաթոյր բզէզ (Բ. մ.):

ՅԵՂ ԺԱ. ԳՆԱՅՈՒՆ ԲՁԷՋՆԵՐ (Carabidae)

Տասնութէկ յօդուածէ բաղկացեալ բողկուկներ ունին այս միջատները, մանր գլուխ մը, բայց ամուր կզակներ:

204. Պշխագոյն գնայուկը (Carabus cancellatus): Կոնակի կողմը պղնձի գունով, իսկ տակը՝ սեւ է: Թեւերու ծածկոցներու վրայ երեք հատ երկայն բարձրացած գծեր կան, եւ ասոնց մէջտեղն ալ շղթայակերպ մանր ուռուցիկ բծեր:

Ամէն տեղ պարտէզներու եւ դաշտերու վրայ շատ կը գտնուի, արագ արագ ասդին անդին կը վազէ, եւ գտածը կը բռնէ, կ'ուտէ: Բայց ի մասնաւորի կողինջ, որդ եւ թրթուր շատ կը սիրէ:

Գնայուն բզէզներու ուրիշ տեսակներն ալ ասոր պէս օգտակար ճճիներ են, եւ ասոր նման՝ անախորժ հոտ մը կը բուրեն. ինչպէս Մանուկագոյն գնայուկը (Carabus violaceus), Ուրբիւշ (C. auratus)՝ որուն վերի կողմն ոսկեգոյն կանանչ, իսկ տակը՝ սեւ է, բաց սեւ գունով՝ Արջնաթոյր բզէզը (C. coreaceus) եւայլն: Ուրբիւշի բնակիչը (Brachinus crepitans) ալ ասոնց կարգին տակ կ'երթայ, հազիւ 0.008 հըր. երկայնութեամբ միջատ մըն է, կղմնարագոյն կարմիր՝ իսկ փորի կողմը սեւագոյն է, պատեանները՝ սեւագոյն գորշ են. դըր-դուռելու տոհմ թշնամեացը դէմ զգալի շառաչմամբ կապոյտ հիւթ մը կը սրսկէ:

205. Մշխածին (Calosoma Sycophanta) մութ մանուշակագոյն գունով ամենագեղեցիկ գնայուն բզէզներէն մէկն է, բերանը, բողկուկներն եւ ոտուկները սեւ են: Թեւի ծածկոցներն ոսկեգոյն կանանչ եւ պղնձի պէս կը շողողան եւ դէպ ի երկայնութեան գծեր ունին:

Այս ճճին մշկահոտ հիւթ կը սփռէ, թէ ինքն եւ թէ թրթուրը ծառերու վրայ՝ փնտսակար թիթուան որդերով ու կծկածներով կ'ա-



Պտկ. 315. Մշկամծի (քիչ մը մեծց.):

Պտկ. 316. Աւազաբզէզ եւ թրթուրները:

պրին. ուստի եւ շատ օգտակար են: — Այս ցեղին առկ է'երթայ հոս նկարուած Աւազ-բզէզը (*Cicindela campestris*):

ՅԵՂ ԺԲ. ՄԵՆՈՍՄԱՐԻՆՆԵՐ (Melanosomata)

206. Աղօղեպանը կամ Ալեքսիշապը (*Tenebrio molitor*) սեւ գու-նով պատեաններ ունի, փորն ու սրունքները՝ կարմիր գունով են: Մարմինը՝ երկայն բարակ, եւ միաչափ լայն է, վրէ վահանակը գրեթէ չորեք-կուսի, բողկուկներն ալ ժապաւենի ձեւով:

Ցորենի համբարանոցներու, ջաղացքներու եւ հացագործներու քով շատ կը գտնուի: Աս հասարակ ծանօթ եննաեւասոր դեղնազոյն թրթուրներն ալ, “ալ-բէ” որդ” կ'անուանուին. եւ որովհետեւ միջատակեր երգեցիկ թռչնոց կեր կ'ըլլան այս թրթուրներն, անոր համար երբեմն մասնաւոր պտուկներու մէջ՝ քիչ մը թաց հացով, թեփով, կտաւի կտորուանքներով (կոսթերով) եւ այսպիսի բաներով կը բազմացուին:



Պտկ. 317. Աղօղեպան. Պտկ. 318. Մահազուշակ եւ միջատ եւ թրթուր (մեծց.):

Թրթուրը (Բ. մ.):

Մահաբուշակը կամ Մեռելաճիւն (*Blaps mortisaga*) ասոնց կը վերաբերի, սեւ գունով՝ եւ շատ դժբերթածեւ մարմնով բզէզ մըն է. լոյսէ կը փախչի, փտտած փայտերու մէջ կ'ապրի եւ երբեմն տներու մէջ ալ

կը գտնուի. յառաջագոյն աւելորդապաշտութեամբ մահուան կարգապետ կը համարուէր, անշուշտ իւր սեւ գունին եւ ժանտահոտութեանը համար:

ՅԵՂ ԺԳ. ԳԵԼԱՐԵԾԻՆՆԵՐ (Vesicantia)

207. Խաբանածին կամ Ասպոթոյ Էղնակը (Cantharis vesicatoria) փայլուն կանանչ գունով է: Երկայնաձեւ մարմինը՝ կակուղ,




Պտկ. 319. Խաբանածին (P. մ.) տերեւներու վրայ, վարը՝ Թրթուր:

գլուխը՝ մեծ եւ վզի վահանակին չափ լայն է, իսկ բողկուկներն՝ երկայն եւ դերձանի նման:

Յունիսին՝ հացւոյ, սպանիական շեփորուկի եւ կիպրոս ծառերու վրայ շատ կ'ըլլայ եւ այս ծառերուն տերեւները կ'ուտէ: Շատ զօրաւոր եւ կծու հիւթ մ'ունի այս միջատը, կը չորցուի, կը փոշիացուի եւ գեղերու մէջ՝ գլխաւորաբար պալարի սպեղանիներ շինելու կը գործածուի: Բայց այս ընելու ատեն՝ ինչպէս նաեւ ժողկելու ատեն, մեծ զգուշութիւն պէտք է, վասն զի մատուրները կ'ուռեցնէ:

208. Իղանճի կամ Մայիսի ողբ (Meloë proscarabaeus) կապուտակազոյն սեւ, հաստ եւ լայն բզէզ մըն է, եւ քիչ մը կոյաղնդուան կը նմանի: Բայց մարմինը կակուղ է, թեւերու պատեանները շատ կարճ են, իսկ բուն թեւեր ամենեւին չունի, բողկուկներն ալ՝ ժապաւնի կը նմանին:



Պտկ. 320. Իղանճի (P. մ.):

Մայիսի ողբն՝ արդէն գարնան սկիզբները ճամբաներու քովեր խոտերու վրայ շատ կը գտնուի. դանդաղ միջատ մըն է. եթէ մէկը ասոր փափուկ մարմինը շօշափէ, դեղին եւ գարշահոտ հիւթ մը կ'արձակէ, եւ այս հիւթն ոմանց մորթին վրայ կոծիծ եւ ուռեցքներ կը հանէ, բայց խաբանածնոյն ճիւղներէ չափ զօրաւոր չէ: Շատ անգամ մեղուները՝ բոստ պատահման ծաղիկներու վրայէն ասոր թրթուրը մէկ տեղ կ'առնուն,

փեթակը կը տանին. այս է պատճառն որ շատ անգամ փեթակներու մէջ կը գտնուի թրթուրը:

ՑԵՂ ԺԴ. ԿՆՃԹԱՌՈՆԻԴ (Curculionida)

209. Երէւիլը կամ Արմաէայ Կնճիւտաւորը (Calandra granaria) կարմրագորշ գունով, գլանաձեւ եւ շատ կարծր մարմնով ճճի մըն է:

Ամենաշնորհաւոր ճճիներէն մէկն է, եւ շատ անգամ արդէն մեծամեծ համբարանոցներ ապականած ու սպառած է:

Միջատը՝ իւր բարակ կնճթովն արմատեաց հատերուն վրայ ծակ մը կը բանայ, մէջը ձու մը կը դնէ, որմէ տոգոյն գունով անոտն թրթուրը կ'իլլէ: Թրթուրը՝ ցորենն այնպէս կ'ուտէ, որ միայն արտաքին կեղեւը կը մնայ եւ ասոր մէջ ալ կը կծկի: Այս միջատն շատ փնասակար բլլալուն պատճառն է արտաքին կարգի շատ բազմանալը (մէկ զոյգէն՝ մէկ տարուան մէջ՝ 6000 ճճի կ'իլլէ). եւ զարմանալի է, այս միջատին տուած փնասն արտաքուստ շուտ չ'իմացուիր: Այս արտաքին կարգի ապականիչ միջատին ամէնէն ազդու դեղն է՝ համբարանոցներն ստէպ ստէպ հովածփել եւ արմատիքը թիով վեր վար խառնել: Որչի միջերանոցներն ալ Որչիւիէ անուամբ ասոր նման կնճթաւոր մը կ'ըլլայ:



Պտկ. 321.
Երւիլ (մեծց.):

210. Ուրուան ճճին (Bruchus pisi) գրեթէ չորեքանկիւն, սեւագոյն գորշ մարմին մ'ունի, որուն փորի վերջին ծայրը ճերմակ բիծ մը կայ: Կարճ եւ լայն կնճիթ մ'ունի, բողկուկներուն ծայրն երթալով կը հաստնայ, ետեւի ոտուկներուն սրուկները հաստ են, թեւերն ալ մարմնէն աւելի կարճ:

Այս միջատն՝ իւր ձուերը ուրուան կը ճնշեն եւ մէջ կը դնէ: Հաստ, ճերմակ եւ անոտն թրթուրներն ամէն մէկ ուրուան հատերուն մէջ կը մտնեն եւ մէջը կը պարպեն: Թէպէտ պզտիկ ճճի մըն է, սակայն եւ այնպէս երբեմն այնչափ շատ կ'ըլլայ, որ նաեւ ուրուան մեծադէզ միջերանոցներն ալ կ'ապականէ:



Պտկ. 322. Ուրուան ճճի (մեծց.):

211. Այգէհալը (Rhynchites betuleti) մետաղի փայլունութեամբ, կանանչ կամ պողպատի կապոյտ գունով գեղեցիկ միջատ մըն է: Վզին վահանակը մանր կէտերով զարդարուած, թեւերու ծածկոցները՝ մեծ եւ մանր կէտերէ կազմուած դէպ ի երկայնութեան շերտեր ունին: Արուն վզի վահանակին քովերը երկու հատ՝ դէպ ի առջեւ ուղղուած փշեր ունի:


Գարնան որթատնիկ տերեւներուն կոթունները մինչեւ կէսը կը կորէ եւ տերեւներուն ներսի երեսին վրայ քանի մը ձու դնելէն ետքը զանոնք կը գալարէ: Տերեւները կը չորնան եւ յետոյ կը թափին, եւ ա-

սով պտուղներուն շատ քիչս կը հասցընէ, որովհետեւ առանց տերեւի չեն կրնար ածիլ: Նաեւ պտղատու ծառոց ալ քիչս կու տայ:

Ասոր նման է Պնչափոյ Բնիւսը կամ Սուրբ Գնի (Rhynchites cupreus). ձուերը պզտիկ սալորներու եւ ծիրաններու վրայ կը գնէ եւ կնճթովը պտղոց կոթունները կը կրծէ, այնպէս որ պտուղները չհասած կ'իյնան: Նշանակէս ուրիշ կնճթաւորներ ալ մի եւ նոյն կերպով խնձորներու եւ տանձերու կը քնասեն:



Պտկ. 323. Այգեհար. վարը՝ կնճիթն ու բողկուկը (մեծց.):



Պտկ. 324. Կաղնոյ կնճթաւորը. վարը՝ կնճիթը (շատ մեծց.):

212. Կաղնոյ կնճիւսը (Balaninus nucum) մոխրագոյն գորշ գունով միջատ մըն է, խիտ մազերով ծածկուած:

Չուերը՝ կակուղ կաղիններու եւ խոզկաղիններու վրայ կը դնէ եւ ա. մէն մէկ պտղոյ վրայ մէյ մէկ հատ:

213. Փիճէկէրը կամ Շոճոյ Դիւայը (Hylobius pini) անտառներու ամենամեծ եւ ամենաքնասակար կնճթաւոր միջատն է, մուժ



Պտկ. 325. Փիճէկեր:

ա. միջատ. բ. թրթուր. գ. կեկած:

նն: Երկայնաձեւ եւ արտաքոյ կարգի կարծր մարմինը՝ ժանկագոյն կար-

գորշ գունով եւ երբեմն կարմրագոյն կ'ըլլայ: Կնճիթն ըստ բաւականի հաստ եւ դէպ ի վար ծռած է, բողկուկներն ասոր ծայրն են, եւ գրեթէ կլոր վզի վահանակին չափ երկայն

միր մազերով ծածկուած է, թեւերու ծածկոյթներուն վրայ հաստ դեղին բծեր կան:

Կոնարեր ծառաց անտառներու մէջ շատ կը գտնուի, բայց գլխաւորաբար շոճիներու եւ եղեւիններու վրայ կ'ըլլայ: Թրթուրները կտրուած ծառաց կոճըղներուն մէջ կ'ապրին: Աւելի քնասակար են նոյն իսկ ճճիները, վասն զի ծիւրը կ'ուտեն, բունները, ոստերն ու արմատները կը կրծեն: Չասոնք ջնջելու կ'աշխատին ծառերու վրայ ծակեր բանալով՝ եւ կոճըղները գուրս հանելով:


Բրաքիւլայի շոճին (Entimus imperialis) գեղեցիկ կնճթաւոր միջատ մըն է, սրուն սեւ մարմնոյն վերի կողման վրայ բշտիկներ կան, եւ թէ կռնակի կողմն եւ թէ փորին կողմը պզտիկ թեփերով ծածկուած է, եւ արեւու լուսովը՝ ծիածանի ամէն գոյները կը ցոլացընէ:



Պտկ. 326. Շոճի
(Բ. մ.):

ՅԵՂ ԺԵ. ԽՈՋՆԵՆԻՐՆԵՐ (Bostrichidae)

214. Բռնի Կանդակագործը (Bostrychus typographus) խոզանածեւ մազմզուկներով ծածկուած մանր ճճի մըն է, գորշ գունով եւ



Պտկ. 327. Հանդակագործին ծառի մէջ ծակերը. Չախ կողմն միջատ մը եւ կծկած մը (վարը՝ քն. մեծութեամբ). իսկ վերը՝ միջատը (շատ մեծց.):

բոլորովին գլանածեւ մարմին մ'ունի: Պզտիկ գլուխը՝ մեծ ու գմբեթածեւ վզի վահանակին տակ գրեթէ բոլորովին ծածկուած է, բողկուկ-

ները շատ կարճ են եւ ծայրերը՝ սեպ մը կայ: Թեւերու ծածկոցներուն ծայրը շատ ներս ճնշուած է եւ երկու կողմն ալ շեղ եղջերուն վրայ չորս հատ ակուններ կան:


Թէպէտ այս քանդակագործը շատ մանր ճճի մըն է, բայց թէ տիկա եւ թէ քանդակագործներուն ուրիշ տեսակները շատ փոքրակար են, եւ երբեմն մեծամեծ եղջերի տնտառներ տպականած են: Մայիսին սկիզբները կամ մէջերը գուրս կ'երլէ, եղջերիներու կեղեւներուն մէջ կը մտնէ, եւ ձուերը ածելու համար հոն երկայն ուղիղ ծակ մը կը բանայ:

Չուերէն երած Թըթուրները՝ պղտիկ, առանց ոտքի, գեղնագոյն ճերմակ որդերու կը նմանին, այս փորուած ծակէն սկսեալ կողմակի օձաձեւ զարդարուն ճաքաններ կը բանան, որոնք երթալով կը լայնան, եւ ծայրը կը կծկին: Երբոր ճճիները կը կերպաւորին, իրենց որորոցէն՝ (այսինքն կծկածին դանուած անդէն) սկսեալ ուղղակի առջեւի կեղեւը կըծելով ծակեր կը բանան՝ որոնք հրապանի գնդակիկներու կը նմանին: Հասարակօրէն ձու ածելու համար փայն հին, փառած, չորցած կամ հովէ տապալած ծառեր կամ բուներ կամ կարուած փայտեր կ'ընտրէ միջառը:

Ուրիշ այսպիսի փայտի ապականիչ ճճիներէն յիշուելու արժանի են. Ընօն, Թաղանթակերը (*Hylesinus piniperda*), սեւագորշ գունով մանր միջատ մըն է: Փառակէթիկը (*Lyctus*) եւ ասոր այլեւայլ տեսակները. առանց փորը գէպի վեր ծռած է, Դիպն սաղարթաւոր ծառոց վրայ կ'ապրին:

ՅԵՂ ԺՁ. ԷՆԴԻԿՆԵՐ (*Cerambycida* կամ *Longicornia*)

215. Մշկափաղը (*Aromia moschata*) նեղ, երկայնաձեւ, մետաղի պէս փայլուն կանանչ կամ պղնձագոյն մարմին մ'ունի, կոնակի կողմը




Պտկ. 328. Կաղնէքաղ (*A. մ.*):



Պտկ. 329. Ալպեան քաղիկ (*A. մ.*):

արապքոյ կարգի բարակ եւ բոլորակ կէտեր ունի: Արուին բողկուկները մարմնէն աւելի երկայն, խողանաստեւի նման եւ յօդաւոր են:

Այս միջատը՝ մշկի հոտ մը կը տարածէ, ուռնուց վըայ կ'ապրի, եւ թրթուրն այս ծառը կը ծակէ: — Կաղնիներու վըայ՝ 0.05 հրհ. երկայն գորշագոյն քաղիկ մը կը գտնուի, որ Կ-նէթաղ (Cerambyx heros) կ'անուանուի: Ապեան լեռանց վըայ ալ՝ կապոյտ մոխրագոյն, եւ թաւշի սեւ բծերով՝ Աւշեան Կ-նէթաղ (Rosalia alpina) կը գտնուի:



Պտկ. 330. Այծեղջիւր (Բ. մ.):

216. Հասարակ Կ-նէթաղ (Lamia aedilis) գորշ գունով է եւ մոխրագոյն թանձր մաղերով ծածկուած: Արուին բողկուկները՝ մարմնէն 5 պատիկ մեծ են, էգը՝ ձու ածելու երկայն խողովակ մ'ունի:

Նոր կտրուած ծառերու եւ փայտերու վըայ շատ կը գտնուի, երբեմն նաեւ տներու մէջ՝ գերաններու, տախտակներու եւն, մէջէն նոր դուրս կ'ելլէ: Բայց ասկէ աւելի շատ կ'ըլլայ բնակարաններու մէջ՝ Հեռաղ Կ-նէթաղ (Lamia textor), որ կարծր բողկուկներ ունի, եւ վզի վահանակին ու թեւերու պատեաններուն վըայ հատ հատ կուռտեր ունի:

Սօսի ծառոց վըայ մեծ քաղիկ մըն ալ կայ, որ Սօսի Կ-նէթաղ (Saperda carcharias) կ'անուանուի, որուն կռնակի կողմը բազմաթիւ փայլուն սեւ խոռոչներ կան:

ՑԵՂ ԺԵ. ՑԵՂԻՆԵՐԱՆԵՐԻ (Chrysomelinae)

217. Արդեռ-իւ (կամ Նեղակալի միջատը) (Doryphora decemlineata) կարմրագոյն դեղին գունով միջատ մըն է: Վզի վահանակը՝ սեւ




Պտկ. 331. Սօսեաց քաղածծի (Բ. մ.):

... միջատը. Բ. կծկածը. Գ. թրթուրը:

գոյն թրթուրն ալ ասոնց տերեւներուն վրայ կ'ապրի: Կան քանի մը տերեւամիջատներու ուրիշ տեսակներ, որ գեղեցիկ սովեգոյն-կանանչ կամ մանուշակագոյն կը փայլին:

ՑԵՂ ԺԸ. ԿՈՐՄՐՈՒՅՆԵՐ (Coccinellida)

220. Եօթնկէտեան կարֆէիլը (Ջափիլէ ճֆին) (*Coccinella septempunctata*) գեղեցիկ մանր միջատներէն մէկն է, նշանաւոր՝ իւր կիսագնդի ձեւով մարմնովը, որուն տակի կողմը, փայլուն սեւ ու տափակ է: Թեւերու ծածկոյթները կարմիր են եւ կը փայլին եւ վրան եօթը սեւ կէտեր կան: Վզի վահանակն եւ մարմնոյն ուրիշ մասովքը սեւ են: Բողկուկները՝ կարճ ու սեպաձեւ:



Այս ամէն տեղ տարածուած ծանօթ ճֆին, թէ թրթուր եղած աստեւ եւ թէ միջտո՝ ափսոսեցող կ'ապրի եւ ասով գլխաւորաբար պարտէշներու մէջ շատ օգտակար է: Դպտծիք պէս քրքուկ գեղնութեամբ, սաստկահոտ հիւթ մը կ'արձակէ: Թրթուրը՝ 0.01 հրժ. երկայն է, մոխրագոյն սեւ գունով եւ վրան գեղնագոյն կարմիր բծերով: Բազմաթիւ տեսակներ ունի, ոմանք հազիւ 2 հրժ. մեծութիւն ունին: Ամենատարածուածներն են Հինգկէտեան կարֆէիլը (*C. quinquepunctata*), Եփեթեան կարֆէիլը (*C. bipunctata*) եւ մանաւանդ գեղին Բազմկէտեան կարֆէիլը:

Պտկ. 335. Եօթնկէտեան կարմրիկ (Ջ անգամ մեծց.):

... Թիշաւ. ք. Թրթուր. ք. Կծկաց:

ԿԱՐԳ 2. ԲԱՂԱՆԹԱԹԵՒԵՐ (Hymenoptera)

Թաղանթաթեւերը կրծող բերան ունին, կուրծքի յառաջակողմեան օղակը կռնակի կողմը միջին օղակին հետ միացած է. կատարեալ փոփոխութիւն կը կրեն, չորս հատ թաղանթէ լերկ, թափանցիկ թեւեր ունին, որոնց առաջին երկուքը՝ ետեւիններէն մեծ են: Ոմանց էգերը՝ փորին ծայրը թոյնի սնամէջ խայթոց մ'ունին, զոր ուզած ատեն կրնան եւ քաշել, իսկ ոմանք արտաքոյ կարգի լայն, դուրս երկնցած, բոլորափքեւ երկու փակոցով պատած՝ ձու ածելու խողովակ մ'ունին: Ասոնցմէ քանի մը հազար տեսակ ճանչցուած է: Թաղանթաթեւերը գլխաւորաբար 6 ցեղի կը բաժնուին:

ՑԵՂ Ա. ՄԵՂԱՆԵՐ (Apida)

221. Մեղրագործ Տեղան (*Apis mellifica*) միշտ մեծ բազմութեամբ կ'ապրի (շատ անգամ 15—20 հազար եւ աւելի): Այսպիսի ընկերութիւն մը (որ հայերէն պարս, Գնդակ, Գոնդ Տեղանաց կը կոչուի) ըստ մեծի մասին աշխարհագր. կամ վեղդ ըսուած մեղուներէ

կազմուած է (8000—10.000), ասոնցմէ զատ կան ամէն մէկ ընկերու-
թեան մէջ 600—800 արդու, եւ մի միայն էգ մը, որ Թագուհի կամ
Պարսմայր կ'ըսուի: Աշխատաւորներն ամէնէն պզտիկներն են, թոյնի




էգ.

Պտկ. 336. Մեղու (P. մ.):
արու.

Թագուհի:

խողովակ մը ունին, իրենց ետեւի ոտուրներուն վերի մասունքը շատ
լայն են եւ վրան կարգաւ խողաններ կան, եւ լայն ու տափակ խոչա-
կունքի արտաքին երեսին վրայ խոռոչ մը կայ (որ որք կամ լիւսի կ'ը-
սուի) եւ ծաղկանց փոշին ժողվելու կը ծառայէ: Արուները քիչ մ'աւելի



մեծ են եւ մոխրագոյն մազերով ծածկուած. խայ-
թոց չունին եւ ոչ ալ խողաններ, իսկ ասոնց ա-
չուրները մեծ եւ բաղադրեալ են: Թագուհին
ասոնց մէջէն ամենամեծն է, խողաններ չունի,
փորը՝ երկայնաձեւ եւ ծայրը ձու ածելու խողո-
վակ մը կայ: — Բոլոր մեղուները՝ լեցուն, մա-
զոտ մարմին ունին, գլուխն շատ խորունկ բաժ-
նուած է կուրծքէն, մեծ՝ բաղադրեալ կողմնակի
աչուրներ, ասոնցմէ զատ գագաթին վրայ երեք
շատ շատ մանր կիտաձեւ աչուրներ ունին: Ա-
սոնց բողկուկը կարծ, թելի ձեւով եւ բեկբեկած
է, բերնի մասունքն ալ կէս մը խածնելու, կէս
մըն ալ մեղրի հիւթը ծծելու յարմար են:


Պտկ. 337. Մեղուին բերնի
մասունքը՝ առջեւի կող-
մանէ նկատուած:

- ա. բողկուկ.
- բ. վարի կղակ.
- գ. լեզու.
- դ. չոշափեղք.
- ե. վերի կղակ.
- զ. վերի շրթուք:


Մեղուներն իրենց զարմանալի տնտեսութիւնը
կարգաւորելու համար նախ եւ յառաջ կը փնտռեն
մուրժ, տաք եւ չոր տեղեր, կամ սնամէջ ծառ
մը կամ ժայռի ճեղքուած մը, եւ կամ այս վախ-
ճանիս համար շինուած՝ յարդէ կամ ուռնեղ ու
զորներէ հիւսուած կամ փայտէ՝ մաս մաս բաժ-
նուած ընդունարան մը (փեխի, մեղու-ոց, մեղու-
նոց, մեղու-ոքոյն):

Եւրոպայ հիմա գործածուած արուեստական փեթակը՝ Չիբրոն անուամբ
մեղուաբոյծ մը գտած է, քանի մը առանձին շրջանակներէ բաղադրուած
շարժական կազմածք մըն է, որ առանց կազմածքը փճալներէլու ամէն տան
կրնայ մաս մաս բաժնուիլ: Պարզ տեղ մը հաստատուելուն պէս՝ աշխա-
տաւորներն իրենց գործը կը սկսին: Նախ եւ յառաջ ամէն աղտեղութիւն

գուրս կը հանեն կը մաքրեն, ամէն ծակ, պտտաւաւածք ու անդրուած՝ մաքրած միմի պէս նշուծով մը (պոլիս-թոպ, propolis) աղէկ մը կը խնուս եւ մի միայն ծակ մը կը թափուին, որ մանկու եւ ելեւը կը ծառայէ: Ետքը չէզոքները կը սկսին բռն մեծ բուրբակ վեցանկիւն բլբլներու ուղղածից կարգեր շինել (որ կ'ըսուին Կուլ-Կուլ-Կուլ կամ Կուլ-Կուլ կամ Կուլ), ասանցմէ սմանք սննդեան պաշարն (ծաղկանց փայլն եւ մեղրն) բնդունելու կը ծառայեն, իսկ սմանք ալ նորեակ ձագերուն բնակարան կ'ըլլան: Ամէն մէկ մաղ հաւարաւոր բլբլներէ կը կազմուի (այս բլբլներն ալ երկու կարգ են, որոնց ծայրն իրարու կպած կ'ըլլայ): Ամէն մէկ մաղին մէջ տեղը այնչափ միջոց կայ, որ մաղունները կրնան առգին անգին ազատ երթալ գալ: Չէզոքները նոր բլբլ շինելու կամ կերակուր բերելու զբաղած ատեն, Թագուհին ամբողջ ամառն երկու անգով ձու կ'ածէ. մէկ անգամին կ'ելլին չէզոքները եւ աւելի մեծ ու աւատ մաղով լցնուած բլբլներու մէջ՝ Թագուհիները, իսկ փոք անգամին՝ արունները կ'ելլին: Երեք օր ետքը Թագուհին ձուէն գուրս կ'երէ, մանր ճերմակ, աւանց օտքի օրդէ կը նմանի, չէզոքները զստանք կը կերակրեն իրենց բլբլներուն մէջ, եւ 15 օրուան մէջ բոլորովին կառարեալ կ'աճին: Անկէ ետքը չէզոքները մաղամբէ խուփով մը բլբլներուն բերանը մօտ գոցեն եւ Թագուհի 8 փայլել 15 օրուան մէջ կը կծկի եւ կառարեալ միջոցի կերպարանք կ'աւանդ: Ամբողջ փոփոխութիւնը 16—24 օր էր տեւէ: Արու ձագերը հաւարակ՝ բայց մեծագոյն բլբլներու մէջ, իսկ մանր Թագուհիները մաղերու եղերքն եղած մանաւաւր եւ զորակածել բլբլներու մէջ կը մեծնան, բայց Թագուհիներն արուններէն աւելի լաւագոյն սնունդ կ'աւանդուն: Երբ աւաղին ձագ Թագուհին կը մեծնայ եւ կը սկսի բզլալ, հին Թագուհին իւր խմբին մէկ մասովը փեթակէն գուրս կ'ելլէ: Բայց մաղունանց մը բազմամիզու եղած ատեն երբեմն երբեմն պղաթի Թագուհիներու առաջնորդութեամբն ուրիշ գնդեր ալ կը բաժնուին: Երբ ամենեւին պղաթի Թագուհի չի մնար, այն ատեն չէզոքները «արուններու պատերազմ», բռնածը կը սկսին եւ արուններն կը ստակեցնեն: — Բաժնուելու ատեն մաղուններն հին փեթակին քովերը կը ժողովուին եւ սոփորաբար ծառի մը ճիւղին վրայ խումբ խումբ կը թափին կամ աւելի կը կախուին: Շատ գիւրութեամբ ճիւղը Թագուհիով կողովի մը մէջ կրնան աւանդիլ, այս ընելու ատեն միայն անոր մտադրութիւն ընելու է, որ Թագուհին մէկանց բռնուի: — Հին ատեններէն սկսեալ մարդիկ զմաղուններն իբրեւ բնամանի կենդանիներ կը բուծանեն եւ կը հոգան: Մեղուններն իրենց մեղրամեմբին ու մեղրովը շատ օգտակար են: Մոմը՝ փաթի օղակներուն ներսի կողմը եղած մանաւաւր խցիկներու մէջ կը պատրաստեն, մերթի վրայ եղած ծակախցիներէն գուրս կը հանեն եւ ետեւի ստուրներուն օգնութեամբն ասկէ բաժնելով կը սկսին բլբլներու զործածել: Մեղունները մեղրը կը քաղեն տնկերու ծաղիկներէն եւ ուրիշ անկային քաղցր հիւթերէն. տնկերու վրայէն կը լցնեն կ'աւանդեն, իրենց շղիքովը քիչ մը կը փոխեն, եւ մինչեւ օր փեթակ հասնին,



Պտկ. 338. Ծառէ մը կախուած մնողներ:




Պ. 339. Մեղուի խայթոց (մեծց.):

- ա. Թայնի քամոց.
- բ. Թայնի անցք.
- գ. Թայնի բշտիկ.
- դ. Թայնի հասելու անցք.
- ե. Խայթոցը պատանէն մէջ.
- զ. Խայթոցին ծայրը պատանէն գուրս (շատ մեծց.).

խամօխի մէջ կը պահեն: — Չեղջերներն իրենց թռչնի խայթացող զօրաւոր կը խայթեն ու կը ցաւցընեն: — Բայց ասով իրենց ալ զաւառ կը հասնի, վասն զի խայթոցն այնպիսի ուժգնութեամբ վերքի մէջ կը մտնի, որ չեն կրնար հանել եւ ասով իրենք ալ կը սառակին: Մեղուններն եւ ասոնց նման միջատներն միայն զբոսաւորած ասոնց կը խայթեն, անոր համար եթէ մէկը մեղուններէ պաշարուի՝ առաջին աւելի ապահովն է՝ հանդարտ կենալն եւ կամ գետին պառկելը, պէտք չէ վազել, վասն զի վազողին ետեւէն կ'իջնան մեղունները: Իսկ եթէ խայթեն, պէտք է զովացուցիչ միջոցներ գործածել, ինչպէս ցեխ, թաց հող, մամուռ եւ այլն, ի մասնաւորի աւշարակի (ամանիակի) ոգի:

222. Իշամբուրն (*Bombus terrestris*) մեղրագործ մեղուն մեծ է, եւ բոլորովին երկայն ու թաւ մազերով ծածկուած: Գոյնը սեւ է, կուրծքին առջեւի մասին վրայ եւ փորին երկրորդ օղակին վրայ՝ լայն դեղին շերտ մը կայ, եւ մարմնոյն ծայրը ճերմակ բիծ մը:



Պտկ. 340. Իշամբուրն (Բ. մ.):


Իշամբուրն փոքր ընկերութեամբ՝ առ առաւելն 100—200 հատ մէկտեղ կ'ապրի: Նոյնպէս ասոնց մէջ ալ արու, էգ եւ չէղջեր կը զանազանուի: Ասոնք իրենց բոյնը կամ փեթակը գետնի տակ ծակերուն մէջ կը շինեն, բլիճներ կը շինեն, որոնց մէջ՝ հասարակ մեղուններու պէս մեղր, ծաղկանց փոշի եւ պղտիկ ձաղերը կը դնեն: Բայց ասոնց ամբողջ շինուածն՝ ոչ մեղրագործ մեղուններու պէս կանոնաւոր, եւ ոչ ալ այնպէս ընդարձակ է, նոյնպէս կծկածներու խորխերն ալ իբրեւ բլիճ կը գործածեն:

ՅԵՂ Բ. ՊԵՆՏԵՐ (Vespida)

223. Բալնիլիկը կամ Բոռն պեթակը (*Vespa vulgaris*) ցանցաւ մազերով ծածկուած ողորկ մարմին մ'ունի: Գոյնը սեւ է, գլխուն եւ կուրծքին վրայ դեղին բծեր, իսկ փորին վրայ՝ դեղին եւ սեւ օղակներ կան: Ետեւի ոտուղներուն սրունքները՝ նեղ եւ առանց մազի են, ոտից մասունքն իրարու հաւասար են:



Պտկ. 341. Բալնիլիկ (Բ. մ.):



Պտկ. 342. Բոյնը (Բ. մ.):


Բալնիլիկը մեծ բազմութեամբ կ'ապրի եւ ծառերու վրայ կամ տանեաց տակը՝ մոխրագոյն գունով՝ պտղուն թղթի նման նիւթէ մը մեծ բոյն կը շինէ:

Այս նիւթը կազմուած է հին առիւտակաձեռներու, առնիքներու կամ ծառաց բուներու կտրուանքներէ, զորոնք այս պիծակները կը կրեն եւ իրենց կողմէն շագնալով կը շագուեն: Սովորաբար միայն քանի մը էգ պիծակներ ձմեռն կ'անցընեն, գարնան քանի մը բլիշներ կը շինեն եւ առնց մէջ ձուեր կ'ածեն: Չուերէն նախ եւ յառաջ առնց օտքի թրթուրներ կ'ընեն, զորոնք էգերը կը կերակրեն, բայց այս թրթուրները քիչ մ'եւորը գարնան կը կծկին եւ իբրեւ աշխատաւոր պիծակ դուրս կ'երևն: Առնց շէնքը կը ամօցընեն, եւ ետեւէ ետեւ բազմացող ձագերը կը հազան: Այսպէսով շատ մը կուտակագէղ բլիշներու կարգեր յառաջ կու գան. արտաքուստ փ եւ նոյն նիւթէ շինուած բարակ կեղեւով մը պատած են եւ միայն մանուր եւ ելելու համար վարի կողմը բաց ծակ մը կայ: Անոն մտերն էգը գարնան ուրիշ ձուեր կ'ածեն, որոնցմէ արուներ եւ էգեր կ'ընեն: Բայց թէ առնց եւ թէ չէգըները շուտ մը կը սաակին, վասն զի պիծակներ ձմերուան պաշար չեն ժողկեր եւ ցուրտը շատ կը զգան: Միայն քանի մը էգեր մամուռի տակ կամ անոմէջ ծառերու մէջ ապրելով ձմեռը կ'անցընեն եւ գարունը վերոյիշեալ ապրելու կերպը կը շարունակեն: Բայց պիծակները քաղաքիս եւ կայսրա միջատներ են, չէ թէ միայն անկերու քաղցր հիւթեր եւ պտուղներ, այլ նաեւ ուրիշ միջատներ եւ փո ալ կ'ուտեն: Ասկէ դառ չէգըներն ու էգերը խայթոց մ'ունին, որով խիստ կը խայթեն, բայց եթէ չգրգուռին բան մը չեն ըներ:

Պիծակներու ամենամեծ տեսակներէն մէկն է Ձէսոպաքը (*Vespa crabro*). մարմինը՝ կարմրագոյն գորշ՝ խիլ փորը գեղին օղակներ ունի: Իւր խոշոր բոյներն սովորաբար փտտած կաղնիի բուներուն մէջ կը գնէ, եւ իւր խայթուածոյն երբեմն ձիերու եւ մարդկան շատ վտանգաւոր է: Նոյնպէս շատ կը գտնուի պիծակի ուրիշ մէկ փոքրագոյն տեսակը, որ Ձէսոպէն (*Polystes galica*) կ'անուանուի, վրան լեւի է, սեւ եւ գեղին օղակներով, եւ հաւկթածեւ փոր մ'ունի, որ միայն բարակ թելով մը մարմնոյն հետ միացած է: 20—30 բլիշով առանց պատեանի պզտիկ բոյներ կը շինէ եւ մացառներու, գերաններու եւ առիւտակաձեռ պատերու վրայ կը հաստատէ:




Պտկ. 343. Ձիաստաց (Ք. մ.):

Պտկ. 344. Աւազի քրէտ (Ք. մ.).
միջատ եւ առիւթ թրթուր:


Ուրիշ շատ մը պիծակազգի միջատներ՝ ստորերկրեայ ինքնափոր ծակերու մէջ կ'ապրին, եւ Բրէփ կ'անուանուին. օրինակի աղադու Ասոպէ Բրէփը (*Ammophila sabulosa*), աւազուտ տեղեր կը բնակի, բազմաթիւ թրթուրներ կը սատկեցընէ եւ իւր ծակը կը տանի. շատ օգտակար են:

ՅԵՂ Գ. ՀԵՑԱՀԱՆՈՒԿՆԵՐ (Ichneumonida)

224. ՍԵ-հեպանանո-լը կամ հեպանան պիթալը (Ichneumon persuasorius) 0.040 հզմ. երկայն՝ 2 խողաններէ շրջապատած ձուածելու խողովակ մ'ունի: Երկայնաձեւ մարմինը փայլուն սեւ է, չորս անհասար թեւերն ապակեջ պէս փայլուն են, եւ նաւթի գունով գորշ երակներ ունին:



Այս մեծ պիթալը՝ լեռնային տեղեր շատ կը գտնուի: Էգն իւր արտաքին կարգի երկայն խողովակովը՝ իւր ձուերը փայտի




Պտկ. 345. Սեւ հետախնուկ (Ք. մ.):


Պտկ. 346. Հետախնուկը (Ք. մ.):
Արուս. էգը՝ ձու կ'ածէ:

մէջ ապրող միջատներու մարմնոյն մէջ կը խոթէ: Այս ձուերն ետքէն իրենց հիւրընկալին մարմնոյն մէջ կ'ածին թրթուր կ'ըլլան եւ վերջապէս թրթուրն կրծելով կը սաակեցնեն:


225. ԴԵՂԷՆ ԴՐԴՆԻԵՐ (Microgaster glomeratus) միայն 0.002 հզմ.



ա



բ



բ

Պտկ. 447. Դեղին որդնկեր:

— Թրթուր մը՝ որմէ որդնկերին թրթուրները դուրս կ'ելլեն. բ. որդնկերին կծկածները. գ. միջատ (ն անգամ մեծց.). դ. թրթուր (մեծց.):

երկայն է, գոյնը՝ սեւ, իսկ ոտուղները՝ դեղին: Ապակւոյ պէս պայծառ թեւերն՝ գունատ գորշ գունով երակներ ունին:

Այս պղտիկ հետաձան պիծակը՝ թիթեւներու որդերը կը հալածէ, իւր երկայն խողովակովն անոնց մարմնոյ օղակներուն մէջ ստեպ ստեպ ձուեր կ'ածէ: Թէպէտ ամէն մէկ որդը՝ 20 կամ աւելի ձու կ'ունենայ իւր մարմնոյն մէջ եւ ամէն մէկ ձուէն մէկ մէկ հատ որդի նման թրթուր կ'ելլէ, այսու ամենայնիւ որդը կ'ապրի, մորթ կը զգենու, նաեւ երբեմն կը կծկի ալ: Բայց վերջապէս կը սատկի, հետաձան պիծակներու թրթուրները կը սկսին զենքը ներքուստ ուտել եւ անմիջապէս կը կծկին, այնպէս որ սոյնորաբար սատկած որդանց քովը խումբ մը ոսկեզօծ գեղին գունով պղտիկ թրթուրներ կը գտնուին: Բոթոթակեր Լեթառանոն (Pteromalus puparum) ալ ասոնց մէկ պղտիկ տեսակն է, գոյնը ոսկեգոյն կանանչ է: Ցերեկուան թիթեւանց զանազան կրծկածներու մէջ բազմութեամբ կ'ապրի երբեմն մէկ կծկածի մէջ 100 հատէն աւելի կը գտնուի: Թրթուր ջնջելով շատ օգտակար են այս պիծակները:

ՑԵՂ Դ. ԳԻՏՈՐԱՐՆԵՐ (Cynipida)

226. Գիտորաքէր պիծակը (Cynips calycis) խցի հասարակ ճանճէն քիչ մը պղտիկ է, գոյնը մոխրագոյն գորշ եւ ճերմկեկ աղուա-



Պտկ. 348. Գիտորաքեր պիծակ:


ա.—բ. միջատ. ա. կոն. բ. գոց կծկած. է. կծկածը բացուած (բն. մեծ.) դ. մեծցուած. ի.—լ. տերեւակեր գիտորաքեր. ի. պիծակը (բն. մեծութեամբ). Ղ. նոյնը՝ մեծցուած. լ. գիտոր. ը. մէջտեղէն կտրուած գիտոր՝ մէջը կծկածով:

մազով ծածկուած է: Չորս անհաւասար երկայն թեւերն փորէն դուրս կ'երկնան ըստ բաւականի եւ ապակւոյ պէս պայծառ են, միայն քանի

մը հաստ գորշ երակներ ունին: Բարակ եւ դերձանի ձեւով բողկուկները շխտակ են, իսկ մարմինը՝ ճնշուած:

Այս պիծակը՝ Կոնսոր կոչիկն (*Quercus pedunculata*) ծաղկելու տառնը՝ Մայիսին սկիզբը կը սկսի թռչտիլ, բայց որովհետեւ թէ առիկա եւ թէ բոլոր գիտորաբերները շատ մանր են, գիւրաւ չեն նշմարուիր:

Ուստի եւ այնչափ եւս առաւել զարմանալի է այս պղտիկ միջատին կազնիներու վրայ յառաջ բերած գիտորը: Բարակ աղեղնաձեւ ծառ զայլիկունով մը պիծակը՝ բաժակապատեանին կեղեւին վրայ կ'ածէ իւր ձուռն: Այս խոցուած մասը՝ փոխանակ պտուղ ըլլալու, անկանոն եւ ծայածայ նիւթ մը կը ձեւանայ, եւ արիկա է ահաւորիկ գիտոր բուսածը: Գիտորաբերին՝ մանր, փայլուն ճերմակ եւ որդի նման թրթուռն ու կծկածն առոր մէջ կ'ապրի, եւ վերջապէս գիտորին վրայ ծակ մը բանալով՝ կատարեալ միջատ եղած գուրս կ'ելլէ: — Գիտորներն աշունը ծառէն վար կը թռչին, Եւրոպա՝ ըստ մանաւոր Տրապիզոն, Կաղնիի անտառներու մէջ իբրեւ վաճառականութեան շատ պիտանի նիւթ մը կը ժողվեն. եզերու կաշին խաղախելու կը գործածուի: Ասոր նման ուրիշ պիծակ մըն ալ՝ Փոքր Ասիայի կաղնիներու վրայ՝ Բուռ Գիտոր բուսածն յառաջ կը բերէ: Այս գիտորները կլոր բանիւր են, վրայի երեսը սղորկ եւ վրան մանր ծակով մը, զոր կը բանայ միջտը գուրս ելլելու համար: Թէպէտ Եւրոպայի կաղնիներու վրայ ալ գիտորաբերներն այսպիսի գիտորներ յառաջ կը բերեն, օրինակ՝ *Sticticus* Գիտոր-Բիւր (*Cynips folii*), սակայն Փոքր Ասիայիներն ամէնէն աւելի յարգի են եւ խաղախելէն զատ նաեւ թանաք շինելու ալ կը գործածուին:



Պտկ. 349. Վարդապիծակ:

ա. գիտոր. բ. մէջտեղէն կտրուած. գ. պիծակ (3 անգ. մեծոյ). դ. բն. մեծութիւնը:

շատ անգամ տեսնուած է որ մէկ գիտորէ զանազան միջատներ կ'ելլեն. այս երեւոյթն այլազգ մեկնել անկարելի է:


ՅԵՂ Ե. ԻՖԻՏՈԲԵՆԵՐ (Phytoptobes)

227. Ըճառյ սղոցաշատ (Lophyrus Pini) գրեթե իսկ ճանճի մը չափ մեծ կ'ըլլայ, փոքր՝ ըյն եւ սափակ է: Երան սեւագոյն եւ սեւեր փոքր է, եւ սանդղի մեւով բաշխուիներ ունի: Էգը՝ մեծ եւ բաց դեղին գունով է, եւ սղոցաձեւ բաշխուիներ ունի:

Ընտանեկաւ սաստիկ շատախոր միջաններէն մէկն է, որ Վոյլէ ընտանիք (Pinus silvestris) եւ Յոչոյ (Pinus nigricans) ծառին վրայ կ'ապրի: Հասարակօրէն երբեւ անգամ կ'երեւայ, մէջ մը Յոյիփին եւ Յունիփին, մէջ մին ալ Օդատափին ու Սեղանմաներին: Չաւրը՝ բարակ սղոցաձեւ խայթոցովը՝ տերեւներու ծակերու մէջ կ'ածէ: Ի մասնաւորի սառը դեղնագոյն գորշ Թրթուրը շատ շատախոր է, Թիթւան որդի կը նմանի, բայց 22 սաք ունի եւ տեղեւոր տերեւները կը կրծէ: Գորշ գունով մանուածոյ բաժնի մէջ կը կծկի, բայց գործնաւորին ծննդաբերութեան տառն տեղեւոր տերեւներու վրայ՝ իսկ աշնանային ծննդաբերութեան ժամանակ՝ դեռիւնը մամուռի մէջ:



Պտկ. 350. Շոճոյ սղոցաճու:
— . միջատ (2 ան. մ.). Բ. Թրթուր.
Գ. կծկած:



Պտկ. 351. Փայտակեր պիծակ (Ք. մ.):
— . միջատ (էգ). Բ. կաղնիակի նկատուած
փորին վերջի ծայրը. Գ. Թրթուր:


228. Փայտակեր պիծակը (Sirex gigas) երկայնաձեւ եւ գլանաձեւ մարմին մ'ունի եւ խայթոցի պէս դուրս ցցուած յաւելուած մը, իսկ էգը՝ բաց ասկից ուրիշ սեւ գունով՝ ձու անելու բուն խողովակ մ'ունի: Փորին առջեւի երկու եւ ետեւի երեք օղակները դեղին են, իսկ չորս մէջտեղիները՝ թաւշի պէս սեւ: Արուին փորը՝ կարմիր է:

Այս փայտակեր պիծակը՝ որ մարդկան ամենեւին վտանգաւոր չէ, իւր երկայն խայթոցովն եղեւիներու եւ սոճիներու կեղեւները կը ծակէ եւ ձուերն անոնց մէջ կ'ածէ: Թրթուրն որդի կը նմանի, խորունկ փայտի մէջ կը մանէ եւ ցորենի ցողունի շափ լայնութեամբ ճամբաներ կը բանայ:

շատ անգամ կտրուած փայտի հետ քաղաք կը բերեն, եւ տներու մէջ նորաշէն կահ կարասեաց կամ արկղներու մէջէն իբրեւ միջատ գուրս կ'ելէ: Այս պիծակը՝ փոփոխութիւն կրելէն ետքն որպէս զի ազատ ըլլայ, շատ անգամ օրինակներով իսկ հաստատուած է թէ նոյն իսկ կապար ալ կրծած է:

ՅԵՂ 2. ՄՐՋԻԿՆԵՐ (Formicida)

229. Անդառի յըջն (Formica rufa). վերի կողմը կարմրագոյն, իսկ փորը՝ խարտեաշ է: Բազմաթիւ աշխատաւորներն անթեւ են եւ դիւրաւ կը ճանչցուին իրենց մեծ գլխովը, խածնելու յարմար վերի կզակով՝ որ շատ ամուր է, եւ պզտիկ աչուրներով: Արուններն ու էգերը՝ չորս անհաւասար թաղանթէ թեւեր ունին, բայց էգին թեւերը շուտ մը կը թափին: Ասոնց բողկուկները դերձանի ձեւով են եւ կտրտուած կ'երեւան, փորը՝ բարակ խողովակով մը՝ որուն վրայ մանր թեփիկ մը կայ, կուրծքին հետ միացած է: Խայթոց չունին, այլ փորին ծայրը մանր բշտիկ մ'ունին, եւ եթէ գրգռուին ասոր մէջէն՝ սաստիկ կծու եւ ժանտահոտ հիւթ մը դուրս կը սրսկեն, որ Մըջնախնայ կ'ըսուի:



Պտկ. 352. Անտառի մըջին (մեծոյ):

Աշխատաւոր.

Արու.
էգ:

Այս մըջիւնը բազմութեամբ մէկտեղ կ'ապրի եւ կոնարբեր ծառոց անտառներու մէջ՝ իրարու վրայ դիզուած նիւթերէ՝ ինչպէս աւազէ, հողէ, ասեղնաձեւ տերեւներէ, փայտի կտորուանքներէ, հասարակ տերեւներէ եւայլն, մեծ բլրաձեւ բոյներ (մըջնոցներ) կը շինէ:

Այս բոյներէն սկիւալ մասնաւոր բացուած ճամբաներ կան, որոնց վրայէն մըջիւններն իրենց հարկաւոր բաները կը կրեն: Ասոնց կերակուրն է տնկերու եւ անտնոց քաղցր հիւթեր, բայց նաեւ պտուղ եւ սատկած կենդանիներ ալ կը կրծեն: Ի մասնաւորի ափսոսելու ետեւէն շատ կ'իյնան եւ անոնց փորի խողովակներու մէջէն մեղրի հիւթը կը ծծեն: Օդաստուղին թեւաւոր արուններն ու էգերը օդի մէջ կը թռչտին, բայց շուտ մը վար կ'իյնան, եւ էգերը հասարակաց բոյներու մէջ պզտիկ ձուեր կ'ածեն, որոնք հազիւ կը տեսնուին: Ասոնցմէ՝ անոտն ճերմակ թրթուրներ կ'ելլեն, աշխատաւորները զասոնք լաւ կը խնամեն, կը կերակրեն. այս թրթուրները շուտ մը բարակ հիւսաւածքով բոժոժի մէջ կը կծկին: Այս վիճակի մէջ շատ անգամ իբրեւ «Մըջնան կիթ» (որ ինչպէս յայտնի է՝ սխալ է, վասն զի ասոնք կծկած են, չէ թէ ձու), կը ժողվեն, քերմութեամբ կը սատկեցնեն եւ միջատակեր երգեցիկ թռչնոց, իբրեւ սիրական կերը կը գործածեն: Չէզոքները՝ կծկածներն ալ խնամքով կը հոգան, շատ անգամ արեւու մէջ կը բերեն ու կը տանին: Ընդհանրապէս աշխատաւորներն անխոնջ են իրենց զանազան գործողութեանց մէջ, անոր համար իրենց փութաջանութիւնն առակ կ'ըզած է: Բայց ձմերուան համար պաշար չեն ժողվեր, այլ հողին տակը աւելի խորունկ կ'իյնան, եւ խիստ ձմերուան ժամանակը՝ տեսակ մը թմբբութեան վիճակի մէջ կ'անցընեն: Մըջիւններու զարմանալի յատկութիւններէն մէկն այն է, որ

ուրիշ քանի մը միջատներու՝ բայց ի մասնաւորի բզէզներու թրթուրներուն տեղ կու տան իրենց բոյնն մէջ, ուր ուրիշ անտանոց եւ նաեւ մարդուն գէմ ալ եթէ բոյններ աւելլու յանգանին, քաղութեամբ իրենք զերենք կը պաշտպանեն եւ իրենց բերնի աքցանով կը խածնեն եւ իրենց ժանտահատ (միջնա)թթուն կը սրկեն:

Ուրիշ միջիւններ ալ կան, որոնք հին, փառած ծառերու մէջ կ'ապրին եւ ասոնց մէջ բոյններ ու ճամբաներ կը շինեն. ասոնց կարգէն է՝ Թուր թառափեղնաբ (Formica ligniperda), որ մեծ միջիւն մըն է: Կան քանի մը տեսակ միջիւններ ալ, որոնք քարերու տակ, արմատներու եւ գուղձերու մէջտեղը, պատերու մէջ եւայլն, ծակեր ու ճամբաներ կը բանան: Ասոնց կը վերաբերին՝ Պարփաղի Կարփաղեղնաբ (Myrmica rubra), եւ գեղնադոյն գարջ՝ Խոփ միջիւն (Myrmica caespitum) որ շատ աւելի աւատ կը գտնուի. երկուքն ալ թոյնի բարակ խայթոց ունին:

Թեպէտ Եւրոպայի եւ Փղեր Ասիայի միջիւնները բազմաթիւ են, սակայն եւ այնպէս թէ բազմութեան եւ թէ զանազանութեան կազմանէ ջերմագոյն երկիրներու միջիւններուն չափ չեն: Ասոնց զարմանալի օրինակ կրնայ ըլլալ Թափառալի միջիւն (Atta cephalotes), անթիւ ու անհամար բազմութեամբ մարդկան բնակարաններու մէջ կը մտնէ, շատ նեղութիւն կը պատճառէ, ամէն ուտելի բան՝ բայց նաեւ զնա սակար միջատներ ալ, կ'ուտէ կը սպառէ, եւ կարճ ժամանակի մէջ նաեւ ամբողջ ծառեր տերեւաթափ կ'ընէ: Ըստ Ա. Հոմբուրգի ըսածին, Ռիո Նէգրոյի այգիէնածին բնակիչքը տարւոյն մեծ մասը միջիւններով կ'ապրին, քսակներու մէջ խմորի պէս կը թրմեն եւ զանգուած մ'ընեն զի կը պահեն, նաեւ շատ մը կաթնատու կենդանիներ ալ մըրջիւններով կ'ապրին: Միջիւններէն տեսակ մը «գի» կը հանուի:


ԿԱՐԳ 3. ՑԱՆՑԱԹԵԻՒՆԻ (Neuroptera)

Ցանցաթեւ կ'ըսուին այս կարգի միջատները, վասն զի 4 հատ ցանցակերպ (ուռկանաձեւ) թաղանթեայ թեւեր ունին: Բերնի մասունքը խածնելու կամ ծամելու յարմար են. կատարեալ փոփոխութիւն կը կրեն: Երեք գլխաւոր ցեղերու կը բաժնուին:

ՑԵՂ Ա. ՄԵԾԱԹԵԻՒՆԻ (Megaloptera)

230. Միջնաթիւն (Myrmecoleon formicarius) գորշ գունով միջատ մըն է. աչուրները դուրս ցըցուած են, որով գլուխը լայն կ'երեւայ, գլխուն վրայ 2 հատ կարճ եւ ծայրերը փնջաձեւ բողկուկներ կան:


Կատարեալ միջատն իրիկուան գէմ ցած թփերու մէջ կը թռչտի: Թըրթուրը՝ կարճ, լայն վեց ոտք ունի



Պտկ. 353. Միջնաթիւն (M. f.):
միջատ (վերք). կծկած. թրթուր.

կրկնյա և եւրո է և ակնոցն կանաչ կամ կանաչ-կարմիր գու-
նով կը գտնուի: Յոսկանայի և շարդարան թևերը կամ բոլորովն և
կամ միայն մէջտեղէ՝ կարմիրոցն կանաչ կամ գորշ գունով են:

Եւր միտայ՝ չառ ան
զամ հոգնաւոր աստի
ներս քաղիւ ինչ ժող կը
թռչտի և կամ ինչոքն ուր
ից ժող կը թռչտի: Յոսկ-
անայանք արդէ անասի
ներ՝ թռչտելու թռչտանք
շնորհալիք (Libellula de-
pressa) արեւան կիւր աս-
քաթեան անոն՝ չառ ար-
գաթեանց հա հա կը ար-
նան: Ճանա և արդէ մի
նանք կը հարանն և
կ'արան և քանի թռչտել
պատկեր կ'ընեն: — Յո-
կան-հարանքն ի պարան անդ



Գ ՊԿ. 355. ԶԱՆԴԱՐԱՆԱՅԻՆ Բ. Մ.:


ինչ մէջ կ'արան: Չանք իսկ իսկ ինչոքն անից ասի կ'անեն, երան
թռթալը կարգաւ միտան չառ կը նենք. բայց անթև է, չառ
չառիւ է և ինչոքն քանիքն միտանք և անեն կ'ենայ: Թռթալը
չառ անգամ իսկ իսկ իսկ իսկ և այս ինչոքն ժող



Գ ՊԿ. 357. ԶԱՆԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԶԻՐԻՔԱՅԻՆ Բ. Մ.:

կարծ թևերա մասանքներ կը նշմարան: Բայց այս ինչոքն արդէ միտանայ
ինչոքններան ուր հանգարան անդ մի չի կենար, այլ կը շարժի և անանդ
ալ կ'անան: Վերջապէս իրեն դառն կ'ենլէ, անի մի ժող կ'արան կը
ինչոքն մարթը ճիգքելով կարգաւ միտան դառն կ'ենլէ:

233. Հասարակ Միօրեան (*Ephemera vulgata*) երկայնաձեւ մարմին մ'ունի, գոյնը դեղին է, չորս հատ գորշ գունով վանդակեալ եւ բծաւոր թեւեր ունի, որոնցմէ ետեւիններն՝ առջեւիններէն շատ կարճ



Պտկ. 358. Հասարակ Միօրեայ (Բ. մ.):

Ա. թրթուրը. Բ. կատարեալ միջատը. Գ. կղզիւ կազմածով ձու (վերջինս շատ մեծցուած):

են: Բողկուկները կարճ են. փորին ետեւի երեք խողանները՝ միջատի մարմնէն աւելի երկայն են. առաջին երկու ոտքը՝ միւս չորս հատէն աւելի երկայն են: Բերնի մասուձքը ամենեւին աճած չեն:


Այս ճանճակերպ միջատը՝ անոր համար միօրեայ կ'անուանուի, վասն զի կատարեալ վիճակի մէջ շատ քիչ կ'ապրի եւ ամենեւին չ'ուտեր, շատ անգամ հազիւ քանի մը ժամ կ'ապրի: Բայց երբեմն այնպէս բազմութեամբ կ'ըլլան, որ թանձր ձեան հատերու պէս օդը կը լեցընեն, եւ իրենց դիակները ջուրն ու եղբրը քանի մը հարիւրամեար թանձրութեամբ կը ծածկեն: Շատ նշանաւոր է ի մասնաւորի Երէյ-Նոպուրն միօրեան (*Palingenia longicauda*):

Ցեղ Գ. ԿՐԾԱՂՆԵՐ (Corrodentia)

234. Աշխարհաւերը կամ Ցերթիքը (*Termes bellicosus*) գորշադեղին է: Միշտ մեծակոյտ բազմութեամբ կ'ապրի, եւ արուէն ու էգէն զատ ասոնց մէջ կը գտնուին աշխատաւոր ու պատերազմող ըսուածները: Արուները թեւաւոր են, 4 հատ ցանցակերպ, դեղնագոյն սպիտակ, անթափանցիկ թեւ ունին, որոնք դիւրաւ կը թափուին: Էգը սակաւատեւ ժամանակ միայն թեւ կ'ունենայ եւ ետքը շատ դիւրաւ կը ճանջուի իւր արտաքոյ կարգի թանձր ու մեծ փորովը: Աշխատաւորներն անթեւ են, մանր կլոր գլուխ եւ ծածկուած կզակներ ունին: Պատերազմողները կամ զինուորները նոյնպէս անթեւ են, բայց չորեքանկիւն գլուխ մը եւ ամուր կզակներ ունին:

Այս տերմիտն ամենամեծ տեսակներէն մէկն է, տաք Ափրիկէ կը գտնուի, 3 մինչեւ 3.5 մետր բարձր՝ հաստատուն հողաբլրակներ կը շինէ,

որոնք երկաթէ գործիքներով հաղել կը քակուին: — Այրեցեալ գօտւոյն մէջ ուրիշ բազմաթիւ՝ ըստ մեծի մասին մանր տեսակ տերմիտ-



Պտկ. 359. Աշխարհաւեր (Բ. մ.):

ա. արուն. բ. էգը. գ. պատերազմող. դ. աշխատուոր:

ներ կան, որոնք արտաքին տեղքով ու ապրելու կերպով մըջեան շատ կը նմանին, անոր համար ալ Սպիտակ Տըլիւն կ'անուանուին: Լուսն շատ կը փախչին, անկատար փոփոխութիւն կը կրեն եւ խանդարեալ ցանցակերպ թեւեր ունին: Շատերը հողէ մեծանիստ բոյներ կը շինեն, ընդհակառակն ոմանք ծառոց բուններու եւ կամ գետնի տակ ինքնափոր ծամբաներու մէջ կը բնակին, եւ ասոնք եթէ մարդաբնակ տեղեր հաստատեն իրենց բնակութիւնը, զարհուրելի հարուած կ'ըլլան:

Առանց տեսնուելու՝ տներու, խանութներու եւ նոյն իսկ նաւերու մէջ ալ կը մտնեն, ամէն փայտակերտի ներքինը կը փորեն, կը կրծեն եւ այնպէս զգուշութեամբ, որ միշտ անկաթելբերու երկայնութեամբ յառաջ կ'երթան, մինչեւ որ վերջապէս փայտը կը կտրի, թէպէտ արտաքուստ բոլորովին անհետ կ'երեւայ: Ասով չէ թէ միայն գետններ, կա՛հ կարառիք եւ արկղեր բոլոր մէջի բաներով, այլ նաեւ ամբողջ տներ, եւ նոյն իսկ մեծամեծ նաւեր ալ կ'ապականեն: Նաւերու մէջ մտնելով նաեւ Եւրոպա առգին անգին սպրդած եկած են: Օրինակի ազագաւ՝ Վիեննա Շէճերուն կայսերական պարտէզին ջերմոցներու մէջ Բրատիսլայի մանր տերմիտ մը կայ, տեկոց փայտէ թաղարներն եւ ուրիշ փայտէ կազմածները կը կրծէ, եւ թէպէտ շատ կ'աշխատին, բայց գեւ բոլորովին ջնջուած չէ: Որովհետեւ տերմիտներն ամէն բան ինչ որ քարէ կամ մտաղէ չէ, քիչ ատենուան մէջ կ'ապականեն, անոր համար իրաւամբ լինէն՝ այս տերմիտները՝ երկու Հնդկաստանի ալ ամենամեծ հարուածն անուանեց: Բայց ուրիշ կողմանէ ջերմ գոտիներու անտաւներու օգտակար են, վասն զի բոլորուած փոտած ծառերը կը տապալեն եւ քանի մ'անասնոց կեր կ'ըլլան, իսկ Աֆրիկէ նաեւ մարդիկ ալ կ'ուտեն այս միջատը:


ՎԱՐԳ 4. ՈՒՂՂԱԹԵՒԵՐ (Orthoptera)

Այս կարգի միջատներուն կուրծքի յառաջակողմեան օղակն բոլորովին ազատ է. խաճնող (ծամող) բերնի մասունք ունին եւ անկադար փոփոխութիւն կը կրեն. 4 թեւ ունին, որոնց երկու առաջինները կարծրացած են եւ միւսները ծածկելու կը ծառայեն. իսկ ետեւի թեւերն

աւելի լայն են եւ ծալք ծալք: Իրենց քալուածքէն առնելով 3 ցեղի կը բաժնուին:

ՅԵՂ Ա. ՅԱՅԿԱՂՆԵՐ (Saltatoria)

235. Դաշտի ծղրիդը (*Gryllus campestris*) սեւ գունով է, փորելու ուղբեր չունի, ընդհակառակն ետեւի ոտուղները շատ երկայն են:




Պտկ. 360. Դաշտի ծղրիդ (Ք. մ.):

... Բ. ընտանի ծղրիդ. Գ. դաշտի ծղրիդ:

Արուն առջեւի թեւերուն քովը ձայնի գործարան մ'ունի, որով բարձրաձայն կը ճռճուայ, ետեւի թեւերուն ծայրը սրածայր է, էգը ձու ածելու խողովակ մ'ունի:

Չոր խոտաւետ տեղերու եւ դաշտերու վրայ գետնափոր ծակերու մէջ շատ կը դառնուի, գեղեցիկ օդ եղած ատեն ծղրիդը՝ այս ծակին բերանը կու դայ, դուռիք կը ծածկէ, կը նստի եւ կը ճռճուայ, բայց թեթեւ աղմուկ մը լսածին պէս ներս կը քաշուի եւ կը լռէ: Արմատներով, սերմերով եւ կենդանական նիւթերով կ'ապրի, բայց խլրդածղրիդին չափ փնասակար չէ: — Տներու մէջ ասդին անդին՝ խոհանոցը, վառարանի եւ փուռերու քովերը կ'ապրի՝ դորը կաշիի գունով Ընդանի ծղրիդը (*Gryllus domesticus*), որ վերինին կը նմանի, ցերեկը պատերու ճեղքուածներու մէջ կը պահուի, իսկ գիշերը քարձրաձայն կը




Պտկ. 361. Խլրդածղրիդ (Ք. մ.):


ՏԵՂ Ե. ԺԱՖԱՐԻՍՈՒՄՆԻ (Phytosphaeces)

227. Լոփիւս պինուս (Lophyrus Pini) գրեթէ խցի ճանճի մը չափ մեծ կ'ըլլայ, փորը՝ լայն եւ տափակ է: Արուն սեւագոյն եւ աւելի փոքր է, եւ սանդրի ձեւով բողկուկներ ունի: Էգը՝ մեծ եւ բաց դեղին գունով է, եւ սղոցաձեւ բողկուկներ ունի:

Անտառներու սաստիկ վնասակար միջատներէն մէկն է, որ Վայրի շնեռ (Pinus silvestris) եւ Սորոյ (Pinus nigricans) ծառին վրայ կ'ապրի: Հասարակօրէն երկու անգամ կ'երեւայ, մէկ մը Մայիսին եւ Յունիսին, մէկ մըն ալ Օգոստոսին ու Սեպտեմբերին: Չուերը՝ բարակ սղոցաձեւ խայթոցովը տերեւներու ծակերու մէջ կ'ածէ: Ի մասնաւորի առօր դեղնագոյն գորշ թրթուրը շատ վնասակար է, թրթուան որդի կը նմանի, բայց 22 սղոց ունի եւ ասեղնաձեւ տերեւները կը կրծէ: Գորշ գունով մանուածոյ բոժոժի մէջ կը կծկի, բայց գարնանային ծննդաբերութեան ատեն ասեղնաձեւ տերեւներու վրայ՝ իսկ աշնանային ծննդաբերութեան ժամանակ՝ գետինը մամուռի մէջ:



Պտկ. 350. Եռճւղ սղոցաձու:
... միջատ (2 ան. մ.). բ. թրթուր.
գ. կծկած:



Պտկ. 351. Փայտակեր պիծակ (Բ. մ.):
... միջատ (էգ). բ. կողմնակի նկատուած՝
փորին վերջի ծայրը. գ. թրթուր:


228. Փայտակեր պիծակը (Sirex gigas) երկայնաձեւ եւ գլանաձեւ մարմնի մ'ունի եւ խայթոցի պէս դուրս ցցուած յաւելուած մը, իսկ էգը՝ բաց ասկից ուրիշ սեւ գունով՝ ձու ամեւու բուն խողովակ մ'ունի: Փորին առջեւի երկու եւ ետեւի երեք օղակները դեղին են, իսկ չորս մէջտեղիները՝ թաւշի պէս սեւ: Արուն փորը՝ կարմիր է:

Այս փայտակեր պիծակը՝ որ մարդկան ամենեւին վտանգաւոր չէ, իւր երկայն խայթոցովն եղեւիններու եւ սոճիներու կեղեւները կը ծակէ եւ ձուերն անոնց մէջ կ'ածէ: Թրթուրն որդի կը նմանի, խորունկ փայտի մէջ կը մանէ եւ ցորենի ցօղունի չափ լայնութեամբ ճամբաներ կը բանայ:

Հաստ անգամ կտրուած փայտի հետ քաղաք կը բերեն, եւ տներու մէջ նորաշէն կահ կտրասեաց կամ արկղներու մէջէն իբրեւ միջատ գուրո կ'ելլէ: Այս պիծակը՝ փոփոխութիւն կրելէն ետքն որպէս զի ազատ ըլլայ, շատ անգամ օրինակներով իսկ հաստատուած է թէ նոյն իսկ կապար ալ կրծած է:

ՅԵՂ 2. ՄՐՋԻՒՆՆԵՐ (Formicida)

229. Անդառի մրջին (Formica rufa). վերի կողմը կարմրագոյն, իսկ փորը՝ խարտեաշ է: Բազմաթիւ աշխատաւորներն անթեւ են եւ դիւրաւ կը ճանչցուին իրենց մեծ գլխովը, խածնելու յարմար վերի կզակով՝ որ շատ ամուր է, եւ պզտիկ աշուրներով: Արուններն ու էգերը՝ չորս անհասար թաղանթէ թեւեր ունին, բայց էգին թեւերը շուտ մը կը թափին: Ասոնց բողկուկները դերձանի ձեւով են եւ կտրտուած կ'երեւան, փորը՝ բարակ խողովակով մը՝ որուն վըպ մանր թեփիկ մը կայ, կուրծքին հետ միացած է: Խայթոց չունին, այլ փորին ծայրը մանր բշտիկ մ'ունին, եւ եթէ գրգռուին ասոր մէջէն՝ սաստիկ կծու եւ ժանտահոտ հիւթ մը դուրս կը սրսկեն, որ Մրջնախիտ կ'ըսուի:



Պտկ. 352. Անտառի մրջին (մեծց.):

Աշխատաւոր.

Արու.
էգ:

Այս մրջիւնը բազմութեամբ մէկտեղ կ'ապրի եւ կոնաբեր ծառոց անտառներու մէջ՝ իրարու վըպ գիգուած նիւթերէ՝ ինչպէս աւազէ, հողէ, ասեղնաձեւ տերեւներէ, փայտի կտորուանքներէ, հասարակ տերեւներէ եւայլն, մեծ բլրաձեւ բոյներ (մրջնոցներ) կը շինէ:

Այս բոյներէն սկսեալ մասնաւոր բացուած ծածկներ կան, որոնց վըպէն մրջիւններն իրենց հարկաւոր բաները կը կրեն: Ասոնց կերակուրն է տնկերու եւ անտառոց քաղցր հիւթեր, բայց նաեւ պտուղ եւ սառկած կենդանիներ ալ կը կրծեն: Ի մասնաւորի ափիոններու ետեւէն շատ կ'իյնան եւ անոնց փորի խողովակներու մէջէն մեղրի հիւթը կը ծծեն: Օգտաւոր թեւաւոր արուններն ու էգերը օդի մէջ կը թռչան, բայց շուտ մը վար կ'իյնան, եւ էգերը հասարակաց բոյներու մէջ պզտիկ ձուեր կ'ածեն, որոնք հազիւ կը տեսնուին: Արոնցմէ՝ անտառ ճերմակ թրթուրներ կ'ելլեն, աշխատաւորները զանոնք լաւ կը խնամեն, կը կերակրեն. այս թրթուրները շուտ մը բարակ հիւսուածքով բոսժի մէջ կը կծկին: Այս վիճակի մէջ շատ անգամ իբրեւ «Մրջնան կիթ» (որ ինչպէս յայտնի է՝ սիւալ է, վասն զի ասոնք կծկած են, չէ թէ ձու.) կը ժողվեն, ջերմութեամբ կը սառկեցնեն եւ միջատակեր երգեցիկ թռչնոց, իբրեւ սիրական կերը կը դործածեն: Չէզոքները կծկածներն ալ խնամքով կը հագան, շատ անգամ արեւու մէջ կը բերեն ու կը տանին: Ընդհանրապէս աշխատաւորներն անխնայ են իրենց զանազան գործողութեանց մէջ, անոր համար իրենց փութաջանութիւնն առակ եղած է: Բայց ձմեռուան համար պաշար չեն ժողվեր, այլ հողին տակը աւելի խորունկ կ'իջնան, եւ խիտ ձմեռուան ժամանակը՝ տեսակ մը թմբրութեան վիճակի մէջ կ'անցընեն: Մրջիւններու զարմանալի յատկութիւններէն մէկն այս է, որ

ուրիշ քանի մը փոխաներու՝ բայց ի մասնաւորի բզէշներու թրթուրներուն տեղ կու տան իրենց բոյնին մէջ, ուր ուրիշ անասնոց եւ նաեւ մարդուն դէմ ալ՝ եթէ բոյններ աւելու յանգչին, քաղութեամբ իրենց զիրենց կը պաշտպանեն եւ իրենց բերնի աքցանով կը խածնեն եւ իրենց ժամառահոտ (միջնա)թթուներ կը սրկեն:

Ուրիշ միջիններ ալ կան, որոնք հին, փոտած ծառերու մէջ կ'ապրին եւ ասոնց մէջ բոյններ աւ ճամբաներ կը շինեն. ասոնց կարգէն է՝ Թուփ Զաւարձիկ (Formica ligniperda), որ մեծ միջին մըն է: Կան քանի մը տեսակ միջիններ ալ, որոնք քարերու տակ, արմատներու եւ գուղձերու մէջտեղը, պատերու մէջ եւայլն, ծակեր ու ճամբաներ կը բանան: Ասոնց կը վերաբերին՝ Պարտեշ Կարմիր (Myrmica rubra), եւ գեղնագոյն գորշ՝ Խափ Բիշիկ (Myrmica caespitum) որ շատ աւելի առատ կը գտնուի. երկուքն ալ թոյնի բարակ խայթոց ունին:

Թեպէտ Եւրոպայի եւ Փոքր Ասիայի միջինները բազմաթիւ են, սակայն եւ այնպէս թէ բազմութեան եւ թէ գանազանութեան կողմանէ ջերմագոյն երկիրներու միջիններուն չափ չեն: Ասոնց զարմանալի օրինակ կրնայ ըլլալ Թափառակա իշիկ (Atta cephalotes), անթիւ ու անհամար բազմութեամբ մարդկան բնակարաններու մէջ կը մտնէ, շատ նեղութիւն կը պատճառէ, ամէն ուտելի բան՝ բայց նաեւ փեսապարկ միջատներ ալ, կ'ուտէ կը սպառէ, եւ կարճ ժամանակի մէջ նաեւ ամբողջ ծառեր տերեւութափ կ'ընէ: Ըստ Ա. Հոմբոլդի ըսածին, Ռիո Նեգրոյի այգրէնածին բնակիչքը տարւոյն մեծ մասը միջիններով կ'ապրին, քսակներու մէջ խմորի պէս կը թրմեն եւ զանգուած մ'ընելով կը պահեն, նաեւ շատ մը կաթնատու կենդանիներ ալ մերջիններով կ'ապրին: Միջիններէն տեսակ մը ոգի կը հանուի:


ԿԱՐԳ 3. ՑԱՆՑԱԹԵԻԵՐ (Neuroptera)

Ցանցաթեւ կ'ըսուին այս կարգի միջատները, վասն զի 4 հատ ցանցակերպ (ուռկանաձեւ) թաղանթեայ թեւեր ունին: Բերնի մասունքը խածնելու կամ ծամելու յարմար են. կատարեալ փոփոխութիւն կը կրեն: Երեք գլխաւոր ցեղերու կը բաժնուին:

ՑԵՂ Ա. ՄԵԾԱԹԵԻԵՐ (Megaloptera)

230. Միջնաթիւն (Myrmecoleon formicarius) գորշ գունով միջատ մըն է. աշուրները դուրս ցըցուած են, որով գլուխը լայն կ'երեւայ, գլխուն վրայ 2 հատ՝ կարծ եւ ծայրերը փնջաձեւ բողկուկներ կան:

Կատարեալ միջատն իրիկուան դէմ ցած թփերու մէջ կը թռչտի: Թրթուրը՝ կարծ, լայն վեց ոտք ունի




Պտկ. 353. Միջնաթիւն (Ք. մ.):
միջատ (վերը). կծկած. թրթուր.


եւ ամուր կզակներ. աւազուտ անտառներու կողմերը՝ ինքնափոր դայ-լիկոնաձեւ թռչնորու մէջ կը բնակի, եւ ասոնց քովերն եկող ամէն տեսակ մանր միջատներու վրայ կը յարձակի: Մինչեւ գլուխը՝ ծակին մէջ կը թաղուի եւ ներս ինկած միջատին վրայ կը յարձակի, նաեւ ըստ բաւականի հեռու եղած ատեն միջատին ետեւէն աւազի հատեր կը սրսկէ եւ ծակը կը ձգէ:

231. Կանանկ Շղարդոս-իւր (*Chrysopa perla*) արտաքոյ կարգի փափուկ եւ բաց կանանց դունով է, չորս թափանցիկ՝ շղարշատեռի նման թեւեր, թեւի պէս բարակ բողկուկներ եւ մեծ ու ոսկեգոյն փայլուն աչքեր ունի:

Այս զարդարուն անասնիկն իւր երկայնակութ ձուերը՝ ծառոց եւ թփերու տերեւներուն տակի կողման վրայ կը հաստատէ: Ասոր թրթր-թուրներն՝ ափիս կը ջնջեն եւ ասոր համար շատ օգտակար են, Լ-ի-ճակիբ առիթ կ'ըսուին. կոկորդիլոսի նման կերպարանքով շատ շուտով կը ճանչցուին, ուղորաբար ընկուզենւոյ վրայ շատ առատ կը գտնուին: Գնդակաձեւ կոկոնի մը մէջ կը կծկին:



Պտկ. 354. Կանանկ Շղարդուկ (Ք. մ.):
միջատ. թրթուր (ձախ). ձուեր (տերեւներու վրայ):



Պտկ. 355. Խոռուկան (Ք. մ.):
- միջատ.
Բ. թրթուրի պատեան:


Նախընթաց կենդանւոյն քիչ շատ կը նմանի հոս նկարուած Դիւրն-խոռուկան (Limnophilus flavicornis):

ՅԵՂ Բ. ԵՐԿԱՆԵՐԱՐՈՂԿՈՒԿՆԵՐ (Longicornia)

232. Յաւերթահարսը (*Calopterix splendens*) մեծ գլուխ, երկայն եւ բարակ մարմին, եւ չորս հատ հաւասար՝ ցանցակերպ երակներով թեւեր ունի: Աչուրները մեծ եւ դուրս ցցուած են եւ կը փայլին, դերձանի նման բողկուկները՝ կարճ, իսկ կզակներն՝ ամուր են: Փորն


երկայն եւ նուրբ է եւ ոսկեգոյն կանանչ կամ կանանչ-կապոյտ գու-
նով կը փայլէ: Թափանցիկ եւ զարդարուն թեւերը կամ բոլորովին եւ
կամ միայն մէջտեղը՝ կապուտակագոյն կանանչ կամ գորշ գունով են:

Այս միջատը՝ շատ ան-
գամ հովանաւոր առուակ-
ներու քովեր ջրոյ վրայ կը
թռչտի եւ կամ ջրային տըն-
կոց վրայ կը թռաի: Յաւեր-
ժահարսերու ուրիշ տեսակ-
ներ՝ ինչպէս Թաւշբաճիկ
շերիփ-կոկոր (Libellula de-
pressa) արեւուն կիզիչ տա-
քով թեան ատեն՝ շատ արա-
գաւթեամբ հոս հոն կը սլա-
նան: Ճանճ եւ ուրիշ մի-
ջատներ կը հալածեն ու
կ'որսան եւ զատուիք ջնջելով
օգտակար կ'ըլլան: — Յաւ-
երժահարսերն ի սկզբան անդ



Պտկ. 356. Յաւերժահարսն (Բ. մ.):


ջրոյ մէջ կ'ապրին: Չուերը խուժք խուժք ջրային տնկոց տակը կ'ածեն, ելած
թրթուրը կատարեալ միջատին շատ կը նմանի, բայց անթեւ է, շատ
շատակեր է եւ ջրային զանազան միջատներու ետեւէն կ'իջնայ: Թրթուրը
շատ անգամ խորիւր փոխելով վերջապէս կը կծկի եւ այս կծկածին վրայ



Պտկ. 357. Թանձրամարմին շերեփակոթ (Բ. մ.):

կարճ թեւերու մասունքներ կը նշմարուին: Բայց այս կծկածն ուրիշ միջատաց
կծկածներուն պէս հանդարտ տեղ մը չի կենար, այլ կը շարժի եւ մոռնդ-
ալ կ'առնու: Վերջապէս ջրէն դուրս կ'ելլէ, տնկի մը վրայ կպած կը կենայ,
կռնակի մորթը ճեղքելով կատարեալ միջատը դուրս կ'ելլէ:

233. Հասարակ Միօրեան (Ephemera vulgata) երկայնաձեւ մարմին մ'ունի, գոյնը դեղին է, չորս հատ գորշ գունով վանդակեալ եւ բծաւոր թեւեր ունի, որոնցմէ ետեւիններն՝ առջեւիններէն շատ կարճ



Պտկ. 358. Հասարակ Միօրեայ (A. մ.):

Ա. Թրթուրը. Բ. կատարեալ միջառը. Գ. կղզեւա կազմածով ձու (վերջինս շատ մեծցուած):

են: Բողղուկները կարճ են. փորին ետեւի երեք խողանները՝ միջատի մարմնէն աւելի երկայն են. առաջին երկու ոտքը՝ միւս չորս հատէն աւելի երկայն են: Բերնի մասսուկը ամենեւին աճած չեն:


Այս ճանճակերայ միջատը՝ անոր համար միօրեայ կ'անուանուի, վասն զի կատարեալ վիճակի մէջ շատ քիչ կ'ապրի եւ ամենեւին չ'ուտեր, շատ անգամ հազիւ քանի մը ժամ կ'ապրի: Բայց երբեմն այնպէս բաղմունութեամբ կ'ըլլան, որ թանձր ձեան հատերու պէս օդը կը լեցունեն, եւ իրենց դիակները ջուրն ու եղեգքը քանի մը հարիւրամէտր թանձրութեամբ կը ծածկեն: Շատ նշանաւոր է ի մասնաւորի Երկայնափորեան (Palingenia longicauda):

ՅԵՂ Գ. ԿՐԾՈՂՆԵՐ (Corrodentia)

234. Աղեաբհաւերը կամ Տերմիօրը (Termes bellicosus) գորշադեղին է: Միշտ մեծակոյտ բազմութեամբ կ'ապրի, եւ արուէն ու էգէն զատ ասոնց մէջ կը գտնուին աշխատաւոր ու պատերազմող ըսուածները: Արուները թեւաւոր են, 4 հատ ցանցակերպ, դեղնագոյն սպիտակ, անթափանցիկ թեւ ունին, որոնք դիւրաւ կը թափուին: Էգը սակաւատեւ ժամանակ միայն թեւ կ'ունենայ եւ ետքը շատ դիւրաւ կը ճանջցուի իւր արտաքոյ կարգի թանձր ու մեծ փորովը: Աշխատաւորներն անթեւ են, մանր կլոր գլուխ եւ ծածկուած կզակներ ունին: Պատերազմողները կամ զինուորները նոյնպէս անթեւ են, բայց չորեքանկիւն գլուխ մը եւ ամուր կզակներ ունին:

Այս տերմիտն ամենամեծ տեսակներէն մէկն է, տաք Աֆրիկէ կը գտնուի, 3 մինչեւ 3.5 մէտր բարձր հաստատուն հողաբլրակներ կը շինէ,

որոնք երկաթե գործիքներով հաղել կը քակուին: — Այրեցեալ գօտւոյն մէջ ուրիշ բազմաթիւ՝ ըստ մեծի մասին մանր տեսակ տերմիտ-



Պտկ. 359. Աշխարհաւեր (Բ. մ.):

... արուն. Բ. էգը. Կ. պատերազմող. Դ. աշխատաւոր:

ներ կան, որոնք արտաքին տեսքով ու ապրելու կերպով միջեան շատ կը նմանին, անոր համար ալ Սոյի-ի միջին կ'անուանուին: Լուսէն շատ կը փախչին, անկատար փոփոխութիւն կը կրեն եւ խանգարեալ ցանցակերպ թեւեր ունին: Շատերը հողէ մեծանիստ բոյներ կը շինեն, ընդհակառակն ոմանք ծառոց բուններու եւ կամ գետնի տակ ինքնափոր ճամբաներու մէջ կը բնակին, եւ ասոնք եթէ մարդաբնակ տեղեր հաստատեն իրենց բնակութիւնը, զարհուրելի հարուած կ'ըլլան:

Աւանց տեսնուելու՝ տներու, խանութներու եւ նոյն իսկ նաւերու մէջ ալ կը մտնեն, ամէն փայտակերտի ներքինը կը փորեն, կը կրծեն եւ այնպէս զգուշութեամբ, որ մշտ անկաթելելու երկայնութեամբ յառաջ կ'երթան, մինչեւ որ վերջապէս փայտը կը կտրի, թէպէտ արտաքուստ բոյւրովին անվնաս կ'երեւայ: Առով չէ թէ միայն գետններ, կահ կարտոնք եւ արկղներ բոլոր մէջի բաներովը, այլ նաեւ ամբողջ տներ, եւ նոյն իսկ մեծամեծ նաւեր ալ կ'ապականեն: Նաւերու մէջ մտնելով նաեւ Եւրոպա առգին անգին սպրդած եկած են: Օրինակի ազգաւ՝ Վիեննա Շէօնբուրն կայսերական պարտէզին ջերմոցներու մէջ Բրաւիլիայի մանր տերմիտ մը կայ, անկոց փայտէ թաղարներն եւ ուրիշ փայտէ կազմածները կը կրծէ, եւ թէպէտ շատ կ'աշխատին, բայց գեւ բոյւրովին ջնջուած չէ: Որովհետեւ տերմիտներն ամէն բան՝ ինչ որ քարէ կամ մետաղէ չէ, քիչ ատենուան մէջ կ'ապականեն, անոր համար իրաւամբ լինեն՝ այս տերմիտները՝ երկու Հնդկաստանի ալ ամենամեծ հարուածն անուանեց: Բայց ուրիշ կողմանէ ջերմ գոտիներու անտառներու օգտակար են, լատն զի բորբոսած փառած ծառերը կը տապալեն եւ քանի մ'անասնոց կեր կ'ըլլան, իսկ Ափրիկէ նաեւ մարգիկ ալ կ'ուտեն այս միջատը:


ՍԱՐԳ 4. ՈՒՂՂԱԹԵԻԵՐ (Orthoptera)

Այս կարգի միջատներուն կուրծքի յառաջակողմեան օղակն բոլորովին ազատ է. խաճող (ծամող) բերնի մասունք ունին եւ անկապաք փոփոխութիւն կը կրեն. 4 թեւ ունին, որոնց երկու առաջինները կարծրացած են եւ միւսները ծածկելու կը ծառայեն. իսկ ետեւի թեւերն

աւելի լայն են եւ ծալք ծալք: Իրենց քալուածքէն առնելով 3 ցեղի կը բաժնուին:

ՅԵՂ Ա. ՅԱՏԿԱՂՆԵՐ (Saltatoria)

235. Դաշտի Ժղրիդ (Gryllus campestris) սեւ գունով է, փոքրելու ոտքեր չունի, ընդհակառակն ետեւի ոտուղները շատ երկայն են:




Պտկ. 360. Դաշտի ծղրիդ (Բ. մ.):

... Բ. ընտանի ծղրիդ. Գ. դաշտի ծղրիդ:

Արուն առջեւի թեւերուն քովը ձայնի գործարան մ'ունի, որով բարձրաձայն կը ճռճուայ, ետեւի թեւերուն ծայրը սրածայր է, էգը ձուածելու խողովակ մ'ունի:

Չոր խոտաւետ տեղերու եւ դաշտերու վրայ գետնափոր ծակերու մէջ շատ կը գտնուի, գեղեցիկ օդ եղած ատեն ծղրիդը՝ այս ծակին բերանը կու դայ, գլուխը կը ծածկէ, կը նստի եւ կը ճռճուայ, բայց թեթեւ աղմուկ մը լսածին պէս ներս կը քաշուի եւ կը լռէ: Արմատներով, սերմերով եւ կենդանական նիւթերով կ'ապրի, բայց խլրդածղրիդին չափ վնասակար չէ: — Տներու մէջ ասդին անդին՝ խոհանոցը, վառարանի եւ փուռերու քովերը կ'ապրի՝ դորը կաշիի գունով ընդանի ծղրիդ (Gryllus domesticus), որ վերինին կը նմանի, ցերեկը պատերու ճեղքուածներու մէջ կը պահուբտի, իսկ գիշերը քարձրաձայն կը




Պտկ. 361. Խլրդածղրիդ (Բ. մ.):

ճռճուպ, եւ իւր կերակուրը փնտռելու կ'ելլէ, որ է՝ հաց, ալիւր, ընդեղէնք եւ այլն: Յուլիսին եւ Օգոստոսին լուսնկայ դիշերները միօրինակեալ ճռճուպ մը կը լուռի խոտերու մէջ կամ նոյն իսկ աներու մէջ, այս անասնոյն ձայնն է:

Հատ փնտաակար կրծողներէն մէկն է Խլէր-ժլէր (Աքրիդ-ժլէր) (*Gryllus Gryllotalpa*):

236. Թափառական մարախը (*Acridium migratorium*) կանանչագոյն գորշ է: Չորս հատ անհաւասար երկայնութեամբ թեւեր ունի, առջեւի թեւերը գորշագոյն են եւ վրան մուրթ բծեր կան, կարճ դեր-



Պտկ. 362. Թափառական մարախ (Ք. մ.):

ձանի պէս բողկուկներ եւ ցատկելու համար՝ երկայն ամուր ետեւի սրունքներ ունի: Կուրծքին տակի կողմը կողմնորի կարմրութեամբ է, իսկ մարմնոյն վրայի մասը՝ մոխրագոյն կանանչ:


Այս չարահամբաւ միջատը՝ Եւրոպա հազիւ ցան ու ցիր քանի մը հատ կը գտնուի, բայց երբեմն հոս ալ, բայց մանաւանդ Արեւելեան Եւրոպա, Ասիայի յառաջակողմն եւ Հիւսիսային Ափրիկէ անհաւատալի բազմութեամբ կ'ըլլայ եւ անմիջապէս կը սկսի շրջակայ կողմերն իւր

ապականիչ այցելութիւններն ընել: Մարախը գլխաւորաբար չոր տարիներէ ետքը կը սկսի իւր արշաւանքները: Ասոնց բնակութեան բուն տեղն է՝ լայնանիստ եղեգնուտ ճահիճներ, եզը ձուերը կ'ածէ եղեգան փափուկ արմատին մէջտեղը: Ամէնէն աւելի սիրով եղէգ կ'ուտեն, բայց թէ իրենց գտնուած տեղերը ըստ բաւականի մնունդ չգտնեն, անհամար բազմութեամբ կ'ելլեն եւ մերձակայ դաշտերուն եւ արօտներուն վրայ կը թափին: Հոն գտած կերն ալ բոլորովին սպառելէն ետքը՝ մեծախումբ բազմութեամբ հեռագոյն գաւառներ կը դաղթեն: Թափառական մարախին բանակները շատ անգամ ժամերով երկայն կ'ըլլան, եւ այնպէս խիտ առ խիտ, որ ամպերու պէս արեւը կը խաւարեցընեն: Իրենց իջած տեղը գետինը, ճամբաները եւ տները երբեմն քանի մը տասներորդամէտր բարձրութեամբ կը ծածկեն: Քանի մը ժամուան մէջ բոլոր պտուղները, ընդեղէնները, խոտը, եւ այդինքն ու ծառոց տերեւները կ'ուտեն կը սպառեն:

Անհաւատալի բայց ստոյգ է որ նորերս Հունգարիա ձի մը եւ ձիաւոր մը կրծած են կիսով չափ: Այս միջոցին ելած խորտոցը՝ հովէ մզուած բոցին շառաչելուն կը նմանի: Այս կերպով անապատացած երկիր մը՝ պարծ Քաղքի երեւոյթը կ'առնու: Բայց առկից սատկած կամ ձմեռած մարախները փառելով օդը կ'ապականեն եւ վտանգաւոր հիւանդութեանց պատճառ կ'ըլլան: Արաբիայի եւ Աֆրիկէի աղգերէն ոմանք այս մարախը կ'առնուն, կը չորցընեն եւ ալիւրի պէս աղալով կ'ուտեն: — Այս մարախն եւ իւր ձուերը կը ժողովն եւ կ'այրեն կամ խորունկ փոսերու մէջ կը նետեն: Թափառական մարախն իւր ձուերը խումբ խումբ հողին մէջ կ'ածէ: Չուէն ելած թրթուրները (որ Իւր-Իւր կ'ըսուին) կատարեալ աճած միջատին կը նմանին, բայց ամենեւին թեւ չունին եւ շատ անգամ իրենց խորիւր կը փոխեն: Ածկածները՝ Թե-Ի-Թու-Լու-Լու-Լու, բայց ասոնցմով կրնան միայն ցատկել, իսկ կատարեալ միջտուր կրնայ թռչիլ:

Դաշտերու վրայ շատ մը մարախի մանր տեսակներ կը տեսնուին, որ միշտ կը ցատկաւտեն, բայց թափառական մարախին պէս վնասակար չեն: Ասոնք իրենց թեւերը սրունքներուն շփելով տկար խշրտոց մը կը հանեն: Կշառաւոր է ասոնց մէջէն սեւ կանաչ մարախը (*Acridium stridulum*) իւր զարդարուն եւ խրուկի կարմրութեամբ ետեւի թեւերովը: Արեւոտ եւ մացառուտ տեղեր շատ կը գտնուի, եւ բարձրաձայն կռնչելու աղմկով մը կը թռչտի:

237. Վերինին կը նմանի, բայց երկայն բողկուկներովը դիւրաւ




Պտկ. 363. Կանանչ մարախ (*Բ. մ.*):

կը զանազանուի Կանանչ մարախը (*Locusta viridissima*) ամէն տեղ կը գտնուի, թեւերն իրարու շփշփելով կռնչուն մը կը հանէ:

ՅԵՂ Բ. ԷՍՍՈՂՆԵՐ (Gressoria)

238. Հալցոու-կ կամ Պաշտոնասէրը (*Mantis religiosa*) բարակ բողկուկներով մանր գլուխ մ'ունի, որ նեղ եւ երկայն կուրծքին վրայ կը հանգչի. բուն վիզ չունի: Փորը լայն եւ տափակ է: Ամբողջ միջատին



Պտկ. 364. Պաշտոնասէր (Ք. մ.) ծախ՝ կծկածներ:

գոյնը՝ կանանչ կամ կապուտակագոյն գեղին է: Սրունքները բաւական երկայն են. առջեւիներն արտաքոյ կարգի զօրաւոր՝ եւ յափշտակելու կը ծառայեն, ոլոքին երկայնութեամբն ամուր սղոցածեւ ակռաներ ունի, որոնք իրարու մէջ մտնելով զմեկինի պէս կը գոցուին:

Հարցուկը տաք երկիրներ՝ բայց նաեւ Միջին Եւրոպա, արեւոտ բլուրներու վրայ՝ խոտի կամ կարճաբերձ թփերու վրայ կ'ապրի, եւ իւր գոյնին պատճառաւ՝ գժուարաւ կը զանազանուի խոտերէն: Հասարակօրէն հանդարտ կը կենայ եւ կամ ճանճ եւ ուրիշ միջատ որսալու համար կամաց կամաց ասդին անդին կը սողայ: Այս վախճանիս համար՝ շարունակ գլուխը, կուրծքն եւ առջեւի ոտուրները միշտ վեր տնկած դարան կը մտնէ, որպէս զի ամէն բոլակ պատրաստ ըլլայ իւր որսը յափշտակելու եւ հաստատուն բռնելու: Իւր ճուրրը խումբ խումբ բոյսերու ցօղուններու վրայ կ'ածէ եւ հաստատուն ու կարծր հեղանիւթով մը կը հաստատէ:



Այս ցեղին վերաբերեալ զարմանալի միջատներն են. Հարաւային Եւրոպայի հարցուկը (*Bacillus Rossii*), բարակ, գլանաձեւ, առանց թեւի մարմին մ'ունի: Դոյնպէս Բրասիլիայի

Պտկ. 365. Գնայուն տորեւակներա (Ք. մ.):


եւ Արեւելեան Հնդկաստանի Յնդու եւ Ուրու-ձախ մարտերը, որոնց նուրբ եւ գորշ մարմինը շատ անգամ չոր եւ ծառի տերեւաթափ ճիւղերուն կը նմանի: Ոմանք կատարեալ վիճակի մէջ՝ կարճ եւ լայն թեւեր ալ կ'ունենան:

Գարձեալ Արեւելեան Հնդկաստանի Գնայա-Տերի-ձիւրը (*Phyllium siccifolium*) որուն փոքր եւ թեւերու ծածկոյթները՝ կատարեալ տեւրեւի կը նմանին, եւ սրունքներն ու ուղքներն ալ տերեւի պէս լայն են:

ՅԵՂ Գ. ՎԱՋՈՂՆԵՐ (Cursoria)

239. Հասարակ ունինաճոցը (Ախնջաճոց) (*Forficula auricularia*) բարակ պատենաւոր բզէզի կը նմանի, կաշիէ թեւերու կարճ ծածկոյթներ ունի, ետեւի թեւերը շատ լայն, երկայն եւ թաղանթէ են, եւ հողմահարի պէս ծալուած են: Գոյնը գորշ է, մարմինը՝ տափակ, եւ մարմնոյն վերջի ծայրը կոր արջան մ'ունի:

Գիշերական, խաւարատէր միջատ մըն է, ամենաթեթեւ վտանգ մը հասածին պէս՝ շուտ մը ծակ մտնելու կը նայի: Բայց թէ մարդկան աւկանջը կը մտնէ՝ ինչպէս անունն ալ ցոյց կու տայ, անհիմն են թագրութիւն է. ստոյգ է երբեմն մարդկան վրայ ալ կու գայ, բայց պարզապէս զգեստներու ծալքերու մէջ պահուողներու համար: Ծաղիկ ու պտուղ կրծելուն համար մարդիկ որոգայթներ կը լարեն, որպէս զի մէջը ժողվուած ունկնամուտները բռնեն սատկեցնեն:



Պտկ. 366. Ունկնամուտ
(Բ. մ.):

Պտկ. 367. Խաւարատէր ուտիճ (Բ. մ.):
— արու. բ. էգ. է. ձուի պատեան:

240. Ափսիան խաւարատէրը (*Periplaneta orientalis*) մութ գորշ գունով է, տափակ մարմին եւ արտաքոյ կարգի երկայն՝ դերձանի ձեւով բողկուկներ ունի: Միայն արուն 4 թեւ ունի, որոնց վերինները (թեւոց-ծածկոցները) բզէզներու թեւերուն պէս կաշենման են: Էգն ու թրթուրն անթեւ են:

Այս գիշերական խաւարատէր միջատին հայրենիքը Ասիա է, բայց հիմայ ամէն տեղ տարածուած է: Տներու մէջ՝ ամէնէն աւելի խոհանոց, հացադործներու խանութներու եւ պանդոկներու՝ բայց մանաւանդ բաղնիքներու մէջ կ'ըլլայ, ան տեղերն աւելի, ուր կերակրող միացորդներ կը պահուին: Ցերեկը որմածեղաններու մէջ եւ գետնին տակը խումբ խումբ քովէ քով կը գտնուին: Գիշերը՝ տան մէջ լոյսն ու հոսքը մարելուն պէս իրենց թաքստոցէն կ'ելլեն, առանց ձայնի՝ սեղաններու եւ պահարաններու վրայ կը թափին եւ ամէն ուռելի բան կը կրծեն, նոյն իսկ կաշի եւ մոմաթ ալ կ'ապականեն: Գերմանիայի խաւարատէրն (*Blatta germanica*) ալ վերինին չափ ֆեռաակար եւ նեղացուցիչ է, առաջինէն շատ փոքր է եւ բոտ բաւականի տարածուած է: Բայց այս երկուքէն ալ զգալի կերպով մեծ է՝ Ամերիկէի խաւարատէրը (*Blatta americana*), որ տեղիս տեղիս ստուգիւ զարհուրելի հարուած է: Ցաք ջուր թափելով, ծծմբի շագիւղ եւ կամ թոյնի փոշուով այս միջատը ջնջելու կը ճգնին մարդիկ, եւ կամ խոհանոցն ողնի կը բերեն, որպէս զի զատնք որոյ: Ուտիճներն առանձին առանձին չեն ստեր ձուերը, այլ թաղանթէ պատենի մը մէջ տասնուվեց հատի չափ մէկտեղ:

ԿԱՐԳ 5. ԹԵՓԱԹԵՒԻՆԻ ԿԱՄ ԹԻԹԵՌՆԵՐ (Lepidoptera)

Թիթեռները՝ կատարեալ փոփոխութիւն ունին. այս միջատներուն գլխաւոր ծանուցիչ նշաններն են՝ բերնի մասունքն ու թեւերը. գալարուած կնճիթ մ'ունին, որով ծաղիկներու հիւթը կը ծծեն, իսկ 4 թեւերուն երկու կողմը փոշնման թանձր եւ դիւրաւ ջնջուելի թեփերով ծածկուած է: Թիթեռներու որդերը՝ Լիւթոսը կ'անուանուին, եւ հասարակօրէն 16 ոտք ունին (ոմանք միայն՝ 10), որոնցմէ առաջին երեք զոյգը՝ կուրծքի ոտք, ասոնցմէ ետքն եկող 4 զոյգը՝ փորի ոտք, եւ վերջին զոյգն ալ՝ Միլոն կ'ըսուին: Կրծելու ամուր գործիքներ կզականեր ունին, եւ արտաքոյ կարգի շատակեր են: Կծկելու ատեն թրթուրը կ'ամփոփուի (կծիկ կ'ըլլայ ուստի եւ այս գործողութիւնն ալ՝ կծկել կ'անուանուի) եւ բոլորապէս հաստատուն եղջիւրէ պատեան մը կը կազմէ, շատ անգամ՝ կանխաւ բոժոժ մըն ալ կը շինէ: Կատարեալ աճած թիթեռը իւր միշտ բազմաթիւ, մանր ձուերն այնպիսի տեղ մը կ'ածէ, որ կոյր թրթրիկները դուրս ելլելուն պէս իրենց յարմար կերակուր գտնեն: Ի բաց առեալ շերամը՝ բոլոր միւս թիթեռները ֆեռաակար կրնան անուանուիլ: Թիթեռներու բազմաթիւ տեսակներն 9 ցեղի կը բաժնենք, որոնց ամէն մէկէն գրեթէ 2000—3000 տեսակ ծանօթ է:


ՑԵՂ Ա. ՍԵՐՈՐԳԿՈՒԿ ԿԱՄ ՑԵՐԵԿՈՒՆ ԹԻԹԵՐՆԵՐ

(*Rhopalocera* կամ *Diurna*)

Ցերեկոսանները դիւրաւ կը ճանչցուին իրենց նրբաւարտ մարմնով եւ բարակ, շիտակ եւ ծայրը հաստ (սեպաձեւ) բողկուկներով:

5000 տեսակ ճանչցուած է ասոնցմէ, որոնց թիւը՝ 5000ով կը մեծցընեն արեւելեան տեսակները: Ասոնց կծկածները թելով մը տեղ մը հաստատուած կ'ըլլան եւ հմանց գլուխն դէպ ի վեր ուղղուած է, իսկ հմանց՝ դէպ ի վար: Գլխաւոր տեսակներն են:

241. Յանկաթիթեւը (*Pieris crataegi*) չորս հատ ճերմակ, բոլորակ, հաւասար մեծութեամբ թեփոս թեւեր ունի, որոնց վրայ սեւ



Պտկ. 368. Յանկաթիթեւ (Ք. մ.):


զարդարուած փորը՝ կուրծքին համեմատութեամբ շատ նեղ է: Փորին մէջը մանր բշտիկ մ'ունի, ուր մեղը կը ժողվուի:

Երակաձեւ ջղեր կամ գծեր կան: Գլխուն վրայ՝ երկայն սեպաձեւ բողկուկներ, դուրս ցցուած մեծ բաղադրեալ աչուկներ եւ գալարուն կնճիթ մ'ունի: Սեւ ու թաւ կուրծքին վերի կողմը կան չորս թեւերը, իսկ վարի կողմը՝ վեց ոտքերը: Օղակաձեւ ու սեւ գծերով

Այս արտաքոյ կարգի ֆնասակար թիթեւը Մայիսի վերջերը կամ Յունիսի սկիզբները յերեւան կու գայ եւ հարիւրաւորներով՝ ճամբաներու խոնաւ տեղերը կամ ծառերու ճիւղերու վրայ կը թռչի: Իւր բազմաթիւ՝ հակթի դեղնուցի նման ձուերը, որոնք կորեկի հատերէն մանր են, պտղատու ծառոց տերեւներուն վերի երեսին վրայ կ'ածէ:

Յուլիսի մէջտեղերը պզտիկ թրթրիկները դուրս կ'ելլեն եւ տերեւը բարակ անկուածով մը կը պատեն եւ կը սկսին վրայի երեսը կրծել: Մեծցած թրթուրը 0.04 հրժ. երկայն կ'ըլլայ, 2 կողերն ու փորը կապոյտ մխրազոյն են, կռնակը՝ սեւ, եւ մէջտեղն մարմնոյն ամբողջ երկայնութեամբը երկու հատ գեղին մխրազոյն գծեր կան, եւ սեւ ու ճերմակ մագերով ծածկուած է: Թրթուրները՝ աշնան թանձր մանուածով մը ճիւղերու վրայ կը կպցընեն՝ կրծած կամ չորացած տերեւներ, եւ ասոնց մէջ ձմեռն կ'անցընեն. գարնան սկիզբը, ծառերն ծլելուն պէս կ'արթննան եւ կը սկսին ամէն բան ուսել եւ շատ անգամ՝ բոլոր տերեւներն ու ծաղիկները կրծելով, պտուղներն ամբողջովին կ'ապականեն: Բիչ մը ետքը անմիջապէս կը կծկին: 0.025 հրժ. երկայն, անկիւնաւոր, կանաճազոյն կամ սեւ ու բծկան կծկածը՝ բարակ թելով մը ծառերու ճիւղերու կամ բուններու վրայէն կը կախուի: 12—14 օր ետքը թիթեւն զպատեանը կը ծակէ եւ դուրս ելլելու ատեն քանի մը կաթիլ արեան պէս կարմիր գունով հիւթ մը կը թափէ, որ շատ անգամ առիթ տուած է միամիտ գեղացիներու կարծելու թէ տեսակ մը «արեան անձրեւ» կայ: Յանկաթիթեւն բազմանալուն առջեւ կ'առնուի ամէնէն աւելի՝ եթէ ձմեռը ծառերէն կախուած թրթրոյ տերեւները, եւ կամ ամառը՝ ձուերը եւ պզտիկ թրթուրները ջնջուին եւ մէջ տեղէն վերցուն:

242. Կապաժեօկիչ իլիկեալ (Pieris Brassicae) վերին շատ կը նմանի, սեւ երակ չունի ամենեւեմ, այլ երազներն ըստ մեծի մասին ճերմակ են:



Պտկ. 369. Շաղգամի թիթեռ (Ք. մ.):


— . — . թիթեռ. ք. թրթուր. ք. կեղծ.

Կան ուրիշ աւելի մանր, բայց նոյնչափ ֆառաւոր սպիտակ թիթեռներ. զօր. Շաղգամի իլիկեալ (Pieris rapae), առջեւի թեւերուն անկիւններուն վերի ծայրը սեւ է, եւ մէջտեղը երեք հատ սպիտակ սեւ բծեր ունի. Կապաժեօկիչ իլիկեալ (Pieris napi), որուն փորի կողմը դեղնագոյն է եւ կանաչ փոշուով երակներ ունի: Երկուքին ալ ածգոյն կանաչ կամ մոխրագոյն որդերը շաղգամի, փողկի եւ յափուկի վրայ կ'ըլլան: Բոլոր սպիտակ թիթեռներուն մէջէն ամենագեղեցիկն է Արշալոյս իլիկեալ (Pieris cardamines), արուին առջեւի թեւերուն կեսը խիստ դեղին է, իսկ ետեւի թեւերուն տակի կողմը կանաչ երակներով է:

Վահագն կամ Կարֆօն (Parnassius Apollo) ալ սպիտակ թիթեռներու կը նմանի, բայց շատ գիւրաւ կը ճանչցուի՝ գրեթէ թափանցիկ, սակաւաթեփ եւ աչաձեւ կարմրաբծ թեւերովը. ցերեկուան գեղեցիկ թիթեռներէն մէկն է, բայց միայն լեռնային կողմերը կը գտնուի: — Ասոնց տակ կ'ընթաց ծանօթ Դեղնաօկ կամ Կիպրոնի իլիկեալ որ նաեւ Տերեւ ալ կ'անուանուի (Colias Rhamni), թեւերը՝ որոշալոր, չորեքանկիւն եւ կիտրոնի գեղնութեամբ են (իսկ էգը՝ շատ բաց դունով գունաւոր թեւեր ունի), եւ ամէն մէկ թեւին մէջտեղը ժանկագոյն կարմիր բիծ մը կայ: Թիթեռներուն մէջէն ամենէն յառաջ այս թիթեռը կ'ըլլէ, շատ անգամ նոյն իսկ Փետրուարին եւ Մարտին:


Բաց կանանչ գունով եւ երկու կողմը ճեւմակ շերտերով սեւքիծ, ողորկ թրթուրը՝ Հասարակ դժնիկ (Rhamnus cathartica) եւ Բեխեռնայ (Rhamnus frangula) վրայ կը գտնուի:

243. Մախաոնի կամ Ծիծառադրի (Papilio Machaon) ցեղակուան մեծ ու գեղեցիկ թիթեռ մըն է, առջևի թեւերը երեքանկյուն



Պտկ. 370. Մաքաւոն (Ք. մ.):

են, իսկ ետևի թեւերուն վարի ծայրը պոչի պէս դուրս երկնցած մաս մ'ունի: Ծծմբագոյն դեղին է, եւ մարմնըն ու թեւոց չորս կողմը լայն,



Պտկ. 371. Մաքաւոնի թրթուրն ու կծկածը:


սեւ եզը մ'ունի, որուն արտաքին եզերքի վրայ կարգ մը՝ կիսաբլուր պզտիկ դեղին բծեր կան, նոյնպէս ներքին եզերքին վրայ ալ չորս հատ մեծ դեղին բծեր կան: Բաց ասկից՝ ետևի թեւերուն ներսի անկեան վրայ աչաձեւ կարմիր բիծ մ'ունի:

Այս թիթեռան կանանչազոյն թրթուրը՝ որ կարմիր կէտերով սեւ շերտեր ունի, կրնայ գլուխն եւ վիզ օղակը ներս քաշել, եւ անկէ մնտո երկժանի մը դուրս ցցել: Այլեւայլ Հոլանդացի (Umbelliferae) տնկոց տեսակներով կը սնանի, բայց ի մասնաւորի Հոտմ սափինով (Foeniculum vulgare): Բուն մաքաւոնէն աւելի շատ կը գտնուի Եւրոպայի Առեւտրաբան թիթեռ (Papilio Podalirius), աւելի բաց դեղին գոյն մ'ունի:

Արեւադարձի երկիրները շատ մը ասոնց նման ազնիւ թիթեռներ կան, որոնք թէ իրենց մեծութեամբն եւ թէ իրենց գոյներուն

չքեղութեամբը շատ նշանաւոր են: Մեծ եւ գեղեցիկ թիթեռներէն մէկն է արեւելեան Հնդկաստանի Պրիամուսը (Papilio Priamus), որուն թեւոց տարածութիւնը 0.19 հրձ.է քիչ մ'աւելի է:

244. Արգոսը (Vanessa Jo) Եւրոպայի ամենագեղեցիկ թիթեռներէն մէկն է: Անկիւնաւոր, եւ ծայրերը՝ զարդարուն ու ատաճաւոր եզրներով թեւեր ունի, որոնց վերի կողմը գորշ կարմիր է, եւ ամէն




Պտկ. 372. Արգոս (Ք. մ.).
Թրթուր եւ կծկած:

մէկուն վրայ մեծ կապուտակագոյն՝ մէջէ մէջ աչաձեւ բծեր կան, իսկ տակի կողմը մութ գունով է եւ շատ մը բարակ շերտեր եւ քանի մը հատ կոհակաձեւ գծեր կան:


Ասոր Թրթուրը սեւ է, ճերմակ բծեր, երկայն եւ սեւ գունով ճիւղաւորեալ փշեր ունի, բոլոր ամառն ընկերաբար՝ մեծ եղիճներու եւ գայլուկի վրայ կ'ապրին: Կծկածը՝ անկիւնաւոր եւ բաց մոխրագոյն գունով է, եւ վրան գուրս ցցուած մասեր կը տեսնուին, որոնք՝ թիթեռան կնճիթն, բողկուկներն եւ թեւերն են:

Ասոր նման՝ գեղեցկագոյն թիթեռներն են՝ Ծււլալը (Vanessa



Պտկ. 373. Ծուլակալ (Ք. մ.):
... թիթեռ. ք. կծկած. 4. Թրթուր:

Atalanta), որ թռչելի սեւութեամբ թռչելու ունի, առջեւի թռչելուն մէջտեղը ծիրանագոյն կարմիր շերտ մը կայ, իսկ թռչելուն ծայրերը ճերմակ բծեր: Մեռելեայ (Vanessa Antiopa): Մեծ աղւետիկ (Vanessa Polychloros). թռչելը՝ անկիւնաւոր են իսկ եզրներն ատամնաւոր եւ խորշխորշեան ներս մտած. վրայի կողմը կարմրագորշ է եւ վրան սեւ բծեր կան:



Պտկ. 374. Բամբիշ (Ք. մ.):

Բախիշ (Vanessa urticae), որուն սեւ թրթուրը շատ անգամ խայթող եղիճին վրայ կ'ապրի:

Շողմիկեայ թռչելու վերի կողմը գորշ գեղին է եւ սեւագոյն բծերով, իսկ տակի կողմը գաղտակրի պէս փայլուն գծեր ու բծեր կան: Արծաթաշող կամ Լատոնիկ (Argynnis Paphia) ըստաճն առնոց մէջէն ամենամեծն է, տակի կողմը՝ չնչ եւ արծաթի պէս փայլուն շերտեր կան: Սովորական երկու տեսակներն են՝

Փոքր արծաթաշող (Argynnis Latonia) որուն թռչելուն տակի կողման վրայ




Պտկ. 375. Արծաթաշողիկ (Ք. մ.):

գաղտակրի մեծ եւ շատ փայլուն բծեր կան եւ Մեծ արծաթաշող (Argynnis Aglaja). աւելի մանր բայց բազմաթիւ բծեր ունի:

Կապույտ լիկեայ թռչելու վերի կողմը գեղեցիկ մանր թիթեռներ են, որոնց թռչելուն վերի կողմը երկնագոյն կապույտ գունով կը փայլի, իսկ տակի կողմը մխրագոյն է եւ բազմաթիւ մութ աշտճեւ բծեր ունի: Ասոնցմէ առաջինը յաճախ կը գտնուի Բաղաշիկ լիկեայ (Lycaena Aëxis):

Ասոնց կը նմանի մանր Կարգաշիկ (L. Virgaureae), բայց ասոր թռչելուն վերի կողմը չորաշէկ գոյն ունի:




Պտկ. 376. Կապոյտ թիթեռ (Բ. մ.):
Կանաչի եւ փրի կողմը:

Այրեւմտիկները կամ Մեծ ձիւձու (Apatura iris) «եւ գորշ գունով սպիտակախառն թեւեր ունի, իսկ արուններու թեւերը մուր մանուշակագոյն են եւ շատ գեղեցիկ կը շողան: Այս կարգի թիթեռներուն կծկածը թեւը մը վըայէն գլխիկայր կը կախուի:

ՑԵՂ Բ. ՍՓԻՆԻՔՆԻԻ (Sphingida)

Երկրորդ ցեղը նշանաւոր է իւր թեւակերպ անկիւնաւոր բողկուկներովը. երկայն գնդաձեւ մարմին եւ շատ երկայն կնճիթ մ'ունին այս թիթեռները: Հողի մէջ կը կծկին եւ մաշկի նման գորշ պատեանի մէջ: Գլխաւոր տեսակներն են:

245. Գանգ (աւիւնեւ)ը (Acherontia Atropos) մեծ՝ մուր գունով թիթեռ մըն է. մարմինը՝ հաստ կլորուկ եւ դէպ ի ծայրը երթա-




Պտկ. 377. Գանգ (Բ. մ.):

լով կը բարակնայ, թեւերն երկայն եւ նեղ են: Կուրծքի կտորին վերի մասին վրայ մարդու գլխու նման նշան մ'ունի, ասկէ առած է իւր անունը: Առջեւի թեւերը սեւագորշ են եւ դեղին բծերով ու գծերով, իսկ ետեւի թեւերը՝ դեղնագեղե պէս դեղին են, եւ ասոնց վրայ երկու հաստ սեւ շերտեր կան: Փորը՝ դեղին է եւ սեւ օղակներ ունի:

Այս մեծ ու հաստ թիթեռը յատուկ եւ ողբական ձայն հանելու յատկութիւն ունի: Շատ տեղ կը գտնուի, բայց սովորական չէ: Թրթր-թռլը շատ մեծ կ'ըլլայ, մերկ, կանանչագոյն դեղին եւ կոնական վրայ կապոյտ օձաձեւ շերտեր ունի, վերջնթեր օղակին վրայ սրածայր եղջիւր մ'ունի, եւ գետնախնձորի եւ Հաշաշի (*Lycium barbarum*) վրայ կ'ապրի: Աշունը գետնին տակը կը կծկի եւ Յունիսին իբրեւ թիթեռ գուրս կ'եղլէ:

246. Հոճոյ Սփինգս (Sphinx pinastri) բոլորգիծ եղջնեղով թեւեր ունի (այսինքն ակոսայ ակոսայ չեն): Առջեւի թեւերը մոխրա-




Պտկ. 378. Եռմույ սփինքս. թիթեռ. թրթուր եւ կծկած (P. մ.):

գոյն են եւ մէջտեղը 3 հաս սեւ շերտեր կան, ետեւի թեւերը միագոյն խարսեաշ են, փորը սեւ է եւ ճերմակ շերտեր ունի:

Ասոր կանանչագոյն, կարմրագիծ սւ գեղնաբիծ եղջերուօր թրթուրը՝ շոճիներու եւ ուրիշ կոնաբեր ծառաց վրայ կ'ապրի եւ իւր շտակերու թեամբն երբեմն շատ մեծ փնառ կը հասցընէ:

Բայրեղը թեւերով թիթեռներն են. Կօլնէնէն փէնտը (Sphinx euphorbiae) որուն առջեւի թեւերը ձիթապտոյ պէս կանաչ են եւ



Պտկ. 379. Կիպրոսի սփինքս (թրթուր) (Ք. մ.):

գեղնագոյն ճերմակ շերտեր ունին, իսկ ետեւիները՝ սեւ են եւ վարդագոյն կարմիր շերտերով: Կէպրոսի փէնտը (Sphinx ligustri), որուն



Պտկ. 380. Աղանեստուտն (մէկը մեղր կը ծծէ):

Այս թիթեռը զարուռի կերպով ցերեկն ալ բզգալով ծաղկանց բայրափքը կը թռչտի, եւ շատ երկայն գալարուն պատիճ մ'ունի, որով ծաղկանց քաղցը հիւթը կը ծծէ: Սովորաբար իրիկունները լոյս եղած սենեակները կը

առջեւի թեւերը մխրագոյն գորշ են, իսկ ետեւիները՝ վարդագոյն կարմիր եւ սեւ գծերով: Թրթուրը մարմնոյն երկու կողմը կարգ մը փուշ ունի. մարմնոյն ամէն մէկ օղակին վրայ ակնածեւ կլոր բիծ մը կը նշմարուի եւ 4—5 սպիտակ կէտեր: Ալանէստուտը (Macroglossa stellatarum). առջեւի թեւերը մխրագոյն գորշ են եւ սեւ եղջեր ունին, ետեւիները ժանկագոյն գեղին՝ եւ գորշ գծերով, փորին ծայրն ալ փունջ մը մագ ունի:

մտնէ եւ շատ դժուարաւ կը բռնուի, վասն զի արագաշարժ է եւ թեւ փոստ փայլուն մարմին մ'ունի. բռնուելու ատեն շատ անգամ թեփերը բուլրովին կը թափին եւ միայն սեւ մարմինը կը տեսնուի:

ՅԵՂ Գ. ՓԱՅՏՓՈՐ ԹԻԹԵՌՆԵՐ (Xylotropha)

247. Ուռնույ փայտփորը (*Cossus ligniperda*) մեծ, անշուք սեւ մոխրագոյն գունով թիթեռ մըն է, առջևի թեւերուն վրայ գորշ գունով ամպաձեւ բծեր կան:



Պտկ. 381. Ուռնույ փայտփոր (Բ. Մ.):

Վերը եւ աջ՝ թիթեռը, իսկ վարը փայտին մէջ՝ թրթուրը, քովը՝ կեկածը:

Ասոր մեծ, մերկ եւ մնացոյն թրթուրը, հին ուռիներն ու շաճիներն ամենայն ուղղութեամբ կը փորէ եւ փայտի կտրուածքներէ շինուած բոժոժի մը մէջ կը կծկի: — Վայրենի շագանակներու, թմբիներու եւ ընկուզիներու եւ ուրիշ ծառոց վրայ վերինին նման վնասակար ուրիշ թիթեռ մը կ'ապրի, որ Կոսկինոյ փայտէր (Cossus aesculi) կ'ըսուի, գիւրաւ կը ճանչցուի իւր ճերմակ թեւերուն վրայ ունեցած շատ մը սեւագոյն կապոյտ կէտերով ու բծերով:

248. ՄԵՂՈՒԱՆԻՆԻԷ՝ ԿԱՄ ՄԵՂՈՒԱՆԻԷՐԿ ՌԻՆԷՐ (Sesia apifor-mis) արտաքին տեսքովը մեղուի կամ պիծակի կը նմանի: Թեւերը տեղիս տեղիս անթեփ են, ուստի եւ ապակոյ պէս թափանցիկ, միայն եզրներն ու երանները՝ ժանկագոյն գորշ են: Մարմինը նեղ է՝ դեղին եւ սեւ օղակներով:

Ցերեկն արեւկային՝ կը թռչտի. իւր սպիտակագոյն դեղին թրթուրը՝ որ կունակին վրայ ունեցած մութ գծովը շատ գիւրաւ կը ճանչցուի, կաղամախինբու բուններուն եւ արմատներուն վրայ կ'ապրի: — Ասոնց



Պտկ. 382. Մեղուաճիթեռ (Ք. մ.): Պտկ. 383. Սպիտակախայտ թիթեռ (Ք. մ.):

տակը կ'երթայ Կոսկինոյ (Zygaena filipendulae), եւ հոս նկարուած՝ ՍԴԵՄԻՆԻՆԵՐ (ՌԻՆԷՐ) (Syntomis phegea). Տարմնոյն վարի օղակներուն վրայ դեղին շերտեր ունի, գեղեցիկ եւ քնքուշ թիթեռ մըն է:


ՑԵՂ Դ. ՄԱՆՈՂՆԵՐ ԿԱՄ ՈՍՏԱՆԱՆԿ ԹԻԹԵՐՆԵՐ (Bombycida)

Թանձրամարմին եւ մազոտ թիթեռներ են՝ մանաւանդ էգերը. առուին բողկուկները՝ սանդրաձեւ են, մեծ թեւեր ունին: Գլխաւոր տեսակներն են:

249. ՇԵՐԱՄ (ԲՈՄԲԻԷՐՈՒ, ՄԵՐԱԳՈՐԴՈՐԻՅ, ԿԵՐԱՍԱՐԷՐ, ՀԵՆՊԵՆՆԵՐ) (Bombyx mori) անշուք ճերմակ թիթեռ մըն է, հաստ մարմին մ'ունի, իսկ թեւերուն եզրերը հաստ ատամնաձեւ մասեր ունի, որոնց վրայ շեղ շերտեր կան:

Գրեթէ ամբողջ թիթեռանց մէջէն մինակ շերամն ուղղակի մարդուն օգտակար է, եւ անոր համար շատ տեղեր բազմութեամբ կը բուծանեն, բայց մանաւանդ Հնդկաստան, Փոքր Ասիա (Բիւլէիք եւ Բրուսա): Բուն հայրենիքը Չինաստան է, հին ատենը մետաքսի պատճառաւ՝ որ այն երկրին գլխաւոր բերքն էր, Սինոյոյ երկրի կ'անուանուէր: Եւ րուպիք՝ շատ ուշ իմացան մեծագին մետաքսի ծագումը, որովհետեւ

պատմութեան նայելով 6-րդ դարուն մէջ երկու յոյն կրօնաւորներ շերամին ձուերը սնամէջ գաւազաններու մէջ դնելով, կոստանդնուպոլիս




Պտկ. 384. Շերամ:

Թրթուր, կեկած (բոժոժի մէջ), բոժոժ, Թիթեռ (ձու կ'ածէ) (ամէն ալ Բ. մ.):

բերին: Կամաց կամաց այս օգտակար միջատը սկսան բուծանել Յու-նաստան, Իտալիա եւ Հարաւային Գաղղիա, ուր շերամաբուծութիւնն ու մետաքսագործութիւնը հազարաւոր մարդկան արուեստն ու գործն է:

Շերամի Թիթեռ՝ Եւրոպի վերջերը բոժոժէն դուրս կ'ելլէ: Էգը՝ 2—300 կորեկահատի մեծութեամբ կապուտակազոյն ձուեր կ'ածէ, որոնք ամբողջ ձմեռը կը մնան: Գարնան՝ Մայիսի մէջերը կամ վերջերը, երբ ճերմակ Թիթնին, որ շերամին մի միակ կերակուրն է, տերեւալոյց կը զարդարուի, Թրթուրները ձուերէն դուրս կ'ելլեն: Մանր Թրթրիկները (Հնդիկ որդերը) արտաքոյ կարգի շատակեր են, շատ շուտ կը մեծնան, եւ մինչեւ որ կատա-րեալ աճին (որ չորս շաբաթ կը տեւէ) չորս անգամ իրենց խորիւր (մորթը) կը փոխեն: Հնդիկ որդը կատարեալ աճած ատենը 0.665 հզմ. երկայն, լերկ, բոլորովին ճերմակ կ'ըլլայ, եւ մարմնոյն վերջնութիւնը անդամին վրայ պզտիկ եղջիրիկ մ'ունի: Այսպէս աճելէն ետքը կը սկսի սովորաբար ծաւերու ճիւղերու մէջտեղը իւր զարմանալի բոժոժը մանել: Քանի մը անկանոն Թե-լերով ճիւղերու մէջտեղը հաստատուելէն ետքը, աղաւնոյ հաւկթի մեծու-թեամբ ու ձեւով՝ հաստ եւ երկայն բոժոժ (կոկոն) պատեան մը կը պատէ իւր բոլորտիւրը: Բոժոժին Թելերը, միեւնոյն որպիսութիւնը չեն ունենար: Արտաքին Թոյլ պատեանը՝ տեսակ մը խոշոր մետաքս՝ Դուսել (գգ. filoselle, fleuret) կ'ըլլայ. մէջտեղինը՝ 250—300 մետր երկայն՝ կանոնաւոր եւ անշփոթ Թելէ կը կազմուի, եւ ասիկա ամէնէն յարգի մետաքսն է, իսկ ամէնէն ներսի խաւը շատ խանդարեալ ու շփոթ է, ասկէ ալ Լուտ (գգ. ouate) բուռած մետաքսը կ'ելլէ: Թրթուրը այս բոժոժը 4 օրուան մէջ կը լինցնէ: 18 մինչեւ 20 օր ետքը Թիթեռն իւր բերնէն ելած հեղանիւթով մը այս

Սնկաբեր լիփարիս (Liparis dispar) արուն պղտիկ է, սանդղաձև բողկուկներ ունի, եւ գորշ թեւերուն վրայ անորոշ, կոհակաձեւ սեւ գծեր կան. էգը շատ մեծ է, խոզանաձեւ բողկուկներ ունի եւ մոխրագոյն ձերմակ է: Էգը գորշ մետաքսանման նիւթով մը՝ զոր փորին վրայ կը




Պտկ. 388. Մակաբեր թիթեռ (Բ. մ.):

Տակը՝ թրթուրը. ձախ կողը՝ արուն. իսկ աջ՝ էգը:

կրէ, սնկի մը պէս ձուերը կը պատէ, եւ ասկէ առնելով՝ սնկաբեր կ'անուանուի: Թրթուրները գորշ մոխրագոյն գունով են եւ 3 հատ բարակ դեղին գծեր ունին, առջի հինգ օղակներուն վրայ՝ 5 կապոյտ, եւ միւսներուն վրայ 6 հատ կարմիր մարգարտաձեւ բծեր կան, եւ մեծ գլուխ մ'ունին: Ամէն պտղատու եւ սաղարթաւոր ծառոց վրայ կ'ապրին եւ շատ փնասակար են: Նոյնպէս Ուլիֆօրիէն (Liparis chrysorrhoea) ալ վերինին չափ փնասակար է. փորը՝ ժանկագոյն դեղին, իսկ մնացած բոլոր մարմինը ձեան պէս ձերմակ է:

Գոյնզգոյն մետաքսաբերներուն կը վերաբերի Հարաւային Արեւելիսը




Պտկ. 389. Արջաթիթեռ (Բ. մ.):

(Arctia caja). առջեւի գորշ թեւերուն վրայ ձերմակ բծեր կան, եւ տեւի թեւերը կարմիր են եւ սեւ բծերով: Թրթուրը հասարակ խոտե-

բուս վրայ կ'ապրի. գորշ է, եւ շատ երկայն եւ գուղձերէն բուսած փնջաձեւ թանձր մազերով ծածկուած է:

Ասոնցմէ աւելի չքեղ են Գիշերուան արգոսները, որոնց մէջէն՝ Մեշ Յիւր-նի (Saturnia pyri) Եւրոպայի եւ Փոքր Ասիայի ամենամեծ թիթեռն է. Թրթուրը դեղնագոյն կանանչ է եւ վրան շատ մը խողաններով պատած կապոյտ բշտիկներ ունի: Ցանձենւոյ եւ ուրիշ պտղատու ծառոց վրայ կ'ապրի:



Պտկ. 390. Մանր ծիրանին (Բ. մ.):
Թրթուրը, թիթեռը, բոժոժը:

Միջնամասի չափ մեծութիւն կ'ունենայ. անսովոր գոյնին պատճառաւ շատերը կը վախնան այս թրթուրէն, բայց՝ բնական է, սնտոի երկիւղ մըն է. ասոր բոժոժը գորշ գունով է եւ անհարթ:

Ասոր շատ կը նմանի բայց անկէ շատ մանր է Մեշ Յիւր-նի (Saturnia carpin)։ Աշխարհիս ամենամեծ թիթեռներէն մէկն ալ Չինաստանի Ատլաս Թիթեռն (Attacus Atlas) է. թեւերը տարածած ատենը 0.24 հր. երկայն՝ եւ ամէն մէկ թեւին վրայ տանձաձեւ ապակւոյ պէս պայծառ չորեքանկիւն բիծ մը ունի:

ՑԵՂ Ե. ՌՈՒՆԹԻԹԵՐՆԵՐ (Noctuida)

251. Սերմանեայ Բոս-միւր-նի (Agrotis segetum) միջակ մեծութեամբ ցայգաթիթեռ մըն է, խողանաձեւ բողկուկներ ունի, առջեւի թեւերը սեւ թեփերով ծածկուած են, որոնց վրայ գծակերպ սեւ նկարներ կան, իսկ ետեւի թեւերն՝ գորշագոյն սպիտակ են:

Ասոր թիթեռը՝ որ հնձոց արտաքոյ կարգի վնասակար է, հիւսիսային Եւրոպա Օգոստոսին կ'ելլէ եւ իւր ձուերն երկրիս մէջ կ'ածէ: Մանր թրթուրիկներն աշնան կ'ելլեն, ընդեզնայ մատաղ տնկերով կ'ապրին, յետոյ գետնի տակ կը ձմերեն եւ գարնան կը սկսին դարձեալ իրենց շատակերութիւնն յառաջ տանիլ: Ատարեալ աճած թրթուրը 0.05 հր.էն քիչ մ'աւելի մեծ է, մերկ, մալթ կանանչ, սեւ կէտերով եւ դէպ ի երկայնութեանը շերտեր ու գծեր ունի:



Պտկ. 391. Սերմանեայ
բուսթիթեռ (Բ. մ.):

Ցերեկը գուրս կ'ելլէ եւ բնական է այս պատճառաւ աւելի մեծ է իւր տուած վնասը: Հողի մէջ առանց բոժոժի կը կծկի:

Հիւսիսային երկրներու արօտներու վրայ կապրի Խոթ-կէր Բոս-միւր-նի (Charaeeas graminis), որ վերին չափ վնասակար է: Այս վնասա-

կար միջատը ջնջելու կ'աշխատին ագռաւները չհալածելով եւ խողերը արտաներու վրայ տանելով, որովհետեւ ասանք իրենց գետնաբիր կնճիթովը հողը տակն ու վրայ կ'ընեն: — Բանջարեղինաց պարտէզներու մէջ կը գտնուի Կ-զմբ-իէր Բո-միլիէ-ը (*Agrotistra brassicae*), եւ կոնարեր անտառներու մէջ Ս-միլիէր Բո-միլիէ-ը (*Trachea piniperda*). Երկուքն ալ շատ կը գտնուին:

252. Կարիթի շերտաւոր կամ Գօրէ-ոյ լիլիէ-ը (*Catocala nupta*) մեծ թիթեռ մըն է, ետեւի թեւերն խրուկի պէս կարմիր են, որոնց վրայէն երկու հատ լայն սեւ շերտեր կ'անցնին: Առջեւի թեւերը կապոյտ մոխրագոյն են, եւ ասոնց վրայ գորշ գունով երկտող օձաձեւ գծեր կան:



Պտկ. 392. Կարմիր շերտուկը (Ռ. մ.):

Թրթուրը մերկ եւ գորշ է, ութերորդ օղակը՝ ուռէցքի պէս դուրս ցցուած է. ուռնակայ եւ կաղամախիներու վրայ կ'ապրի:

— Ասոր նման՝ Կ-ոյ Գ-շերտաւոր (*Catocala fraxini*) առաջինէն աւելի մեծ է, ետեւի թեւերը սեւ են եւ վրան բաց կապոյտ գունով լայն շերտ մը կայ:

ՑԵՂ 2. ԵՐԿՐԱԿԱՓԻՆԵՐ (Geometridae)

253. Մանր երկրապափը (*Cheimatobia brumata*) գորշ մոխրագոյն գունով, մանր ցայգաթիթեռ մըն է, ետեւի թեւերը քիչ մը բաց գունով են: Առջեւի թեւերուն վրայ շատ մը մութ գծեր կը նշմարուին: Էգը սպիտակ-մոխրագոյն է եւ միայն թեւերու կոճեր ունի եւ չի կրնար թռչել:

Այս երկրապափ թիթեռը՝ որ պտղատու ծառոց շատ անգամ արտաքոյ կարգի ննասակար է, հազիւ Հոկտեմբերին վերջերն եւ Նոյեմբերին սկիզբները կը տեսնուի: Անթեւ էգը սողալով ծառերու վրայ կ'եյլէ եւ տերեւներու ու ծաղկանց կոկոններու վրայ 200էն աւելի ձու կ'ածէ: Գարնան սկիզբը՝ մանր թրթուրները դուրս կ'ելլեն, նախ եւ յառաջ կոկոններու վրայ կը յարձակին, յետոյ տերեւներուն վրայ, եւ նոյն իսկ պտուղներուն ալ չեն խնայեր: Մանր թրթուրը իւր բաց կանանչ գունովը՝ եւ փորի ոտքեր չունենալով շատ դիւրաւ կը ճանչցուի: Մայիսի մէջերը կամ վերջերը թրթուրները բարակ թեւով մը ծառոց ծիւղերէն վար կը կախուին եւ հողին մէջ կը կծկին: — Այս ննասակար թիթեռն արտաքոյ կարգի բազմաճիւղ կը խափանուի, եթէ երգեցիկ թռչունները չհայածուին, Յունիսէն մինչեւ Սեպտեմբեր պտղատու ծառոց բոլորտիքն եղած հողը փորուի եւ հողը լաւ մը թո-




Պտկ. 393. Մանր երկրաչափ (Բ. մ.):
Չախ՝ արու. աջ՝ էգ. տերեւի վրայ՝
որդը, աջ՝ կծկածը:



Պտկ. 394. Մեծ երկրաչափ (Բ. մ.):
... էգ. Բ. արու. Գ. որդը:

պուխի եւ Հսկտեմբերին եւ Նոյեմբերին ծառոց բոլորտիքն աղը դրուի:
— Նոյնչափ փնասակար թիթեռ մըն է՝ Մեծ երկրաչափը (Hibernia
defoliaria), ասոր դորշ կարմիր թրթուրը՝ Մայիսէն սկսեալ մինչեւ
Յունիս պտղատու ծառոց եւ Ուշբենայ (Betula alba) վրայ կը գտնուի
եւ շատ աւեր ու ապականութիւն կ'ընէ: Այս եւ Հետեւեալ միջատ-
ներուն՝ երկրաչափ (Geometrae) անունը տրուած է, վասն զի զարմա-
նալի քալուածք մ'ունին ասոնց թրթուրները. փոփոխակի մէյ մը
առջեւի եւ մէյ մը ետեւի ոտուրները
կը շարժեն, եւ մարմինը աղեղնաձեւ
կամ կամարաձեւ կ'ուռեցընեն եւ դէպ
ի յառաջ կը շարժեն:



Պտկ. 395. Հստառուկ (Բ. մ.):


Ասոնց տակը կ'երթայ՝ Հոգոսի-
կամ Հոգոսի խիւր (Zerene gossulariata) որ շատ մը սեւ ու կլոր
բծերով ծածկուած է:

ՅԵՂ Է. ԳՈՒՐՈՒՆԵՐ (Tortricida)

254. Խնչորախիւր (Carpocapsa pomonella) մանր, բայց զար-
դարուն թիթեռ մըն է: Առջեւի թեւերը կապոյտ-մոխրագոյն են, ա-
սոնց վրայ շատ մը բարակ շեղ գծեր՝ եւ արտաքին եզերքին վրայ մեծ
եւ ոսկեգոյն փայլուն աչաձեւ բիծ մը կայ, ետեւի թեւերն առաջն-
ներուն հաւասարաչափ են եւ միագոյն կարմրագորշ են:

Խնձորենեբու եւ տանձերու որդնոտիլն այս փնասակար թիթեռէն յառաջ կու գայ: Մայիսին կը թռչի եւ իւր ձուերն կ'ածէ՝ խնձորենույ եւ տանձենույ պտղոյ կոկոններու վրայ:


Մանր կարմրագոյն թրթուռները՝ խակ պտուղներուն վրայ կը բանան ծակ մը՝ որ հազիւ կը տեսնուի, եւ անոր մէջ մինչեւ աշուն կ'ապրին: Եետոյ մեծ ծակէ մը դուրս կ'ելլեն, որուն մէջ շագանակի գունով փողի մը կ'ըլլայ (ինչպէս որ փտտած խնձորենեբու մէջ շատ լաւ կը տեսնուի) եւ ճերմակ բոժոժի մը մէջ՝ ծառոց կեղեւներու ճեղքուածներու եւ կամ մրգաստաններու մէջ կը կծկին: Շատ անգամ ձմեռն արդէն այս փոփոխութիւնը մնցած կ'ըլլայ եւ երկրորդ ծնունդ մը կը սկսի, որ հասունցած խնձորենեբու եւ տանձերու փնասակար կ'ըլլայ: Որպէս զի այս թիթեռն արտաքայ կարգի չբազմանայ մի միակ միջոցն է փնասուած եւ թափուած պտուղները ժողվել եւ փճացնել:



Պտկ. 396. Խնձորաթիթեռ:

Չախ՝ թիթեռը, աջ՝ կծկածը, վարը որդը, եւ խնձոր մը՝ որուն մէջէն կ'ելլէ որդը:

Ասոր շատ կը նմանի Կոռնիկիւնեբ (Tortrix viridana): — Կոռնիկիւնեբ (Tortrix buoliana) արծաթագոյն սպիտակ առջեւի-թեւեր ունի, որոնց



Պտկ. 397. Կորեկաթիթեռ եւ որդը (Բ. մ.):


վրայ դեղնադոյն կարմիր շերտեր կան, իսկ ետեւի-թեւերը մոխրագոյն են: Իւր մուրձ գորշ եւ սեւագլուխ թրթուրը՝ Կոռնիկիւնեբ ծառոց կոկոններու եւ բողբոջներու մէջ կ'ապրի, որով ծառերը չեն աճիր, ճիւղերն ալ կը չորնան:

Այս մանր թիթեռները կ'ապրին ալիւրի, ապականած եղի եւ ճարպի մէջ, փեթակներու մէջ (մոմով եւ մեղրով), ինչպէս նաեւ կենդանի բուսոց բուններու, ցողուններու եւ փոճկներու մէջ: Կոռնիկիւնեբ (Pyrallis silacealis) թրթուրը՝ դայլուկի, կորեկի եւ եգիպտացորենի բուններուն մէջ կ'ապրի եւ այս տակերը կը չորցնէ:

ՑԵՂ Ը. ՑԵՅԻՐ (Tineida)

255. Ցորենի յեցը՝ որ նաեւ ցորենի որդ (Tinea granella) ալ կ'անուանուի, մանր, թիթեռ մըն է, անշուք, առջեւի-թեւերը նեղ ու բարակ են: Այս թեւերը մոխրագոյն են եւ գորշ ու սեւագոյն բծերով

ընդհակառակն ետեւի թեւերը գորշագոյն են եւ եզրները շատ երկայն վերջաւորներ ունին:




Պտկ. 398. Ծորենի ցեց:
Թրթուր, թիթեռ եւ կծկած (Բ. Մ.):

որ որդի կը նմանի, կատարեալ կ'աճի, ցորենի մէջէն գուր կ'ելլէ եւ շտեմարաններու պատերու վրայ, փայտի կտորներով խառն հիւսուածքի մը մէջ կը կծկի: Այս փոսակար միջատէն ազատելու համար պէտք է ցորենեղէնները ստեպ ստեպ թիով տակն ու վրայ բնել, մաղել եւ հովթփել:

256. Մէյը կամ Հանդերլէյ ցեցը (*Tinea spretella*) արտաքոյ կարգի մանր թիթեռ մըն է, առջեւի թեւերը փայլուն բաց դեղին են, իսկ ետեւի թեւերը՝ մոխրագոյն-գորշ եւ ծայրերն ալ ծոպեր կան:

Այս ցեցը՝ ինչպէս նաեւ միագոյն կահ-ցեց (*Tinea biselliella*) ըսուածը, առաջինէն աւելի շատ կը գտնուի, Ապրիլի վերջերէն սկսեալ ամբողջ ամառը՝ իրիկունը տներու մէջ կը թռչտի, եւ շատ անգամ վտուուած ծրագին բուրտիքը կը լեւելնէ: Ծերեկը մթին տեղեր, զգեստեղէնաց պահարաններու




Պտկ. 399. Ծեցեր (Բ. Մ.):

Բնակարաններու մէջ գտնուող 4 հասարակ ցեցերը հետեւեալներն են. — Բ. Ալբերի ցեց (*T. lacteella*). Գ. Դ. Հանգերէից ցեց (*T. spretella*). Ե. Զ. Մաշկեկաց ցեց (*T. pelionella*) եւ Զ. Բ. Կարասեաց ցեց (*T. biselliella*):

կ'առնուի: Ասոնց կը վերաբերի ի մասնաւորի նաեւ Մաշկեկից (*T. pelionella*) եւ Ալբերի ցեցը (*T. lacteella*), որ նշանաւոր է թէ մեծութեամբ եւ թէ ալիւրի եւ ալբերեղէն կերակրոց մէջ գտնուելովը:

է, ծայրը սկաւառակաձեւ է եւ կրնայ դուրս երկննալ: Կուրծքի կտորին վրայ 2 հատ թաղանթեայ, թափանցիկ թեւեր կան, որոնց վրայ 8—10 երակներ կը նշմարուին, իսկ ետեւի թեւերուն փոխարէն ունի՝ երկու հատ թեփուկ, որոնք ուրիշ երկու կոթնաւոր բուներ կը ծածկեն եւ ասոնք շուտ շուտ կը ճօճան: Ոտից վերջին զոյգին ճիրաններուն տակը երկու հատ մանր կաշուն գնդակներ ունի, որոնք հարթ եւ ողորկ երեսի վրայ մագլցելու կը ծառայեն:



Պտկ. 40%. Բուն ծանծ:


Թրթուր, կծկած (մեծց.): Բուն կամ խցի ճանճը՝ շատ տարածուած անհանգիստ միջատներէն մէկն է: Ամէն տեղ տեսնու մէջ եւ անոնց քովերը մարդկան եւ անասնոց շատ տաղտկութիւն կը պատճառէ, վասն զի ստէպ ստէպ անոնց վրայ կու գայ կը նստի (ասկէ առնուած է՝ «ճանճի պէս կը կպչի» ասութիւնը), եւ ամէն առարկայ կ'աղտոտէ, բայց արիւն չի քամեր:

Ամէն տեսակ հեղանիութիւն կը սնանի, եւ չաբար ու ասոր նման լուծանելի նիւթեր ալ կը ծծէ: Իւր ձուերը՝ աղբի, աւլուած շիւղերու եւ աղտոտ թրքամաններու եւայլն, մէջ կ'ածէ: Մանր ճերմակ թրթուրն՝ անգլուխ եւ անաստ որդի կը նմանի. արտաքոյ կարգի շատակեր է եւ շատ արագ կ'ածէ: Տասնուչորս օրուան մէջ կատարեալ կ'ածը եւ կը կծկի, կծկածը մանր խարտեաշ տակառակի մը կը նմանի: Հետեւեալ 14 օրուան մէջ ճանճը կը կաշմուխ եւ տակառակին վերի մասը ծածկոցի մը պէս կը բանայ եւ դուրս կ'ելլէ: Դէպ ի աշուն ճանճերը շատ կը բազմանան, մանաւանդ ախոռներու եւ խոհանոցներու քովերը: Չմեռն ամէն ալ կը սատկին, ի բաց առեալ քանի մը հատը, որ պատուարուած տեղեր կը պահուրտին: Այլեւայլ դեղեր գործածելով ասոնց շատ արագ աճումը կ'արգելուի: Կորագոյն ժամանակներս իբրեւ հիւանդութեան փոխադրիչ ճանցուեցան ճանճերը. բայց օգուտ ալ ունին, բոտ որում օդի մէջ շատ տեսակ բակեղներ եւ մանրիկներ կը ծծեն կը սատկեցընեն:

259. Կապոյոք Բուր (Musca vomitoria) փայլուն մութ կապոյո գունով մարմին ունի, որուն վրայ սեւագոյն շեղ գծեր կան: Գլուխը սեւ է, թեւերը կարծես ջրախառն թանաքով սեւցած են, բայց թափանցիկ են:

Այս մեծ ճանճը շատ անգամ սաստիկ բզզալով պատուհաններէն ներս կը մտնէ եւ ստէպ ստէպ պատուհանի ապակիներու եւ ուրիշ առարկայից կը զարնուի: Էգն իւր ձուերը մանր դէգերով մնի կամ դիակի վրայ՝ եւ երբեմն նաեւ մարդու թարախալից վիրաց մէջ կ'ածէ: Շատ քիչ ատենէն դուրս կ'ելլեն թրթուրները, արտաքոյ կարգի շատակեր են եւ այնպէս շուտ կ'ածին, որ 24 ժամ ետքը՝ սկզբնաբար եղածէն 200 անգամ աւելի ծանր կ'ըլլան, եւ 4—5 օրուան մէջ կատարեալ կ'ածին եւ 0.01 հր. երկայն կ'ըլլան: Թրթուրները կծկելու համար հոգին տակ կ'երթան: Կծկածը՝ կարմիր դոռը գունով, բարակ ծալքերով պղտիկ տակառի մը կը նմանի: 10—12 օրուան մէջ ճանճը կ'ելլէ, եւ անմիջապէս ձու կ'ածէ, այնպէս որ ամառը զոյգ մը ճանճէ 500 միլիոն կրնայ բազմանալ:

Նոյնպիսի կերպով կ'ապրի նաեւ փայլուն զմրուխտի կանանչ գունով՝ Ուլիսեանը (Musca Caesar): Իսկ ընդհակառակն Բաւն ճաճանը (Sarcophaga carnaria) սպիտակ մխրագոյն գունով կ'ըլլայ. կրունակին վրայ որոշ սեւ գծեր, եւ մարմնոյն յետասկողման վրայ սեւ քառակուսի բծեր ունի. թրթուրները փորին մէջ կը կազմուին եւ քակորի վրայ՝ ձուի պէս կ'ածէ զանոնք այս ճանճը: — Ասոնց նման բազմաթիւ Հասարակ ճանճեր (Muscidae) կան, որոնք իբր թրթուր զանազան փոտած կենդանական եւ տնկական նիւթերով կ'ապրին, եւ ախոռներու, աղբանոցներու մէջ կաղամբի եւ աղցանի փոտած տերեւներու, սոխերու, ստեպղիններու, գնդակաւոր բուսոց, հասունցած պտուղներու վրայ, ինչպէս նաեւ պանրի մէջ ալ կը գտնուին:




Պտկ. 403. Ծանծեր.

— Մսաճանճ. ք. բու. ք. թրթուր.
դ. կծկած:

260. Զիաճանճը (Oestrus hoemorrhoidalis) մեղուի մը չափ մեծ է: Մարմինը նեղ է եւ երթալով սրածայր կը վերջանայ, ժանկագոյն դեղին մազերով ծածկուած է, փորը մոմի դեղնութիւն ունի. վրայի կողմը 2—3 հատ սեւ կապուտակագոյն, սրտաձեւ բծեր ունի:

Իւր ձուերը կ'ածէ ձիուն առջեւի կողմերն, այսինքն ծունկին, սրունքին, վզին եւ բաշին վրայ, դուրս ելած թրթուրները՝ ձիուն այս կողմերը խածնելով զձին կը դրդուեն, եւ ձին այն տեղերը լեզուովը կը լզէ, ասով ձիուն բերանը կ'երթան, անկէ ալ կոկորդն եւ ստամոքսը:



Պտկ. 404. Զիաճանճ (Ք. մ.):



ձիու ձաքին վրայ կ'ած անիծ (մեծց.),
կծկած (մեծց.):

Ստամոքսին ներքսկողմը կը կպչին եւ հազիւ թող կու տան՝ կատարեալ աճելէն ետքը, որ շատ անգամ 10 ամիս կը տեւէ, անմարս կերակուրներու հետ դուրս կ'ելեն, գետնի տակ կամ աղբի մէջ կը կծկին եւ յետոյ ճանճ կ'ըլլան: Հատ անգամ ձիու մը ստամոքսին մէջ հարկաւոր այսպիսի թրթուրներ կը գտնուին՝ առանց ձիուն վնասելու:

261. Եղնաճանճը (Hypoderma bovis) բոուի մը չափ մեծ կ'ըլլայ: Մարմնոյն առջեւի մասը փայլուն սեւ է եւ դէպ ի երկայնութեան 3 հատ ակօս ունի, իսկ մարմնոյն մնացած տեղերը ժանկագոյն դեղին են, թեւերը՝ գորշ եւ մրոտ:


Այս ճանճն ամառուան տաք ատենն երեւան կ'ելլէ եւ յատուկ խողովակով մը իւր ձուերն եղերու մագերու վրայ՝ շատ անգամ ողնայարին երկայնութեամբը կ'ածէ:

Թրթուրը կամաց կամաց խորունկ կը մտնէ եւ մորթին վրայ թարախալից սւռէցքներ կը բանայ եւ ասոնց խորունկ տեղերը կը մնայ, մինչեւ որ կատարեալ աճի. ետքէն դուրս կ'ելլէ, գետին կ'իյնայ եւ հոգին մէջ կը կծկի: Եղերէն շատ տերը կռնակին վրայ 30 հատի չափ այսպիսի սւռէցքներ կ'առնեն, սուտի եւ մորթը շատ յարգ չ'առնենար, վասն զի այս տեղերը մորթն աւելի բարակ կ'ըլլայ:



Ասոր նման ճանճեր ալ եղջերուի, այծեմնիկի եւ վարդեղնի մորթին տակը կ'ապրին: Իսկ ընդ հակառակն Ուշաբժանը (*Oestrus ovis*) թրթուր եղած ատեն, ոչխարին քթին եւ ճակտի խոռոչին մէջ կ'ապրի եւ ոչխարաց յատուկ մէկ հիւանդութեանը պատճառ կ'ըլլայ. այս հիւանդութեան նշանն է ոչխարին յանկարծ եւ ստէպ ցատկերն, որուն մէջեցիք կ'ըսեն “չէրէ” (Ք): — Եղերը՝ եղնաճանճէն կը վախնան եւ անոնց բզզալէն կը ճանչնան. այս է պատճառն որ շատ անգամ եղերը կատղածի պէս իրենց պոռը վեր տնկած դէպ ի ջուր կամ ախոռ կը վազեն. ընդհակառակն ոչխարներն՝ երբ իրենց թշնամւոյն մօտենալը զգան, իրենց գլուխը ներս կը քաշեն եւ ըստ կարի իրենց դուռնը գետին կը խոնարհեցընեն, որպէս զի այս ճանճն իրենց քիթը չ'մտնէ: Այս տեսակ ճանճերը կատարեալ մեծնալէն ետքն ալ՝ զօրաւոր բերնի մասունքը չ'ունին, եւ ասոնցմով չեն կրնար ոչ զմարդիկ եւ ոչ ալ կենդանիները վերաւորել:


262. Գոթէիը (կամ Մշեցւոց Բոթէիը) (*Tabanus bovinus*) սեւ գորշ գունով է. տափակ օղակներուն վրայ՝ բաց դեղին գունով եւրեքանկիւնի բծերու կարգ մը կայ: Աչուրները շատ մեծ են եւ կենդանութեան ատեն կանանչ կը փայլին: Արնաճիթը գլխուն հետ գրեթէ ուղղաձիգ դիրք մ'ունի, որուն ծայրը 4—6 հատ սրածայր եւ ամուր խողաններ կան:



Պտկ. 406. Գոթէիը (Բ. մ.):

Անտառներու մէջ շատ յաճախ կը դուռնուի, եւ ամառուան տաք ատենները թէ արջառներն եւ թէ ձիերն արտաքայ կարգի կը տանջէ: Էգն ընտանի անասնոց արիւնն կը ծծէ իւր կնճիթովը սաստիկ խայթելով եւ ասով կը սնանի: Վէրքը շատ անգամ այնպէս մեծ կ'ըլլայ, որ խայթելէն ետքն ալ դեռ արիւն կը վազէ: Թրթուրները մարդագետիններու վրայ՝ հողին տակը կ'ապրին, եւ Յունիսին կը կծկին: — Ուրիշ գործերն մերկածին օդի ատենն նեղացուցիչ եւ գրեթէ անտանելի կ'ըլ-

լան, եւ արեան շատ ծարաւած ատեն նաեւ մարդու վրայ ալ կը յարձակին: — Ընդհանրապէս առաջին նայուածքով ճանճերն որչափ անշշան կենդանիներ կ'երեւան, բայց եթէ ի մերձուստ քննուին, թէ՛ անշշան եւ թէ՛ ապրելու եղանակաւ իրարմէ շատ կը տարբերին: Օրինակի աղաքաւ կան բազմաթիւ Յ-էլէպիէ ճանճեր (Asilidae), որոնք ուրիշ ճանճերու եւ միջատներու վրայ կը յարձակին եւ ասոնց արիւնը կը ծծեն: Ոմանք, ինչպէս Թաչի-նա (Tachinae) ըստուծները, թրթուր եղած ատեն՝ ուրիշ միջատներու թրթուրներու վրայ՝ գլխաւորաբար որդերու վրայ, կ'ապրին եւ ասով արտաքոյ կարգի օգտակար են: Ընդհանրապէս ոմանք, ինչպէս Ծ-ի-լ ճանճերը (Tripedae) թրթուր եղած ատեն եկեղանի եւ ասոր նման անկող ծաղկի կոկոններու վրայ կ'ապրին: Կան դեռ ուրիշ շատ մը տեսակներ, որոնք իշամեղուի կը նմանին, ծաղիկներու բոլորտիքը կը թռչին եւ մեղը կը ծծեն. ասոնց մէկ տեսակն է Անթոմո-լը (Bombylida), որ ցերեկ ատեն ծաղիկ ծաղիկ կը թռչի եւ գրեթէ անշարժ կը կենայ ծաղկին քովը, առանց նստելու, ասկէ առած է անթոմո-լ անունն ալ:




Պտկ. 407. Անթոմոլ (Բ. մ.):

ՑԵՂ Բ. ՄԺՂՈՒԿՆԵՐ ԿԱՄ ՆԵՄՈՑԵՐԱՎԿՈՒԿՆԵՐ (Culicida կամ Nemocera)

263. ՄԺԵՂ կամ ՄԺՂՈՒԿ (Culex pipiens) մանր, կլոր գլուխ մը եւ նեղ ու երկայն փոր ունի: Արուին թեւի պէս բողբոլակները փետրածեւ մազեր ունին: Բարակ կնճիթը մարմնոյն կէսին չափ երկայն է եւ չորս հատ խայթելու խողաններ ունի: Թեւերը՝ նեղ, սրունքները՝ բարակ եւ երկայն են:

ՄԺՂՈՒԿ՝ իբրեւ արիւնխաւանձ միջատ ամէն տեղ ծանօթ է, բայց ըստ ինքեան միայն էգերն արիւն կը ծծեն, իսկ արուները անկող հիւթերով կ'ապրին: Այս մԺՂՈՒԿ՝ նախ եւ յառաջ միայն ջրերու մէջ կ'ապրի: Իւր ձուերն՝ որ 300 հատի չափ մէկտեղ կոյտ կ'ըլլան, ջրերու մէջ կ'ածէ:

Չուէն ելլող թրթուրներն՝ ամուր կզակներով կլոր գլուխ մ'ունին, իսկ իրենց փորին վերջին ծայրը՝ շունչ առնելու երկու հատ դուռն երկրորդ մասեր ունին (որոնք ընդհանրապէս կ'ըսուին): Թրթուրները գլխիկայր կը լողան եւ զանազան պզտիկ կենդանիներու ետեւէն կ'իյնան: Ածկածն ալ ջրոյ մէջ կը կենայ, մինչեւ որ իբրեւ թեւաւոր միջատ դուռն ելլէ. երբեք օդի մէջ ահաբեկ բազմութեամբ կը տեսնուի: Թե՛ կերպարանքով եւ թե՛ ապրելու կերպով հասարակ մԺՂՈՒԿներու շատ կը նմանին Մ-ի-լ-ը ըստ Ա-ի-լ (Culex pertinax) տեսակները, ապք երկիրներ՝ եւ ըստ մասին հիւսիսային կողմեր կ'ապրին, սաստիկ խայթող մԺՂՈՒԿի տեսակներ են, զարհուրելի անցանք կը պատճառեն եւ տեղիս տեղիս քաղաքներն ու գիւղերը մարդաթափ կ'ընեն (ծանօթ են Եգիպտացոց մուսները): Օրուան մէջ որոշեալ ատեն դուռն կ'ըլլեն եւ գլխաւորաբար իրիկունն ու գիշերը՝ մեծամեծ գետերու եւ ճահճներու քովերը՝ անհամար բազմութեամբ մարդկան եւ անասնոց վրայ կը յարձակին: Ասոնց խայթումքն ուռեղքներ եւ հիւսադագին



Պտկ. 408. Մժղուկը եւ իւր փոփոխութիւնները:

Աջ՝ արուն, Չախ՝ էգը: Զրոյ երեւին վրայ էգ մը ձու կ'ածէ. եւ կծկածէն ուրիշ մը կ'ելէ, իսկ ջրոյ մէջ՝ մծղուկի այլեւայլ կծկածներ կը տեսնուին:

Երեւոյթներ կը պատճառէ. մորթն՝ ասոնց խայթուածքէն ձաղկուածի կերպարանք կ'առնու, ոչ շղատառեռէ շինուած ցանցը (մծեղվանը), ոչ ծխելներ եւ ոչ ալ համեմատոր նիւթերով շփելներ՝ ասոնց արիւնարբու միւլգնութենէն կը պաշտպանեն զմարդ:

264. (Գոլլա-մֆալէան) Մոծակը (*Simulia maculata*) արտաքին կերպարանքին նայելով մանր խցի ճանճի կը նմանի: Հազիւ 0.002 հզմ. երկայն կ'ըլլայ եւ կապուտակ մոխրագոյն է:

Այս մանր մոծակը Գանուբի վարի կողմերը՝ Բանատի սահմանները, եւ ասոնց դիմացը Սերբիայի մէջ երբեմն թանձրախիտ խումբերով երեւան

կ'ենյէ: Եւ յո տակն բնական զգոմար հասեր՝ իրենց պատճառն թող կ'տան եւ գիւղերն ու ավանները կ'գիմեն: Ճանաչող՝ բնակի մասնաց կ'կուզ եւ լեւրի անդրը կ'գնտաեն, եւ աչաց անկիւնները, բերանն եւ քթաբերը կ'նստին, եւ մինչեւ ա' կանջները, կ'սկսեն ու շնչե'րակները կ'երթան: Ետնց խայթուածքը՝ խիստ այրող մարմնով մը եւ խիստ ցու'ղուն, կ'արծր ուռեցք մը կը պատճառէ, որ հազիւ 8 մի'ն չեւ 10) օրուան մէջ կ'անցնի: Եթէ վէջերը բազմութիւնն, մահ յառաջ կու գայ եւ անի ասորի բազմութիւնն, եղ ու խոզ կը ստակին, օր'նակներ ալ կան որ նաեւ բացը թողուած աղաք այս մեղակէն սղաննուած են: Նորագոյն ժամանակներ՝ Գերմանացի բնագետներ մը խնայաւ, որ այս ճանճը՝ թրթուր եւ կծկած եղած ասէն լեւնային յոտակ առաւակներու մէջ քարերու եւ ջրային անկոց վրայ կ'գտնուէին: Ուստի եւ այսօր քարերն ու անկերը ջրայ մէջէն հեռացնելով կ'արելն եղած է այս ճանճերն ըստ բաւականի ջնջել:



Գուկ. 409. (Գորմարան) մոծակ (մոծց.):

Ել' թրթուրը եւ ձգի՝ կ'իւնենա'ւ աղիքը՝ ջրայն անկէ մը վրայ: Բոլորէ՛ք քաղէ մը քայ հաստ:

Մեղակի ուրիշ տեսակներ՝ զանազան անկերու վրայ մանր ուռեցքներ կամ ելունդներ յառաջ կը բերեն. ասիկէ առեալ՝ Գիտորէից մեղակ կ'ըսուին: Նաեւ փառած սունկերուն վրայ շատ մը մեղակի թրթուրներ կ'ապրին, որոնցմէ Սանիլէ մեղակ ըսուածները կ'ըլլեն: Բազմութիւն մեծ մեղակներու տեսակներ ալ կան, որոնք չեն խայթեր, ինչպէս Մարիլէ մեղակ, որ երկայն ոտուքներ ունի:

ՅԵՐ 4. ԱՋԼԵՄՆԵՐ (Coriacea)


Չիոս ուլյանան (Hippobosca equina). իւր մարմնոյն կազմուածքովը կը տարբերի հասարակ ճանճերէ: Ողորկ եւ գորշ մոխրագոյն մարմին մ'ունի. վզի վահանակը՝ փայլուն սեւ է, եւ սպիտակ կէտերով. մանր աչուրներն ու բողկուկները չեն երեւար:

Չիուն ստորին կողմերն եւ ապիին տակը կը գտնուի. զարմանալի յատկութիւն մ'ունի, այսինքն կենդանի թրթուրներ կը բերէ, որոնք անմիջապէս կը կծկին: Մարդիկ կը զգուշանան այս ոչլաճանճէն, վասն զի շատ ստեպ ականջի մէջ կը մտնէ եւ դժուարաւ կ'ելլէ:

ՅԵՐ 7. ԼՈՒԻՐ (Pulicida կամ Aphaniptera)

265. Հասարակ լուսն (Pulex irritans) մանր՝ հազիւ 0.002 հմմ. երկայնութեամբ, անթեւ, փայլուն գորշ գունով միջատ մըն է: Ցափակ ճնշու'ած մարմնոյն երկու կողմը շատ կարճ բողկուկներ ունի, պզտիկ սեւ

աչուրներ, արիւն ծծելու բարակ կնճիթ մը եւ մարմնոյն առջեւի կողմը՝ անհաւասար երկայն՝ ցատկելու սրունքներ, որոնցմով իւր մարմնոյն երկայնութենէն քանի մը հարիւր անգամ աւելի տեղ կը ցատկէ:



Պտկ. 410. Հասարակ լու:

— վերի շրթուներ. բ. բ. կզակը՝ որով կը խայթէ. գ. վարի շրթանց շոշափեկներ. դ. վարի շրթուներ. ե. կարճ եւ անտեսանելի կզակի-շոշափեկներ. շ. թրթուրը. ի. կծկածը (ամէն ալ շատ մեծց.):

ստէպ գետինն աւելն ու լուարն՝ այս տաղտկացուցիչ միջատը ջնջելու ամէնէն ազդու միջոցներն են: — Բնական պատմութեան մեջ լուն հոս տեղս կը գառուի, թէպէտ եւ ամենեւին թեւ չունի, այլ կուրծքին՝ 2 եւ 3 օղակին վրայ տափաձեւ թեւոց յաւելուածներ կան. իւր կերպարանափոխութեան կողմանէ մշուկներուն հետ կը նոյնանայ:

Լուն՝ իւր կատարեալ վիճակին մէջ մարդիկներն ու անասուններն անհագիստ կ'ընէ եւ անոնց արիւնը կը ծծէ: Իւր սաստիկ մանր ձուերը՝ խուցին յատակին վրայ, աւելածոյ շիւղերուն մէջ եւն, եւն, այսպիսի տեղեր կ'ածէ: Թրթուրը՝ բարակ, ճերմակ, առանց ոտքի որդի մը կը նմանի եւ օձի մը պէս կը գալարի:

Ամէն տեսակ կենդանեաց վրայէն ինկած բաներով կը սնանի, զորոնք փոշւոյ եւ շիւղերու աղտոգութեանց մէջ կը գտնէ: Տասնութէկ օր ետքը տեսակ մը բոժոժի մէջ կը կծկի, եւ դարձեալ 10 օր ետքը կատարեալ միջատ կ'ըլլայ: Ամբողջ փոփոխութիւնը 4 շաբաթ կը տեւէ: Մարտութիւն եւ ստէպ

ԿԱՐԳ 7. ԿԻՍԱԹԵՒԵՐ ԿԱՄ ՄԼՈՒԿՆԵՐ (Hemiptera)


Կիսաթեւերը կամ Մլուկները՝ անկատար փոփոխութիւն ունին, ասոնց բերանը ծծելու յարմար խողովակ մըն է, որուն մէջ՝ եզրները խողանաւոր 3—4 հատ աքցանաձեւ մասունք կան, որոցմով կենդանական կամ բուսական հիւթ կը ծծեն: Սովորաբար 4 թեւ ունին, ոմանք միայն երկու հատ, կամ ամենեւին չունին: Գարշ հոտ մը կը բուրեն: Մինչեւ հիմայ 12.000 ճանչցուած է, թէպէտ օտարերկրեայ մլուկներէն միայն մեծերը քննուած են: 6 գլխաւոր ցեղերու կը բաժնուին:

ՑԵՂ Ա. ՆԻԿՐՈՄԼՈՒԿՆԵՐ (Geocorida)


266. Հասարակ իւր-իւր կամ Փայտաշէլ (Acanthia lectularia) գորշ կարմիր գունով, տափակ ու բարակ մարմին մ'ունի: Գլուխը շատ մանր է, կարճ եւ բարակ բողկուկներ, եւ բարակ ու նուրբ դէպ ի կուրծքը ծալուած կնճիթ մ'ունի, զոր միայն խայթելու ատեն վեր կը

ՑԵՂ Թ. ՓԵՏՐՈՒՈՐՆԵՐ (Pteriphorida)

257. Սպէրալ հինգլէ-էանը (Pterophorus pentadactylus) ձեան սպիտակութեամբ մանր, շատ գեղեցիկ թիթեռ մըն է, առջևի թեւերն երկուքի, իսկ ետեւինքն՝ երեք փետրի նման մասանց բաժնուած են:



Պտկ. 400. Սպիտակ հինգթեւեանը
(Ք. մ.):



Պտկ. 401. Վեցթեւեանը
(Գծերը՝ Ք. մ.):

Թրթուրը՝ բաղեղն եւ ուրիշ նման խոտերու վրայ կ'ապրի: — Ուրիշ գեղեցիկ տեսակ մանրաթիթեռները հետեւեալներն են. Վարդաբար (Pterophorus rhododactylus) եւ Վեցլէ-էանը (Alucita hexadactyla), որուն թէ առջևի եւ թէ ետեւի թեւերը 6—6ական փետրակերպ մասանց բաժնուած են:


ԿԱՐԳ 6. ԵՐԿԹԵՒԵԱՆՆԵՐ (Diptera)

Երկլէ-էանները՝ կատարեալ փոփոխութիւն կը կրեն, ասոնց բերանը կենդանական նիւթեր ծծելու յարմար է, երկու հաս՝ քիչ երակներով թաղանթէ թափանցիկ թեւեր ունին, որոնց տակը 2 հատ ալ թեփերով ծածկուած ճեմաշող լէ-էր ունին: Ասոնց բոլորակ գլուխը՝ միայն բարակ դերձանով մը մարմնոյն հետ միացած է: Ասոնց աչքերը շատ մեծ են, կարմիր գորշ եւ երբեմն նաեւ ոսկեգոյն-կանանչ գունով: Դեռ որոշուած չէ երկթեւեաններու տեսակներու թիւը. 10.000 տեսակ ճանչցուած է ցարդ: Կը բաժնուին 4 գլխաւոր ցեղերու:

ՑԵՂ Ա. ԲԱՆ ՃԱՆՃԵՐ ԿԵՐ ԿԱՐՃԱՐՈՂԿՈՒԿՆԵՐ (Muscida կամ Brachycera)

258. Բոռն ճանճը (Musca domestica) ընդհանրապէս միտրագոյն է: Կոնակի վահանին վրայ 4 սեւ շերտեր կը տեսնուին, մարմնոյն վարի մասը սեւախառն է, իսկ փորը տեղեւոյն գեղին: Գլուխն ու կուրծքը խորունկ իրարմէ բաժնուած են: Աչուրները շատ մեծ եւ արիւնագոյն նիւթով մը լեցուած են: Բողկուկները խողանաձեւ են, երեք յօդուածէ կը բաղկանան եւ արտաքոյ կարգի կարճ են: Կնճիթը ծծելու յարմար

է, ծայրը սկաւառակաձեւ է եւ կրնայ դուրս երկննալ: Կուրծքի կտորին վրայ 2 հատ թաղանթեայ, թափանցիկ թեւեր կան, որոնց վրայ 8—10 երակներ կը նշմարուին, իսկ ետեւի թեւերուն փոխարէն ունի՝ երկու հատ թեփուկ, որոնք ուրիշ երկու կոթնաւոր բուներ կը ծածկեն եւ ասոնք շուտ շուտ կը ճօճան: Ոտից վերջին զոյգին ձիւրաններուն տակը երկու հատ մանր կպլուն գնդակներ ունի, որոնք հարթ եւ ողորկ երեսի վրայ մագլելու կը ծառայեն:



Պտկ. 402. Բուն ծանծ:


Բուն կամ խցի ճանճը՝ շատ տարածուած անհանգիստ միջատներէն մէկն է: Ամէն տեղ տներու մէջ եւ անոնց քովերը մարդկան եւ աշխատող շատ տաղտկութիւն կը պատճառէ, վասն զի ստէպ ստէպ անոնց վրայ կու գայ կը նստի (ասկէ առնուած է՝ «ճանճի պէս կը կպչի», ասութիւնը), եւ ամէն առակայ կ'աղտոտէ, բայց արիւն չի քամեր:

Ամէն տեսակ հեղանիւթով կը սնանի, եւ շաքար ու ասոր նման լուծանելի նիւթեր ալ կը ծծէ: Իւր ձուերը՝ ազրի, աւլուած չիւղերու եւ աղտոտ թրամաններու եւայլն, մէջ կ'ածէ: Մանր ճերմակ թրթուրն անգլուխ եւ անոտն որդի կը նմանի. արտաքոյ կարգի շատակեր է եւ շատ արագ կ'ածի: Տասնուչորս օրուան մէջ կատարեալ կ'ածի եւ կը կծկի, կծկածը մանր խարտեաշ տակառակի մը կը նմանի: Հետեւեալ 14 օրուան մէջ ճանճը կը կազմուի եւ տակառակին վերի մասը ծածկոցի մը պէս կը բանայ եւ դուրս կ'ելլէ: Դէպ ի աշուն ճանճերը շատ կը բազմանան, մահաւանդ անոռներու եւ խոհանոցներու քովերը: Չմեռն ամէն ալ կը սատկին, ի բաց առեալ քանի մը հատը, որ պատապարուած տեղեր կը պահուրտին: Այլեւայլ դեղեր գործածելով ասոնց շատ արագ աճումը կ'արգելուի: Կորագոյն ժամանակներս իրեւն հիւանդութեան փոխադրիչ ճանչուեցան ճանճերը. բայց օգուտ ալ ունին, ըստ որում օդի մէջ շատ տեսակ բակեղներ եւ մանրիկներ կը ծծեն կը սատկեցնեն:

259. Կապոյոյ Խորը (*Musca vomitoria*) փայլուն մութ կապոյո գունով մարմին ունի, որուն վրայ սեւագոյն շեղ գծեր կան: Գլուխը սեւ է, թեւերը կարծես ջրախառն թանաքով սեւցած են, բայց թափանցիկ են:

Այս մեծ ճանճը շատ անգամ սաստիկ բզզալով պատուհաններէն ներս կը մտնէ եւ ստէպ ստէպ պատուհանի ապակիներու եւ ուրիշ առակայից կը զարնուի: Էգն իւր ձուերը մանր դէզերով մնի կամ դիակի վրայ՝ եւ երբեմն նաեւ մարդու թարախալից վիւրաց մէջ կ'ածէ: Շատ քիչ ատենէն դուրս կ'ելլեն թրթուրները, արտաքոյ կարգի շատակեր են եւ այնպէս շուտ կ'ածին, որ 24 ժամ ետքը՝ սկզբնաբար եղածէն 200 անգամ աւելի ծանր կ'ըլլան, եւ 4—5 օրուան մէջ կատարեալ կ'ածին եւ 0.01 կ'է. երկայն կ'ըլլան: Թրթուրները կծկելու համար հողին տակ կ'երթան: Կծկածը՝ կարմիր գորշ գունով, բարակ ծալքերով պղտիկ տակառի մը կը նմանի: 10—12 օրուան մէջ ճանճը կ'ելլէ, եւ անմիջապէս ձու կ'ածէ, այնպէս որ ամառը զոյգ մը ճանճէ 500 միլիոն կրնայ բազմանալ:

Նոյնպիսի կերպով կ'ապրի նաեւ փայլուն զմրուխտի կանանչ գունով՝ Ուկեմաներ (Musca Caesar): Իսկ ընդհանրապես բոլոր հաճախներ (Sarcophaga carnaria) սպիտակ մոխրագույն գունով կ'ըլլայ. կըռնակին վրայ որոշ սեւ գծեր, եւ մարմնոյն յետասկողման վրայ սեւ քառակուսի բծեր ունի. թրթուրները փոքրին մէջ կը կազմուին եւ քակորի վրայ՝ ձուկ պէս կ'ածէ զանոնք այս ճանճը: — Ասոնց նման բազմաթիւ Հասարակ ճանճեր (Muscidae) կան, որոնք իբր թրթուր զանազան փտտած կենդանական եւ տնական նիւթերով կ'ապրին, եւ ախոռներու, աղբանոցներու մէջ կաղամբի եւ աղցանի փտտած տերեւներու, սոխերու, ստեպղիններու, զնդակաւոր բուսոց, հասունցած պտուղներու վրայ, ինչպէս նաեւ պանրի մէջ ալ կը գտնուին:




260. Զիւճանճը (Oestrus hoemorrhoidalis) մեղուի մը չափ մեծ է: Մարմինը նեղ է եւ երթալով սրածայր կը վերջանայ, ժանկագույն դեղին մազերով ծածկուած է, փորը մոմի դեղնութիւն ունի. վրայի կողմը 2—3 հատ սեւ կապուտակագույն, սրտաձեւ բծեր ունի:

Պտկ. 403. Ծանօնք.

— Մոսճանճ. Բ. բուռ. Է. Թրթուր. Դ. կծկած:

Իւր ձուերը կ'ածէ ձիուն առջեւի կողմերն, այսինքն ծունկին, սրունքին, վզին եւ բաշին վրայ, դուրս ելած թրթուրները՝ ձիուն այս կողմերը խածնելով գծին կը գրգռեն, եւ ձին այն տեղերը լեզուովը կը լզէ, ասով ձիուն բերանը կ'երթան, անկէ ալ կոկորդն եւ ստամոքսը:



Պտկ. 404. Զիւճանճ (Բ. մ.):



Ստամոքսին ներքսկողմը կը կպին եւ հաղել թող կու տան՝ կատարեալ աճելէն ետքը, որ՝ շատ անգամ 10 ամիս կը տեւէ, անմարս կերակուրներու հետ դուրս կ'ելլեն, գետնի տակ կամ աղբի մէջ կը կծկին եւ յետոյ ճանճ կ'ըլլան: Շատ անգամ ձիու մը ստամոքսին մէջ հարիւրաւոր այսպիսի թրթուրներ կը գտնուին՝ առանց ձիուն վնասելու:

ձիու ձարին վրայ կպած անիծ (մեծց.), կծկած (մեծց.):

261. Եղնաճանճը (Hypoderma bovis) բուռի մը չափ մեծ կ'ըլլայ: Մարմնոյն առջեւի մասը փայլուն սեւ է եւ դէպ ի երկայնութեան 3 հատ ափս ունի, իսկ մարմնոյն մնացած տեղերը ժանկագույն դեղին են, թեւերը՝ գորշ եւ մրոտ:


Այս ճանճն ամառուան տաք ատենն երեւան կ'ելլէ եւ յատուկ խողովակով մը իւր ձուերն եղբրու մազերու վրայ՝ շատ անգամ ողնայարին երկայնութեամբը կ'ածէ:

Թրթուրը կամաց կամաց խորունկ կը մտնէ եւ մորթին վրայ թարախալից ուռեցքներ կը բանայ եւ ասոնց խորունկ տեղերը կը մնայ, մինչեւ որ կատարեալ աճի. ետքէն դուրս կ'ելլէ, գետին կ'իյնայ եւ հոգին մէջ կը կծկի: Եղբրէն շատերը կռնակին վրայ 30 հատի չափ պսպիսի ուռեցքներ կ'ունենան, ուստի եւ մորթը շատ յարգ չ'ունենար, վասն զի այս տեղերը մորթն աւելի բարակ կ'ըլլայ:



Ասոր նման ճանճեր ալ եղջերուի, այծեմեծիկի եւ վարդեղնի մորթին տակը կ'ապրին: Իսկ ընդ հակառակն Ուլտրոստրուս (Oestrus ovis) թրթուր եղած ատեն, ոչխարին քթին եւ ճակտի խոռոչին մէջ կ'ապրի եւ ոչխարաց յատուկ մէկ հիւանդութեանը պատճառ կ'ըլլայ. այս հիւանդութեան նշանն է ոչխարին յանկարծ եւ ստէպ ցատկելն, որուն մշտեցիկ կ'ըսեն «լըբ+» (?): — Եղբրը՝ եղնաճանճէն կը վախճան եւ անոնց բզզալէն կը ճանչնան. այս է պատճառն որ շատ անգամ եղբրը կատղածի պէս իրենց պոչը վեր տնկած գէպի ջուր կամ ախոռ կը վազեն. ընդհակառակն ոչխարներն՝ երբ իրենց թշնամւոյն մօտենալը զգան, իրենց գլուխը ներս կը քաշեն եւ ըստ կարի իրենց դուռը գետին կը խոնարհեցնեն, որպէս զի այս ճանճն իրենց քիթը չ'մտնէ: Այս տեսակ ճանճերը կատարեալ մեծնալէն ետքն ալ՝ զօրաւոր բերնի մասունք չ'ունին, եւ ասոնցմով չեն կրնար ոչ զմարդիկ եւ ոչ ալ կենդանիները վիրաւորել:

262. Գորեխը (կամ Մշեցեոց Բորեխը) (Tabanus bovinus) սեւ գորշ գունով է. տափակ օղակներուն վրայ՝ բաց դեղին գունով երեքանկիւնի բծերու կարգ մը կայ: Աչուրները շատ մեծ են եւ կենդանութեան ատեն կանանչ կը փայլին: Կրնձիթը գլխուն հետ գրեթէ ուղղաձիգ դիրք մ'ունի, որուն ծայրը 4—6 հատ սրածայր եւ ամուր խողաններ կան:




Անտառներու մէջ շատ յաճախ կը գրտնուի, եւ ամառուան տաք ատենները թէ՛ արջառներն եւ թէ՛ ձիերն արտաքոյ կարգի

Պտկ. 406. Գորեխ (Բ. մ.):

կը տանջէ: Իզն ընտանի անասնոց արիւնն կը ծծէ իւր կնճիթովը սաստիկ խայթելով եւ ասով կը սնանի: Վէրջը շատ անգամ այնպէս մեծ կ'ըլլայ, որ խայթելէն ետքն ալ դեռ արիւն կը վազէ: Թրթուրները մարգագետիններու վրայ՝ հողին տակը կ'ապրին, եւ Յունիսին կը կծկին: — Ուրիշ գորեխներ՝ մրկածին օդի ատեն նեղացուցիչ եւ գրեթէ անտանելի կ'ըլ-

լան, եւ արեան շատ ծարաւած ատեն նաեւ մարդու վրայ ալ կը յարձակին: — Ընդհանրապէս առաջին նայուածքով ճանճերն որչափ անշնան կենդանիներ կ'երեւան, բայց եթէ ի մերձուստ քննուին, թէ՛ ձեւով եւ թէ՛ ապրելու եղանակաւ ~~կարծառ~~ շատ կը տարբերին: Օրինակի աղաքաւ կան բազմաթիւ Յփշարանի ~~համեմատ~~ (Asilidae), որոնք ուրիշ ճանճերու եւ միջատներու վրայ կը յարձակին եւ ասոնց արիւնը կը ծծեն: Ոմանք, ինչպէս Թաչի-նաէ (Tachinae) ըսուածները, թրթուր եղած ատեն՝ ուրիշ միջատներու թրթուրներու վրայ՝ գլխաւորաբար որդերու վրայ, կ'ապրին եւ ասով արտաքոյ կարգի օգտակար են: Ընդհակառակն ոմանք, ինչպէս Ծռիւղ հաները (Tripedae) թրթուր եղած ատեն եկքանի եւ ասոր նման տնկոյ ծաղկի կոկոններու վրայ կ'ապրին: Կան դեռ ուրիշ շատ մը տեսակներ, որոնք իշամեղուի կը նմանին, ծաղկիներու բոլորաթիւր կը թռչին եւ մեղր կը ծծեն. ասոնց մէկ տեսակն է Ընթառն-ը (Bombylida), որ ցերեկ ատեն ծաղկէ ծաղկի կը թռչի եւ գրեթէ անշարժ կը կենայ ծաղկին քովը, առանց նստելու, ասկէ առած է անթառն-ի անունն ալ:




Պտկ. 407. Անթառնուկ (Բ. մ.):

ՑԵՂ Բ. ԹՐԹՈՒՐՆԵՐ ԿՈՒ ԵՐԿԱՆՈՐԱՎԱՆԻՔՆԵՐ (Culicida կամ Nemocera)

263. Մժեղ կամ Մժղու-ը (Culex pipiens) մանր, կլոր գլուխ մը եւ նեղ ու երկայն փոր ունի: Արուին թեղի պէս բողբոլները փետրածեւ մազեր ունին: Բարակ կնճիթը մարմնոյն կեսին չափ երկայն է եւ չորս հատ խայթելու խողաններ ունի: Թեւերը՝ նեղ, սրունքները՝ բարակ եւ երկայն են:

Մժղուկն՝ իբրեւ արիւնխախնձ միջատ ամէն տեղ ծանօթ է, բայց ըստ ինքեան միայն էգերն արիւն կը ծծեն, իսկ արուները տնկոյ հիւթերովը կ'ապրին: Այս մժղուկն նախ եւ յառաջ մնայուն ջրերու մէջ կ'ապրի: Իւր ձուերն՝ որ 300 հասի չափ մէկտեղ կոյտ կ'ըլլան, ջրերու մէջ կ'ածէ:

Չուէն ելող թրթուրներն՝ ամուր կղանքերով կլոր գլուխ մ'ունին, իսկ իրենց փորին վերջին ծայրը՝ շունչ առնելու երկու հատ դուրս երկնցած մասեր ունին (որոնք Նիւհա կ'ըսուին): Թրթուրները գլխովայր կը լողան եւ զանազան ազտիկ կենդանիներու ետեւէն կ'իյնան: Ածկածն ալ ջրոյ մէջ կը կենայ, մինչեւ որ իբրեւ թեւաւոր միջատ դուրս ելլէ. երբեմն օդի մէջ ահագին բազմութեամբ կը տեսնուի: Թէ՛ կերպարանքով եւ թէ՛ ապրելու կերպով հասարակ մժղուկներու շատ կը նմանին Մոռի-ը ըսուած Մռնի (Culex pertinax) տեսակները, ապք երկիրներ՝ եւ ըստ մասին հիւսիսային կողմերը կ'ապրին, սաստիկ խայթող մժղուկի տեսակներ են, զարհուրելի տանջանք կը պատճառեն եւ տեղիս տեղիս քաղաքներն ու գիւղերը մարդաթափ կ'ընեն (ծանօթ են Եգիպտոսացի մուսները): Օրուան մէջ արոյնալ ատեն դուրս կ'ելլեն եւ գլխաւորաբար իրիկունն ու գիշերը՝ մեծամեծ գետերու եւ ճահիճներու քովերը՝ անհամար բազմութեամբ մարդկան եւ անասունց վրայ կը յարձակին: Ասոնց խայթումքն ուռէցքներ եւ հիւանդագին



Պտկ. 408. Մժղուկը եւ իւր փոփոխութիւնները:

Աջ՝ արուն, Չախ՝ էգը: Զրոյ երեքին վրայ էգ մը ձու կ'ածէ. եւ կծկածէն ուրիշ մը կ'եղէ, իսկ ջրոյ մէջ մթղուկի այլեւայլ կծկածներ կը տեսնուին:

երեւոյթներ կը պատճառէ. մորթն՝ առանց խայթուածքէն ձաղկուածի կերպարանք կ'առնու, ոչ չղաշատեալ շինուած ցանցը (մթեղվանք), ոչ ծխելներ եւ ոչ ալ համեմաւոր նիւթերով շփելներ՝ առանց արիւնարբու մուգնութենէն կը պաշտպանեն զմարդ:

264. (Գոլոմ-ճալէան) Մոծաւիլ (*Simulia maculata*) արտաքին կերպարանքին նայելով մանր խցի ճանճի կը նմանի: Հազիւ 0-002 հզմ. երկայն կ'ըլլայ եւ կապուտակ մոխրագոյն է:


Այս մանր մոծակը Դանուբի վարի կողմերը՝ Բանատի սահմանները, եւ առանց գիմացը Սերբիայի մէջ երբեմն թանձրախիտ խումբերով երեւան

կ'ելլէ: Այն ատեն բնական դրդմամբ հօտերն՝ իրենց արօտատեղին թող կուտան եւ գիւղերն ու ակոռները կը դիմեն: Ճանճերը՝ ընտանի անասնոց կակուղ եւ լեբկ տեղերը կը փնտռեն, եւ աչաց անկիւնները, բերանն եւ քթափողերը կը նստին, եւ մինչեւ ականջները, կոկորդն ու շնչերակները կ'երթան: Ասոնց խայթուածքը՝ խիստ այրող մարմնաջուր մը եւ խիստ ցաւացնող, կարծր ուռեցք մը կը պատճառէ, որ հազիւ 8 մինչեւ 10 օրուան մէջ կ'անցնի: Եթէ վերքերը բաղմամբիւ են, մահ յառաջ կու գայ եւ անկէ մը վրայ. վերջինք՝ քարի մը վրայ հաստատուած:

Պտկ. 409. (Գոլումբաշեան) մոծակ (մոծց.):

Աջ՝ թրթուրը եւ ձախ՝ կծկածներն. առաջինը՝ ջրային տնկի մը վրայ. վերջինք՝ քարի մը վրայ հաստատուած:

Եղ ու խող կը սատկին, օրինակներ ալ կան որ նաեւ բացը թողուած տղաք այս մօղուկէն սպաննուած են: — Նորագոյն ժամանակներս՝ Գերմանացի բնապատում մը իմացաւ, որ այս ճանճը՝ թրթուր եւ կծկած եղած ատեն լեռնային յստակ առուակներու մէջ քարերու եւ ջրային տնկոց վրայ կ'ապրի. ուստի եւ այսպիսի քարերն ու տնկերը ջրոյ մէջէն հեռացընելով կարելի եղած է այս ճանճերն ըստ բաւականի ջնջել:



Մօղուկի ուրիշ տեսակներ՝ զանազան տնկերու վրայ մանր ուռեցքներ կամ ելունդներ յառաջ կը բերեն. ասկէ առեալ՝ Գիտաբէտ Ֆօլո-կ'ըսուին: Նաեւ փոտած սունկերուն վրայ շատ մը մօղուկի թրթուրներ կ'ապրին, որոնցմէ Սաւլի Ֆօլո-կ' ըստածները կ'ելլեն: Բաղմամբիւ մեծ մօղուկներու տեսակներ ալ կան, որոնք չեն խայթեր, ինչպէս Մարի Ֆօլո, որ երկայն ոտուրներ ունի:

ՑԵՂ Գ. ԱՂԱՄԱՆՈՒՄ (Coriacea)


2խո- ոքլածանճ (Hippobosca equina). իւր մարմնոյն կազմուածքովը կը տարբերի հասարակ ճանճերէ: Ողորկ եւ գորշ մոխրագոյն մարմին մ'ունի. վզի վահանակը՝ փայլուն սեւ է, եւ սպիտակ կէտերով. մանր աչուրներն ու բողկուկները չեն երեւար:

2խոն ստորին կողմերն եւ ապիին տակը կը գտնուի. զարմանալի յատկութիւն մ'ունի, այսինքն կենդանի թրթուրներ կը բերէ, որոնք անմիջապէս կը կծկին: Մարդիկ կը զգուշանան այս ոչլածանճէն, վասն զի շատ ստեպ ալանջի մէջ կը մտնէ եւ դժուարաւ կ'ելլէ:

ՑԵՂ Դ. ԱՓԻՍԻ (Palcida կամ Aphaniptera)

265. Հասարակ լաւն (Pulex irritans) մանր՝ հազիւ 0.002 հգմ. երկայնութեամբ, անթեւ, փայլուն գորշ գունով միջատ մըն է: Ցափակ ճնշուած մարմնոյն երկու կողմը շատ կարճ բողկուկներ ունի, պզտիկ սեւ

աչուրներ, արիւն ծծելու բարակ կնճիթ մը եւ մարմնոյն առջեւի կողմը՝ անհաւասար երկայն՝ ցատկելու սրունքներ, որոնցմով իւր մարմնոյն երկայնութենէն քանի մը հարիւր անգամ աւելի տեղ կը ցատկէ:



Պտկ. 410. Հասարակ լու:

ա. վերի շրթուրք. բ. բ. կզակը՝ որով կը խայթէ. գ. վարի շրթանց շոշափելիքը. դ. վարի շրթուրք. ե. կարճ եւ անտեսանելի կզակի-շոշափելիքը. զ. թրթուրք. ի. կծկածը (ամէն ալ շատ մեծց.):

ստէպ գետինն աւելին ու լուաին՝ այս տաղտկացուցիչ միջատը ցնջելու ամէնէն տղադու միջոցներն են: — Բնական պատմութեան մեջ լուսն հոս տեղս կը դասուի թէպէտ եւ ամենեւին թեւ չունի, այլ կուրծքին՝ 2 եւ 3 օղակին վրայ տափածութեանց յաւելուածներ կան. իւր կերպարանափոխութեան կողմանէ մեղուկներուն հետ կը նոյնանայ:

Լուսն՝ իւր կատարեալ վիճակին մէջ մարդիկներն ու անասուններն անհազդոտ կ'ընէ եւ անոնց արիւնը կը ծծէ: Իւր սաստիկ մանր ձուերը՝ խուցին յատակին վրայ, աւելածոյ շիւղերուն մէջ եւն, եւն, այսպիսի տեղեր կ'ածէ: Թրթուրը՝ բարակ, ճերմակ, առանց ոտքի որդի մը կը նմանի եւ օձի մը պէս կը գալարի:

Ամէն տեսակ կենդանեաց վրայէն ինկած բաներով կը սնանի, զորոնք փոշւոյ եւ շիւղերու աղտեղութեանց մէջ կը գտնէ: Տառնումէկ օր ետքը տեսակ մը բոժածի մէջ կը կծկի, եւ դարձեալ 10 օր ետքը կատարեալ միջատ կ'ըլլայ: Ամբողջ փոփոխութիւնը 4 շաբաթ կը տեւէ: Մաքրութիւն եւ ստէպ

ԿԱՐԳ 7. ԿԻՍԱԹԵՒԵՐ ԿԱՄ ՄԼՈՒԿՆԵՐ (Hemiptera)


Կիսաթեւերը կամ Մլաւները՝ անկատար փոփոխութիւն ունին, ասոնց բերանը ծծելու յարմար խողովակ մըն է, որուն մէջ՝ եղջերներ խողանաւոր 3—4 հատ արքանաձեւ մասունք կան, որոցմով կենդանական կամ բուսական հիւթ կը ծծեն: Սովորաբար 4 թեւ ունին, ոմանք միայն երկու հատ, կամ ամենեւին չունին: Գարշ հոտ մը կը բուրեն: Մինչեւ հիմայ 12.000 ճանչցուած է, թէպէտ օտարերկրեայ մուկներէն միայն մեծերը քննուած են: 6 գլխաւոր ցեղերու կը բաժնուին:

ՑԵՂ Ա. ՆԵՐԿՐՈՄԼՈՒԿՆԵՐ (Geocorida)

266. Հասարակ հրաւր կամ Փայրոմիլը (Acanthia lectularia) գորշ կարմիր գունով, տափակ ու բարակ մարմին մ'ունի: Գլուխը շատ մանր է, կարճ եւ բարակ բողկուկներ, եւ բարակ ու նուրբ դէպ ի կուրծքը ծալուած կնճիթ մ'ունի, զոր միայն խայթելու ատեն վեր կը

անկէ միջատը: Կուրծքը սրտաձեւ է, փորը՝ հաւկթաձեւ կըր: Մըուկը միայն թեւոց ծածկոյթ ունի, բայց թեւ չունի:

Մըուկը՝ թռչնոց բոյնին մէջ կ'ըլլայ, բայց ամէնէն աւելի մարդկան բնակարաններու մէջ, Հոս ալ կը սիրէ գլխաւորաբար պառկելու խցերը, եւ ասոնց քով եղած կահ կարասեաց, պատկերներու շրջանակներուն մէջ, գորգերու ետեւը, պատին ճեղքուածներու եւ ծակերու մէջ եւայլն եւայլն, բոյն կը շինէ:



Ցերեկը՝ իւր թաքստոցին մէջ հանգարտ կը կենայ, միայն գիշերը միջոյ մէջ, քնացող մարդկան վրայ կու գայ եւ ասոնց արիւնը կը ծծէ: — Էգը տարին 3—4 անգամ 50 չափ ձու կ'ածէ, եւ ձագերը 11 շաբաթուան մէջ կատարեալ կը մեծնան, ասկէ զատ աւփաներով անօթութեան, ձմերուան ցրտութեան ալ կը գիմանան: Եթէ յարատեւ այս տաղտկալի միջատը ջնջելու չաշխատուի՝ արտաքոյ կարգի շատ կը բազմանայ: Չափ ջնջելու ամէնէն լաւ միջոցն է, մաքրութիւն եւ ստեղ ստեղ իւր պահուած առած ծակերուն մէջ զինքը փնտռել ու սատկեցնել: Միջատասպան փոշիները գրեթէ օգուտ չունին. ամէնալաւ միջոցն է արքայաջուր: Եթէ սենեակ մը օդ-ի-դ գոցելով ծծումբ վառուի՝ բոլորովին կը ջնջուի այս զաղէր միջատը:

Պտկ. 411. Հասարակ մըուկ (5 պատիկ մեծոց.):

267. Զարդարաւոր հնգապար (Stractia ornata) կարմիր է, եւ մարմնոյն ամէն մէկ մասին վրայ սեւ կէտեր ու բծեր ունի: Բարակ եւ ըստ բաւականի երկայն բողկուկները, եւ բարակ սրունքները՝ սեւ են: Վրայի կողմը տափակ մարմինը՝ հաւկթաձեւ է, չորս թեւ ունի, որոնց վրայինները (թեւապատեան) արմատին քովը եղջերեայ նիւթէ են, իսկ ծայրերը թաղանթէ եւ երակներով: Իրենց թեւերուն մէջտեղը՝ մեծ երեքանկիւնի վահանակ մը կայ: Բարակ խայթոցը կամ խայթելու կընձիթը՝ կրնայ կուրծքին տակը խողովակի մը մէջ ամփոփուիլ:



Պտկ. 412. Զարդարուն հնգապար (2 անգ. մեծոց.):




Պտկ. 413. Մոխրագոյն հնգապար (քիչ մը մեծոց.):

Թէ՛ այս եւ թէ՛ ասոր նման հնգապարներու բազմաթիւ (գրեթէ 8000) տեսակները, որոնք կանաչ, կապոյտ, մոխրագոյն կամ գորշ գունով կ'ըլլան, առաջին նայուածքով բզէզներու կը նմանին, եւ զանազան խոտի կամ թփի տեսակ բոյսերու վրայ կ'ապրին եւ անոնց հիւթը կը ծծեն: Հատ անգամ բանջարեղէններու վրայ, ի մասնաւորի կաղամբի վրայ կը գտնուին, եւ ասոնց տերեւները պարզուտի պէս կը ծակծկեն:

Այս հնգատի ամեն տեսակները՝ դպածիգ պես անախորժ հոտ մը կը տարածեն: — Ծառերու վրայ ի մասնաւորի լափնինէր- (Alnus glutinosa) վրայ կ'ապրի Մփրփոյն Հնգոյր (Pentatoma grisea). Իսկ գլխաւորաբար Ռիլինէր- (Tiliaceae) արմատին եւ վարի բուռնի վրայ կ'ապրի ատրագոյն կարմիր, սեւ բծերով՝ Անին- Հնգոյր (Pyrrhocoris apterus): Արեւադարձի երկիրները բազմաթիւ ցամաքի մլուկներ կան, որոնց մէջ մեծ եւ գեղեցիկ գոյներով տեսակներ ալ կը գտնուին:

ՅԵՂ Բ. ՀԻՄԵՐՈՒԿՆԵՐ (Hydrocorida)

268. Աբահընիայի ջրափուռ (Hydrometra lacustris) շատ նեղ
եւ երկայնաձեւ մարմին ունի, առջեւի ոտուկները շատ կարճ են, իսկ
ետեւիններն՝ երկայն եւ իրարմէ բաց դիրքով, իսկ բողկուկները խոզա-
նաձեւ են: Գոյնը սեւ է, առջեւի թեւերն նեղ եւ սեւ, իսկ ետեւին-
ները՝ գորշ են:



Պտկ. 414. Արագընթաց ջրամուկ (Բ. մ.):

Պտկ. 415. Թիկնալող (Բ. մ.):

Այս երկայնաարուն, սարդի նման ջրամուկը շատ անգամ մնայուն ջրերուն երեսին վրայ մեծ արագութեամբ կը սահի կ'երթայ, եւ այս բնեւոր առեօն՝ բարակ մազերով ծածկուած մարմինը հազիւ ջրոյ մակերեսային կը շօշափէ։ Զանազան միջատներու ետեւէն կ'իյնայ եւ իւր կնճիթովը զանոնք խայթելով ասոնց հիւթը կը ծծէ։

Նշանաւոր Զրամուկներն են.
Հասարակ Ռիկուլը (Notonecta
glauca). Խայթումքը՝ մար-
դուն ալ սաստիկ ցաւ կը պատ-
ճառէ:

Ջր-հ-բերիճը (*Nepa cinerea*).
այս ալ սաստիկ կը խայթէ:


ՅԵՂ Գ. ՃՊՈՒԻՆԵՐ (Cicadida)

269. Հասարակ ճպրտ-
(ճուէլ, ճպիտ, Cicada orni)
Հաստ ու թանձր մարմին մը,
չորս հատ մեծ, թաղանթեայ



Պտկ. 416. Զրականրիմ
(Բ. Մ.):

Պտկ. 417. Հասարակ
Ծպուռ (Բ. մ.):




Պտկ. 419. Լապտերաւոր (Ք. մ.):

ուջագոյն սխալմամբ կը կարծուէր որ ասոր գլուխը՝ գիշերը լապտերի մը պէս լոյս կու տայ:

ՅԵՂ Դ. ՑԵՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐ ԱՓԻՄՆԵՐ (Aphidida)

271. Վարդաւույն կամ Վարդի ափիսը (Aphis rosae) կանանչ գոյն մը եւ կատարեալ վիճակին մէջ չորս հատ փափուկ թեւ ունի:



Պտկ. 420. Վարդաւույն.

ձախ՝ արու եւ աջ՝ էգ (4 պատ. մեծց.):


Արունքներն երկայն ու բարակ են, իսկ նուրբ բողկուկները մարմնէն աւելի երկայն են:

Վարդի ափիսը՝ վարդենիներու մատաղ ճիւղերուն վրայ կ'ապրի, եւ երբեմն բոլորովին կը ծածկէ եւ ասոնց հիւթը ծծելով կը մնասէ: Դանդաղ, ծոյլ միջատ մըն է, բայց արտաքոյ կարգի արագ կը բազմանայ:

Ափիսը իւր մարմնոյն չափ՝ կամ մարմնէն աւելի երկայն կնճիթ մ'ունի, զոր հիւթ ծծելու ատեն վեր կը տնկէ եւ տունկին մէջ կը խոթէ: Մարմնոյն ետեւի կողմը 2 հատ բարակ խողովակներ ունի, որոնց մէջէն քաղցը եւ կպչուն հիւթ մը դուրս կու տայ, որով տերեւներուն վրայի երեսը փայլուն տեսք մը կ'առնու, այս հիւթը՝ որ մարդոց կ'անուանուի, միջինները կը հրապուրէ: Այս միջատը յաճախ եւ ստեղծող ստեղծող խորիւր կը փոխէ, թափուած խորիւրով տերեւները կը ծածկուին եւ կարծես ալիւրոտ կերպարանք մը կ'առնուն (սակէ տրուած է պէրջող անունը): Արտաքոյ կարգի շատ կը բազմանայ, ծխախոտի ծուխով, գաճով կամ կրի փռչով, եւ տնկերը լուալով կամ խողանակելով այս միջատը ջնջելու կը ջանան: Բարեբախտաբար միջատներէն շատերն ասոնց թշնամի են, զոր. Կոքինէլ (Coccinella septempunctata), Թիւնառ (Tachinae), բայց ամէնէն աւելի քանի մը հատ պղտիկ հետաճանուկ միջատներ: — Խնձորիներու վրայ շատ անգամ՝ ափիս մը կը գտնուի, որ բոլորովին ճերմակ եւ փափուկ բոլորով ծածկուած է, եւ եթէ ճմլուի արեան կարմրութեամբ բիծ մը կը ձգէ: Աղաճմանիներու վրայ՝ Պարսիկ՝ Ափիս բուսածը տերեւներու կոթերուն վրայ գնդաձեւ յցուած բաներ կը չինէ եւ ասոնց եղբրները գալարելով անոնց մէջ կ'ապրի:

Նշանակէ սալորիներու վրայ կայ ասոր նման ափիսի տեսակ մը. ան՝ ձրեւոտ տարիներ՝ մեծ, առանց կուտի, քսակաձեւ սալորներ յառաջ կը բերէ, բնականապէս այսպիսի սալորները չեն ուտուիր: Բայց ափիսի

ամենաշնասակար տեսակներէն մէկն է՝ Ուլա-լու-իճը կամ Ալա-ի-ն-ի-լ ֆիլոքսերան (Phylloxera vastatrix). Մանր միջատ մըն է, պարզ աչքը հազիւ կը նշմարուի, գետնի տակ որթատնկի արմատին վրայ կ'ապրի. եւ երբեմն այնպէս շատ կը բազմանայ, որ նախ որթատնկի տերեւները կը գեղնին կը շորնան, եւ ետքն ամբողջ տունկը կ'ապականի: Որթա-լու-իճը գրեթէ միշտ առանց թելի է, միայն երբեմն տաք ամառուան ատեն քանի մը հատ թելաւորներ ալ կ'երեւան: Այն տնկերն՝ որոնց



Պտկ. 421. Որթալուիճ (շատ մեծց.):

Ա. Բ. Գ. Դ. արմատին մէջ կը գտնուին. Ա. երկու օրուան ծծի (կռնակէն նկատուած). Բ. փոքի կողմանէ. Գ. կողմնակի. Դ. նոյնպէս կողմնակի. Ե. բողկուկ. Զ. ծծելու խողովակ. Է. նոյնին պատեանը. Ը. թելաւոր միջատ. Թ. հիւթ կը ծծէ:

արմատին վրայ գտնուի այս միջատն՝ կորսուած են, հարկ է զանոնք փորել հանել եւ այրել, եւ գետինը այլեւայլ միջոցներով այս միջատներէն ազատել: Որպէս զի այս չարիքն աւելի շտաբածուի, այս միջատին գտնուած տեղերէն տնկելու համար որթատունկ պէտք չէ առնուլ: Գաղղիա, Սպանիա, Փոքր Ասիա (մինչեւ Զմիւռնիա) եկած է այս վնասակար միջատը: Այլեւայլ տէրութիւններ՝ այս միջատը սատկեցընելու զօրաւոր եւ տեւական գեղ մը գտնողին միջոցնէր խոստացած են, բայց


մինչեւ հիմայ դեղ մը գտնուած չէ: Ամերիկեան որթատունկը կը դիմանայ այս միջատին խայթուածքին, փնաս չի կրեր, բայց միայն՝ ինչպէս կը կարծուի, մատաղ եղած ատեն:

ՅԵՂ Ե. ՎԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՄԼՈՒԿՆԵՐ (Coccida)

272. Որդան կարմիրը (Գոճան) (Coccus cacti) շատ մանր եւ անկատար է: Բոլորովին աճած էգերը՝ կլոր, կիսագնդաձեւ կարմրագոյն հատիկներու կը նմանին, սկզբան անդ ճերմակ բրդով ծածկուած կ'ըլլան, եւ եթէ մանրադէտով զննուին, փորի կողմը՝ կնճիթը, բողկուկներն եւ կարճ ոտուկներն կը նշմարուին: Արուներն երկայն ու բարակ են, եւ երկու հատ կաթի պէս ճերմակ փափուկ թեւեր ունին:

Պտկ. 422. Որդան կարմիրը (4 պատիկ մեծց.):
աջ՝ արու. ձախ՝ էգ:

Որդան կարմիրը սկզբնաբար Մեքսիկոյ՝ Կուբէ (Opuntia coccinelifera) ըստած կողի-



Պտկ. 423. Կարմրաքերի վրայ որդան կարմիրներ:


ներու մէկ տեսակին վրայ կ'ապրի: Էգերն արտաքոյ կարգի քիչ շարժում կը ցուցնեն, մուտ կռվներու ցողունին վրայ ծծելով հաստա-տան կը կաշին եւ կը սատկին, բայց սատկելէն յառաջ կ'ածեն իրենց ձուերը, եւ նոյն իսկ սատկելէն ետքն ալ իրենց մարմնովը վահանի մը պէս կը ծածկեն այս ձուերը:

Այս միջատին կեանքը՝ փոփոխութեան ժամանակն ալ մէկտեղ առեալ՝ զից շարաթ կը տեւէ, ուստի մէկ տարուան մէջ շատ ծնունդներ զիրար կը յաջորդեն, եւ թէ՛ ասոնց եւ թէ՛ առհասարակ բոլոր վահանաւոր ափիս-ներու շատնալը, հիանալի է: Որդան կարմիրը փառաւոր կարմիր գոյն մը ունի, որմէ բուն կարմրագեղը (Carmin) կ'ելլէ: Ուստի եւ վերոյիշեալ ծառերու վրայ այս միջատը բազմութեամբ կը դարմանուի. երբեմն երբեմն կը ժողվեն, ապա թիթեղի վրայ տարածելով կը սատկեցնեն եւ ասոնցմով վաճառականութիւն կ'ընեն: Հիմայ ճաւառ ու Այթիբի ալ որդան կարմրի բաւական ընդարձակ անկարկութիւններ կան: Ամերիկա չգտնուած՝ մեծագին ծիրանի եւ կարմրի ներկերը ծէրաւթի (Purpura patula) ըսուած խզունջէն կը հանէին:

Հատ մը վահանաւոր «փիւնի» մնասկար եւ օգտակար տեսակներ կան: Օգտակարներէն մէկն է՝ խիժ-լիժ գոմանը (Coccus lacca), լայ-տ կը մատակարարէ, որ ջնարակ, մորտ, կնքամոմ եւայլն եւայլն, շինելու կը գործածուի:

ՑԵՂ 2. ԱՋԻՆՆԻ (Pediculida)

273. Գլխո- ոջիւ (Pediculus capitis) միշտ անթեւ է, երկայնա-ձեւ մարմին մ'ունի, մութ դեղին մոխրագոյն գունով է, եւ կնճիթ մ'ունի, զոր կրնայ ներս քաշել եւ ասով արիւն կը ծծէ:



Պատկ. 424. Ոջիւններ:

ա. - Գլխու ոջիւ եւ անիծ. բ. Մուշտակի ոջիւ. գ. Չգետի ոջիւ. դ. Հան ոջիւ (ամէնն ալ մեծց.):

Այս զագիր եւ դանդաղ միջատը ամէնէն աւելի տղոց գլխուն ետեւի մասին վրայ կ'ըլլայ, եւ կամայ կամայ տղան հասակն առնելով, ինքն իրմէ աններելոյթ կ'ըլլայ այս միջատն ալ: Էգն իւր ձուերը (անիծները) կաշուն նիւթով մը մազերու վրայ կը կպցնէ: Չգետի ոջիւն (Pediculus vestimenti) կեղտոտ մարդկան զգեստներու եւ անկողնոյ վրայ կ'ըլլայ: Նշանաւոր է Մուշտակի ոջիւն (Phthirus pubis) եւ Հան ոջիւ (Trichodectes canis):



ԴԱՍ Բ. ՍԱՐԴԱԶԳԻՆԵՐ (Arachnoidea)

Սարդազգիները սպիտակարիւն, յօդաւոր կենդանիներ են. ասոնց գլուխն ու կուրծքը իրարու հետ միացած են, ութ յատուկ ոտքեր եւ երկու մինչեւ տասուերկու՝ միշտ պարզ աչք ունին. ոչ բողկուկ, ոչ թեւ եւ ոչ ալ փոփոխութիւն ունին: 4 Գլխաւոր կարգերու կը բաժնուին, որոնցմէ 10.500 տեսակ ճանչցուած է մինչեւ հիմայ: Ոմանք (սարգերն ու կարիճները) թոքի պարկերով, իսկ ոմանք ալ (փաղանգներն ու բաշխերը) օդոյ խողովակներով շունչ կ'առնուն:

ԿԱՐԳ 1. ԿԱՐԻՃՆԵՐ (Scorpionida)

Կարիճներու աչուրները մանր կէտի մը չափ են, երկայն մկրատի ձեւով շոշափելիքներ ունին, փորին վերի կողմը լայն, իսկ դէպ ի վարի ծայրը նեղ է: Արտաքուստ քիչ շատ խեցգետիններու կը նմանին, բայց ասոնցմէ կը տարբերին. 1. բնակութեամբ եւ թոքէն շունչ առնելով. 2. խեցգետիններու պէս բողկուկ չունին. 3. կարիճներու աչքը բաղադրեալ է, եւ փորին ծայրը հողմահարի ձեւով չէ. 4. կարիճներուն մկրատները բերնի մասունք են, եւ խեցգետիններու մկրատներուն պէս ոտք չեն:

Գլխաւոր կարիճներն են:


274. Մեծ կարիճը կամ Կոր (Scorpio europaeus) եղջերեայ նիւթէ՝ բաց գորշ գունով մորթով մը ծածկուած է: Մարմնոյն հաւկթաձեւ առջեւի մասին վրայ չորս զոյգ ոտքէ զատ՝ աչքի կը զարնեն գլխաւորաբար մեծ կզակի աքցանները, որոնք խաչափառի մկրատի կը նմանին: Վեց զոյգ մանր աչքեր ունի: Մարմնոյն ետեւի կողմը՝ զգալի կերպով նուրբ եւ յօդաւոր է. ծայրը փամփշտի ձեւով սնամէջ թոյնի խայթոցով՝ լայն անդամ մ'ունի:

Մեծ կարիճը՝ Եւրոպայի տաք երկիրները՝ մինչեւ հարաւային Ալպեան լեռանց ոտորոտը, եւ նաեւ Բալկանեան թերակղզիէն սկսեալ մինչեւ Կ. Պոլս եւ շրջակայքը կը գտնուի:


Ցերեկը քարերու, հին ապստամբամաներու տակ, պատերու ճեղքուածներու եւ նոյն իսկ տներու մէջ, անկողնոյ տակ, կահ կարասեաց մէջ եւ յատակին տակ կը պահուլտի, եւ գիշերն իւր կերակուրը փնտռելու կ'ելլէ:

ԿԵՆԴՐԱՆՈՐԾԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

կերակուրն է տալ տեսակ միջատ: Որոն՝ իւր մկրատներով կը բռնէ եւ իւր խայթոցով կը ոտակեցընէ: Իւր փորովն՝ որ դէպ ի կանակը դարձած է, շատ արագ կը վազէ, խայթոցն վեր անկած կը քայլէ եւ միշտ յարձակելու կամ ինք զինք պաշտպանելու պատրաստ վիճակի մէջ: Կարիճները 20—60 հատ կենդանի ձագ կը բերեն: Այս կարիճն՝ եթէ բռնուի կամ գրգռուի նաեւ զմարդ ալ կը խայթէ, բայց մարդիկ զուր տեղ չափազանց կը վախնան այս կենդանիէն, վասն զի ասոր խայթուածքը մեղուներուն եւ պիծակներուն խայթուածին չափ վտանգաւոր չէ եւ այնչափ ալ չի ցաւցըներ, եւ (գլխաւորաբար կարիճի) եղ քսելով կամ ծարելի օշակով (ամանիակով) շփելով ցաւը շատ կը մեղմանայ: Ափրիկէ եւ Արեւելեան Հնդկաստան շատ մեծ կարիճներ կան, որոնց խայթուածքն ըստ բաւականի վտանգաւոր եւ երբեմն նաեւ մահացու է:



Պտկ. 425. Մեծ կարիճ (Բ. մ.):



Պտկ. 426. Գրոց կարիճ:


Ընդհակառակն Գրոց կարիճը (*Chelifer cancroides*) շատ մանր եւ բոլորովին անփնտիր կարիճ մըն է: Մամուլ, ծառոց կեղեւներու տակ, հին գրքերու եւայլն եւայլն, նման իրաց մէջ կը գտնուի, եւ միայն շատ մանր միջատներ, գլխաւորաբար բաշխեր եւ թղթի ափիւններ կ'ուտէ: Իւր լայն փորովն եւ երկայն մկրատածեւ՝ կզակի շօշափելիքներով շատ դիւրաւ կը ճանչցուի:

ԿԱՐԳ 2. ՍԱՐԳԻՆ (Araneida)

Այս կարգին տակ գացող կենդանիները շատ ծանօթ են՝ իրենց շինած (սարդի)ստայնով, որ հայերէն Կարգ ալ կ'անուանուի. փորին կողմը վեց հատ, իսկ ոմանք 4 հատ պտկիկներ ունին, որոնցմէ իրենց

ոտքին օգնութեամբը թելեր կը հանեն, որ կաշուն հիւթ մըն է եւ օդին մէջ կը կարծրանայ: Առանձնակեաց յափշտակիչ անասնիկներ են եւ բոլորովին անվնաս. միայն ճանճեր՝ կամ միջատներ, իսկ մէկ հատը միայն նաեւ շատ մանր թռչուններ, մողէզներ ալ կ'ուտէ, այսինքն՝ արիւնը կը ծծէ: — Զարմանալի է քանի մը մանր սարգերու ճարպկութիւնը. երբ իրենց հիւսուածքին մէջ իրենցմէ մեծ ճճի մը կամ ճանճ մ'իյնայ, կը սկսին նախ իրենց թելերով անոնց թելերն ու մարմինը փաթթել, որպէս ղի անշարժ մնան եւ չկարենան փախչիլ: Ինքնապահպանութեան տեսակ մը բնազդում: Գլխաւորներն են:

274. Ընթանի սարգը (ժամուկը) (*Tegenaria domestica*) գորշ գունով է, կուրծքին հետ միացած մանր գլուխ մը, կզակի տեղ ծա-



Պտկ. 427. Ընթանի սարգ (քիչ մը մեծց.):

ւայող՝ մէջը պարապ երկու շօշափելիքներ ունի, որոնց մէջ թռչնի խօղովակներ կան. ըստ բաւականի մեծ հաւկթածեւ փոր մը, եւ չորս զոյգ ոտուկներ ունի, գլխուն վրայ ութ հատ կէտի նման աչուկներ կան, որոնք երկու կարգ բաժնուած են, ամէն մէկ կարգի մէջ չորս չորս հատ:




Պտկ. 428. Սարգին ոտքին ծայրը (շատ մեծց.):

Այս սարգն ամէն տեղ տներու, ախոռներու եւ շտեմարաններու անկիւնները, նուրբ, խիստ ուսույն կը շինէ: Այս նուրբ ու բարակաման ուսույնը գրեթէ բոլորովին հարկանական է. եւ դէպ ի կենդանի երթալով գլանի ձեւ կ'առնու. ասոր մէջ սարգն անշարժ կը նստի, մինչեւ որ ճանճ կամ ուրիշ միջատ մ'իյնայ ցանցի մէջ, անմիջապէս կ'երթայ կ'առնու, եւ իւր պահուստած տեղն հանդարտ կ'ուտէ: Այս անվնաս, բայց շատերուն արտաքոյ կարգի ատելի կենդանին կը հալածուի, վասն զի իւր ուսույններով բնակարանները կ'աղտողէ:

անկէ միջատը: Կուրծքը սրտաձեւ է, փորը՝ հակաթաձեւ կըր: Մլուկը միայն թեւոց ծածկոյթ ունի, բայց թեւ չունի:

Մլուկը՝ թռչնոց բոյնին մէջ կ'ըլլայ, բայց ամէնէն աւելի մարդկան բնակարաններու մէջ: Հոս ալ կը սիրէ գլխաւորաբար պառկելու խցերը, եւ ասոնց քով եղած կահ կարասեաց, պատկերներու շրջանակներուն մէջ, գորգերու ետեւը, պատին ճեղքուածներու եւ ծակերու մէջ եւայլն եւայլն, բոյն կը շինէ:



Ցերեկը՝ իւր թաքնուոցին մէջ հանդարտ կը կենայ, փայլէ գիշերը միայ մէջ, քնացող մարդկան վրայ կու գայ եւ ասոնց արիւնը կը ծծէ: — Էգը տարին 3—4 անգամ 50 չափ ձու կ'ածէ, եւ ձագերը 11 շաբաթուան մէջ կատարեալ կը մեծնան, ասկէ զատ աւփոսներով անօթութեան, ձմերուան ցրտութեան ալ կը դիմանան: Եթէ յարատեւ այս տաղտկալի միջատը ջնջելու չաշխատուի՝ արտաքոյ կարգի շատ կը բազմանայ: Չառի ջնջելու ամէնէն լաւ միջոցն է, մաքրութիւն եւ ստեպ ստեպ իւր պահուած ծակերուն մէջ զինքը փնտռել ու սաակեցընել: Միջատասպան փոշիները գրեթէ օգուտ չունին. ամէնալաւ միջոցն է արքայաջուր: Եթէ սենեակ մը օդ-փէր գոցելով ծծումբ վառուի՝ բարոյզին կը ջնջուի այս զաղիր միջատը:

Պտկ. 411. Հասարակ մլուկ (5 պատիկ մեծց.):

267. Զարդարոտն հնգաթը (Stractia ornata) կարմիր է, եւ մարմնոյն ամէն մէկ մասին վրայ սեւ կէտեր ու բծեր ունի: Բարակ եւ ըստ բաւականի երկայն բողկուկները, եւ բարակ սրունքները՝ սեւ են: Վրայի կողմը տափակ մարմինը՝ հակաթաձեւ է, չորս թեւ ունի, որոնց վրայինները (թեւապատեան) արմատին քովը եղջերեայ նիւթ են, իսկ ծայրերը թաղանթէ եւ երակներով: Իրենց թեւերուն մէջտեղը՝ մեծ երեքանկիւնի վահանակ մը կայ: Բարակ խայթոցը կամ խայթելու կրն՝ ճիթը՝ կրնայ կուրծքին տակը խողովակի մը մէջ ամփոփուիլ:



Պտկ. 412. Զարդարոտն հնգաթ (2 անգ. մեծց.):




Պտկ. 413. Մոխրագոյն հնգաթ (քիչ մը մեծց.):

Թէ՛ այս եւ թէ՛ ասոր նման հնգաթներու բազմութիւն (գրեթէ 8000) տեսակները, որոնք կանաչ, կապոյտ, մոխրագոյն կամ գորշ գունով կ'ըլլան, առաջին նայուածքով բզէզներու կը նմանին, եւ զանազան խոտի կամ թփի տեսակ բոյսերու վրայ կ'ապրին եւ անոնց հիւթը կը ծծեն: Հատ անգամ բանջարեղէններու վրայ, ի մասնաւորի կաղամբի վրայ կը գտնուին, եւ ասոնց տերեւները պարզուտի պէս կը ծակծկեն:


Այս հնգատի առին տեսակները՝ դպածիդ պէս անախորժ հոտ մը կը տարածեն: — Ծառերու վրայ ի մասնաւոր լատիւններու (Alnus glutinosa) վրայ կ'ապրի Մ-իւր-գոյն Հնգաթը (Pentatoma grisea). իսկ գլխաւորաբար Ռ-իւններու (Tiliaceae) արմատին եւ վարի բունին վրայ կ'ապրի ատրաքոյն կարմիր, սեւ բծերով՝ Անթի- Հնգաթը (Pyrrhocoris apterus): Արեւադարձի երկիրները բազմաթիւ ցամաքի մուկներ կան, որոնց մէջ մեծ եւ գեղեցիկ գոյներով տեսակներ ալ կը գտնուին:

ՑԵՂ Բ. ԶՐԱՄԼՈՒԿՆԵՐ (Hydrocorida)

268. Արագրնիաց ջրամուկը (Hydrometra lacustris) շատ նեղ եւ երկայնաձեւ մարմին ունի, առջեւի ոտուկները շատ կարճ են, իսկ ետեւիներն՝ երկայն եւ իրարմէ բաց դիրքով, իսկ բողկուկները խոզանաձեւ են: Գոյնը սեւ է, առջեւի թեւերն նեղ եւ սեւ, իսկ ետեւիները՝ գորշ են:



Պտկ. 414. Արագրնիաց ջրամուկ (Բ. մ.):



Պտկ. 415. Թիկնալող (Բ. մ.):

Այս երկայնասրուն, սարդի նման ջրամուկը շատ անգամ մնայուն ջրերուն երեսին վրայ մեծ արագութեամբ կը սահի կ'երթայ, եւ այս բնելու ատեն՝ բարակ մագերով ծածկուած մարմինը հազիւ ջրոյ մակերեսէն վեր կը շոշափէ: Զանազան միջատներու ետեւէն կ'իյնայ եւ իւր կնճիթովը դանհնք խայթելով ասոնց հիւթը կը ծծէ:

Նշանաւոր ջրամուկներն են. Հասարակ Ռիւսալը (Notonecta glauca). խայթուածքը՝ մարդուն ալ սաստիկ ցաւ կը պատճառէ:

Ջր-իւր-ի (Nepa cinerea). այս ալ սաստիկ կը խայթէ:

ՑԵՂ Գ. ԺՊՈՒԹՆԵՐ (Cicadida)

269. Հասարակ ճպոռ (ճաւի, ճպոռ, Cicada orni) հաստ ու թանձր մարմին մը, չորս հատ մեծ, թաղանթեայ



Պտկ. 416. Զրակարիծ (Բ. մ.):




Պտկ. 417. Հասարակ ճպոռ (Բ. մ.):

եւ թափանցիկ թեւեր ունի: Գոյնը դեղին գորշ, իսկ կոնակը՝ սեւ է: Բողկուկները կարճ, իսկ ընդհակառակն կնձիթը շատ երկայն է, եւ միջատը հանգիստ կեցած ատեն՝ կուրծքին վրայի ծակի մը մէջ միուած կ'ըլլայ: աշուրները շատ դուրս ցցուած են: Արուն փորին տակի կողմը երգելու գործարան մ'ունի, էգը՝ ձու ածելու խողովակ մը: Ընդհանրապէս ձգուռը չորցած մեծ ճանձի կը նմանի:

Այս միջատն Եւրոպա ու Արեւելք՝ ի մասնաւորի տաք երկիրներ շատ կը գտնուի, Գալլինաֆեր հացիէն (*Fraxinus ornus*) եւ Ճերմակ Բլիննայ (*Morus alba*) վրայ կը բնակի, եւ իւր կնձիթովն այս ծառին կեղեւները ծակելով՝ հիւթը կը ծծէ: Այս թանձր եւ չորցած հիւթէն մաննա՝ գաղպեն, ըսուածը կ'ըլլէ (որ լուծանելի եւ շաքարահամ նիւթ մըն է): Բայց մանանային մեծագոյն մասը ոչ թէ այս միջատին բացած ծակերէն կը հոսէ, այլ ծառին կեղեւին վրայ մասնաւոր արուեստական ծակեր կը բանան եւ այս մանանան կը փողկեն: Արդէն հին ատենը ձգուռը իւր բարձրաձայն երգին համար ծանօթ էր, բայց այս երգը քաղցրալուր եղանակ մը չէ, այլ ձանձրացուցիչ եւ միօրինակեալ ձայն մը, որ ասուգիւ գլխացցաւ կը պատճառէ: ձգուռը միայն ամարուան մէջտեղը, տաք արեւ եղած ատեն ծառոց ճիւղերուն վրայ կը նստի եւ կը սկսի երգել, արեւելք գլխաւորաբար Օգոստոսին, ուստի առած է փողովդական անունն ալ (տճկ. Օգոստոսի ցնկ):


270. Փրփրաքէր հոփաւը (*Aphrophora spumaria*) դեղին մոխրագոյն գունով անշուք միջատ մըն է, առջեւի թեւերուն վրայ երկու հատ ճերմակ շեղ շերտեր ունի:

Այս ձգուռին նշանաւոր մէկ յատկութիւնն այն է որ կանանչ թրթուր եղած ատեն, ուռիներուն հիւթը կը ծծէ, եւ ասով ճերմակ, թքի նման փրփրով մը ինքզինքը կը պատէ: Ինչպէս ասոնք ուռենեաց ճիւղերուն բոլորտիքը՝ նոյնպէս ալ ուրիշ ձգուռներու մանր տեսակներ, մարգերու վրայ խոտերու ցողուններուն եւ բանջարեղէնաց կոթերուն բոլորտիքը այսպիսի երեւոյթներ յառաջ կը բերեն, այս փրփուրը գեղացիք Բոփա կ'անուանեն:



Լապտերաւը (*Fulgora laternaria*) գոյնգոյն, զարդարուն թիթռան կը նմանի, բայց թեփ չունի: Գլխուն ծայրը մէկ մատ երկայնութեամբ, փամփշտի պէս ուռած յաւելուած մը կայ: Ետեւի թեւերուն վրայ մեծ, կիտրոնի գեղունութեամբ մութ գորշ գունով աչաձեւ բիծ մ'ունի: Սուրինամ եւ Գուիանայի վրայ կ'ապրի: Լապտերաւոր անուանուելուն պատճառն այն է որ յա-

Պտկ. 418. Փրփրաքեր ձգուռ. վարինը մեծցուած. վերինը՝ քն. մեծութեամբ:




Պտկ. 419. Հապտերալոր (Ք. մ.):

առջագոյն սխալմամբ կը կարծուէր որ ասոր գլուխը՝ գիշերը լապտերի մը պէս լոյս կու տայ:

ՅԵՂ Դ. ՅԵՐԵՆԵՄԼՈՒԿՆԵՐ ԿԸՄ ԱՓԻՄՆԵՐ (Aphidida)

271. Վարդապտիճ կամ Վարդի ափիսը (*Aphis rosae*) կանանչ գոյն մը եւ կատարեալ վիճակին մէջ չորս հատ փափուկ թեւ ունի:



Պտկ. 420. Վարդապտիճ.

ձախ՝ արու եւ աջ՝ էգ (4 պատ. մեծց.):


Սրունքներն երկայն ու բարակ են, իսկ նուրբ բողկուկները մարմնէն աւելի երկայն են:

Վարդի ափիսը՝ վարդենիներու մատաղ ճիւղերուն վրայ կ'ապրի, եւ երբեմն բոլորովին կը ծածկէ եւ ասոնց հիւթը ծծելով կը վնասէ: Դանդաղ, ծղլլ միջատ մըն է, բայց արտաքոյ կարգի արագ կը բազմանայ:

Ափիսը իւր մարմնոյն չափ՝ կամ մարմնէն աւելի երկայն կնճիթ մ'ունի, զոր հիւթ ծծելու ատեն վեր կը տնկէ եւ տունկին մէջ կը խոթէ: Մարմնոյն ետեւի կողմը 2 հատ բարակ խողովակներ ունի, որոնց մէջէն քաղցր եւ կալուն հիւթ մը դուրս կու տայ, որով տերեւներուն վրայի երեսը փայլուն տեսք մը կ'առնու, այս հիւթը՝ որ Ժւրջօղ կ'անուանուի, մրջինները կը հրապուրէ: Այս միջատը յաճախ եւ ստէպ ստէպ խորիւր կը փոխէ, թափուած խորիւրով տերեւները կը ծածկուին եւ կարծես ալիւրոտ կերպարանք մը կ'առնուն (առկէ տրուած է արջօղ անունը): Արտաքոյ կարգի շատ կը բազմանայ, ծխախտի ծուխով, գաճով կամ կրի փոշով, եւ տնկերը լուարով կամ խողանակելով այս միջատը ցնջելու կը ֆանան: Բարեբախտաբար միջատներէն շատերն ասոնց թշնամի են, զոր. Կ-ԲԻԷԼԷ (*Coccinella septempunctata*), Թ-ԲԻՆՈՒՆԵՐ (*Tachinae*), բայց ամենէն աւելի քանի մը հատ պզտիկ հետահանուկ միջատներ: — Խնձորիներու վրայ շատ անգամ՝ ափիս մը կը գտնուի, որ բոլորովին ճերմակ եւ փափուկ բրդով ծածկուած է, եւ եթէ ճմլուի արեան կարմրութեամբ բիծ մը կը ձգէ: Կաղամախիներու վրայ՝ Պ-ԲԻՆՈՒՆ Ափիս բնականորէն տերեւներու կնճիթներուն վրայ գնդաձեւ ջրուած բաներ կը շինէ եւ ասոնց եզերքները գալարելով անոնց մէջ կ'ապրի:

Նոյնպէս սալորիներու վրայ կայ ասոր նման ափիսի տեսակ մը. անձրեւոտ տարիներ՝ մեծ, առանց կուտի, քսակաձեւ սալորներ յառաջ կը բերէ, բնականապէս այսպիսի սալորները չեն ուտուիր: Բայց ափիսի

ամենաշնասակար տեսակներէն մէկն է՝ Ուլա-լիճը կամ Ալա-լիճը (Phylloxera vastatrix). մանր միջատ մըն է, պարզ աչքը հազիւ կը նշմարուի, գետնի տակ որթատնկի արմատին վրայ կ'ապրի. եւ երբեմն այնպէս շատ կը բազմանայ, որ նախ որթատնկի տերեւները կը դեղնին կը չորնան, եւ ետքն ամբողջ տունկը կ'ապականի: Ուրթա-լիճը գրեթէ միշտ առանց թելի է, միայն երբեմն տաք ամառուան ատեն քանի մը հատ թեւաւորներ ալ կ'երեւան: Այն տնկերն՝ որոնց




Պատկ. 421. Ուրթալիճ (շատ մեծ) :

Ա. Բ. Գ. Դ. արմատին մէջ կը գտնուին. Ա. երկու օրւան ծծի (կռնակէն նկատուած). Բ. փորի կողմանէ. Գ. կողմնակի. Դ. նոյնպէս կողմնակի. Ե. բողբոջ. Զ. ծծելու խողովակ. Կ. նոյնին պատեանը. Դ. թեւաւոր միջատ. Ե. հիւթ կը ծծէ:

արմատին վրայ գտնուի այս միջատն՝ կորսուած են, հարկ է զանոնք փորել հանել եւ այրել, եւ գետինը այլեւայլ միջոցներով այս միջատներէն ազատել: Որպէս զի այս չարիքն աւելի չտարածուի, այս միջատին գտնուած տեղերէն տնկելու համար որթատնկ պէտք չէ առնուլ: Գաղղիա, Սպանիա, Փոքր Ասիա (մինչեւ Չմիւռնիա) եկած է այս վնասակար միջատը: Այլեւայլ տէրութիւններ՝ այս միջատը սատկեցընելու ջորաւոր եւ տեւական դեղ մը գտնողին մէջմէջ խոստացած են, բայց

մինչեւ հիմայ դեղ մը գտնուած չէ: Ամերիկեան որթատունկը կը դիմանայ այս միջատին խայթուածքին, փնաս չի կրեր, բայց միայն՝ քնշպէս կը կարծուի, մատաղ եղած առեն:


ՅԵՂ Ե. ՎԱՀԱՆԱԴՈՐ ՄԼՈՒԿՆԵՐ (Coccida)



Պտկ. 422. Որդան կարմիր (4 պատիկ մեծց.):
աջ՝ արու. ձախ՝ եգ:

272. Որդան կարմիր (Գոճան) (Coccus cacti) շատ մանր եւ անկատար է: Բոլորովին աճած եգերը՝ կլոր, կիսագնդաձեւ կարմրագոյն հատիկներու կը նմանին, սկզբան անդ ճերմակ բրդով ծածկուած կըլլան, եւ եթէ մանրադէտով զննուին, փորի կողմը՝ կնճիթը, բողկուկներն եւ կարճ ոտուկներն կը նշմարուին: Արուներն երկայն ու բարակ են, եւ երկու հատ կաթի պէս ճերմակ փափուկ թեւեր ունին:

Որդան կարմիրը սկզբնաբար Մեքսիկայ՝ Կուբեթե (Opuntia coccinifera) ըսուած կղզի-



Պտկ. 423. Կարմրաքերի վրայ որդան կարմիրներ:


ներու մէկ տեսակին վրայ կ'ապրի: Էգերն արտաքոյ կարգի քիչ շարժում կ'ընեն, մնուտ կողմերու ցողունին վրայ ծծելով հաստատուն կը կպչին եւ կը սատկին, բայց սատկելէն յառաջ կ'ածեն իրենց ձուերը, եւ նոյն իսկ սատկելէն ետքն ալ իրենց մարմնովը վահանի մը պէս կը ծածկեն այս ձուերը:

Այս միջատին կեանքը՝ փոփոխութեան ժամանակն ալ մէկտեղ առեալ՝ վեց շաբաթ կը տեւէ, ուստի մէկ տարուան մէջ շատ ծնունդներ զիրար կը յաջորդեն, եւ թէ՛ ասոնց եւ թէ՛ առհասարակ բարձր վահանաւոր ափսոսներու շատնալը, հիանալի է: Որդան կարմիրը փառաւոր կարմիր գոյն մը ունի, որմէ բուն կարմրագեղը (Carmin) կ'ելլէ: Ուստի եւ վերոյիշեալ ծառերու վրայ այս միջատը բազմութեամբ կը դարմանուի. երբեմն երբեմն կը ժողովն, տաք թիթեղի վրայ տարածելով կը սատկեցնեն եւ ասոնցմով վաճառականութիւն կ'ընեն: Հիմայ չաւա ու Ալջերի ալ որդան կարմրի բաւական ընդարձակ տնկարկութիւններ կան: Ամերիկայ չգանուած՝ մեծագին ծիրանի եւ կարմրի ներկերը՝ քիւրպուր (Purpura patula) բուսած խղունջէն կը հանեն:

Հատ մը վահանաւոր ափսոսնոր՝ մնասակար եւ օգտակար տեսակներ կան: Օգտակարներէն մէկն է՝ խէժալի բոճալ (Coccus lacca), լայն կը մատակարարէ, որ ջնարակ, մորտ, կնքամոմ եւ այլն եւ այլն, շինելու կը գործածուի:

ՑԵՂ 2. ԱՋԻՆՍԻ (Pediculida)

273. Գլխոս ոջիլ (Pediculus capitis) միշտ անթեւ է, երկայնաձեւ մարմին մ'ունի, մութ դեղին մոխրագոյն գունով է, եւ կնճիթ մ'ունի, զոր կրնայ ներս քաշել եւ ասով արիւն կը ծծէ:



Պատկ. 424. Ոջիւններ:

ա. - Գլխու ոջիլ եւ անիծ. բ. Մուշտակի ոջիլ. գ. Ջգեստի ոջիլ. դ. Հան ոջիլ (ամէն ալ մեծց.):

Այս զազիր եւ դանդաղ միջատը ամէնէն աւելի տղոց գլխուն ետեւի մասին վրայ կ'ըլլայ, եւ կամաց կամաց տղան հասակն առնելով, ինքն իրմէ աներեւոյթ կ'ըլլայ այս միջատն ալ: Էգն իւր ձուերը (անէնիքը) կպչուն նիւթով մը մազերու վրայ կը կպցնէ: Ջգեստի ոջիլ (Pediculus vestimenti) կեղտոտ մարդկան զգեստներու եւ անկողնոյ վրայ կ'ըլլայ: Նշանաւոր է Մուշտակի ոջիլ (Phthirus pubis) եւ Հան ոջիլ (Trichodectes canis):



ԴԱՍ Բ. ՍԱՐԴԱԶԳԻՆՆԵՐ (Arachnoidea)

Սարգազգիները սպիտակադրիւն, յօդաւոր կենդանիներ են. ասոնց գլուխն ու կուրծքը իրարու հետ միացած են, ութ յատուկ ոտքեր եւ երկու մինչեւ տասուերկու՝ միշտ պարզ աչք ունին. ոչ բողկուկ, ոչ թեւ եւ ոչ ալ փոփոխութիւն ունին: 4 Գլխաւոր կարգերու կը բաժնուին, որոնցմէ 10.500 տեսակ ճանչցուած է մինչեւ հիմայ: Ոմանք (սարգերն ու կարիճները) թռչի պարկերով, իսկ ոմանք ալ (փաղանգներն ու բաշխերը) օդոյ խողովակներով շունչ կ'առնուն:

ԿԱՐԳ 1. ԿԱՐԻՃՆԵՐ (Scorpionida)

Կարիճներու աշուրները մանր կէտի մը չափ են, երկայն մկրատի ձեւով շօշափելիքներ ունին, փորին վերի կողմը լայն, իսկ դէպ ի վարի ծայրը նեղ է: Արտաքուստ քիչ շատ խեցգետիններու կը նմանին, բայց ասոնցմէ կը տարբերին. 1. բնակութեամբ եւ թռքէն շունչ առնելով. 2. խեցգետիններու պէս բողկուկ չունին. 3. կարիճներու աչքը բաղադրեալ է, եւ փորին ծայրը հողմահարի ձեւով չէ. 4. կարիճներուն մկրատները բերնի մասունք են, եւ խեցգետիններու մկրատներուն պէս ոտք չեն:

Գլխաւոր կարիճներն են:


274. Մէջ կարիճը կամ Կարը (Scorpio europaeus) եղջերեայ նիւթէ՝ բաց գորշ գունով մորթով մը ծածկուած է: Մարմնոյն հաւկթածեւ առջեւի մասին վրայ չորս զոյգ ոտքէ զատ՝ աչքի կը զարնեն գլխաւորաբար մեծ կզակի աքցանները, որոնք խաչափառի մկրատի կը նմանին: Վեց զոյգ մանր աչքեր ունի: Մարմնոյն ետեւի կողմը՝ զգալի կերպով նուրբ եւ յօդաւոր է. ծայրը փամփշտի ձեւով սնամէջ թոյնի խայթոցով՝ լայն անդամ մ'ունի:

Մեծ կարիճը՝ Եւրոպայի տաք երկիրները՝ մինչեւ հարաւային Ալպեան լեռանց ոտորոտը, եւ նաեւ Բալկանեան թերակղզիէն սկսեալ մինչեւ Կ.Պոլիս եւ չրջակայքը կը գտնուի:


Ցերեկը քարերու, հին տախտակամածներու տակ, պատերու ճեղքուածներու եւ նոյն իոյ տներու մէջ, անկողնոյ տակ, կահ կարասեաց մէջ եւ յատակին տակ կը պահոււի, եւ գիշերն իւր կերպովը փնտռելու կ'ելէ:

ԿԵՆԴՐԱՆՈՐԱՆՈՒԹԻՒՆ

կերակուրն է ամեն տեսակ միջատ: Որոն՝ իւր մկրատներով կը բռնէ եւ իւր խայթոցովը կը սաակեցընէ: Իւր փորսկն՝ որ դէպ ի կոշակը դարձած է, շատ արագ կը վազէ, խայթոցն վեր անկած կը քալէ եւ միշտ յարձակելու կամ ինք զինք պաշտպանելու պատրաստ վիճակի մէջ: Կարիճները 20—60 հաս կենդանի ձագ կը բերեն: Այս կարիճն՝ եթէ բռնուի կամ գրգռուի նաեւ զմարդ ալ կը խայթէ, բայց մարդիկ զուր տեղ չափազանց կը վախնան այս կենդանիէն, վասն զի ասոր խայթումաճքը մեղուններուն եւ պիծակներուն խայթումածին չափ վտանգաւոր չէ եւ այնչափ ալ չի ցուցըներ, եւ (գլխաւորաբար կարիճի) եղ քսելով կամ ծորելի օշակով (ամանիակով) չփելով ցաւը շատ կը մեղմանայ: Ափրիկէ եւ Արեւելեան Հնդկաստան շատ մեծ կարիճներ կան, որոնց խայթումաճքն ըստ բաւականի վտանգաւոր եւ երբեմն նաեւ մահացու է:



Պտկ. 425. Մեծ կարիճ (Ք. մ.):



Պտկ. 426. Գրոց կարիճ:


Ընդհակառակն Գրոց կարիճ (Chelifer cancroides) շատ մանր եւ բուրոյթին անփնաս կարիճ մըն է: Մամռոյ, ծառոց կեղեւներու տակ, հին գրքերու եւայլն եւայլն, նման իրաց մէջ կը գտնուի, եւ միայն շատ մանր միջատներ, գլխաւորաբար բաշխեր եւ թղթի ափիսներ կ'ուտէ: Իւր լայն փորով եւ երկայն մկրատաձեւ՝ կզակի շոշափելիքներովը շատ գիւրաւ կը ճանչցուի:

ԿԱՐԳ 2. ՍԱՐԳԵՐ (Araneida)

Այս կարգին տակ գացող կենդանիները շատ ծանօթ են՝ իրենց շինած (սարդի)ոստայնով, որ հայերէն Գորգ ալ կ'անուանուի. փորին կողմը վեց հատ, իսկ ոմանք 4 հատ պտկիկներ ունին, որոնցմէ իրենց

ոտքին օգնութեամբը թելեր կը հանեն, որ կպչուն հիւթ մըն է եւ օդին մէջ կը կարծրանայ: Առանձնակեաց յափշտակիչ անասնիկներ են եւ բոլորովին անփնաս. միայն ճանճեր՝ կամ միջատներ, իսկ մէկ հատը միայն նաեւ շատ մանր թռչուններ, մողէզներ ալ կ'ուտէ, այսինքն՝ արիւնը կը ծծէ: — Զարմանալի է քանի մը մանր սարդերու ճարպկութիւնը. երբ իրենց հիւսուածքին մէջ իրենցմէ մեծ ճճի մը կամ ճանճ մ'իյնայ, կը սկսին նախ իրենց թելերով անոնց թելերն ու մարմինը փաթթել, որպէս զի անշարժ մնան եւ չկարենան փախչիլ: Ինքնապահպանութեան տեսակ մը բնազդում: Գլխաւորներն են:

274. Ընտանի սարդը (ճաճուկը) (*Tegenaria domestica*) գորշ գունով է, կուրծքին հետ միացած մանր գլուխ մը, կզակի տեղ ծա-



Պտկ. 427. Ընտանի սարդ (ընչ մը մեծ):

ւայող՝ մէջը պարապ երկու շօշափելիքներ ունի, որոնց մէջ թոյնի խօղովակներ կան. ըստ բաւականի մեծ հաւկթածեւ փոր մը, եւ չորս զոյգ ոտուրներ ունի, գլխուն վրայ ութ հատ կէտի նման աչուրներ կան, որոնք երկու կարգ բաժնուած են, ամէն մէկ կարգի մէջ չորս չորս հատ:




Պտկ. 428. Սարդին ոտքին ծալը (շատ մեծ):

Այս սարդն ամէն տեղ տներու, ախոռներու եւ շտեմարաններու անկիւնները, նուրբ, խիստ ուստայն կը շինէ:

Այս նուրբ ու բարակաման ուստայնը գրեթէ բոլորովին հորիզոնական է. եւ դէպ ի կենդանի երթալով գլանի ձեւ կ'առնու. ասոր մէջ սարդն անշարժ կը նստի, մինչեւ որ ճանճ կամ ուրիշ միջատ մ'իյնայ ցանցի մէջ, անմիջապէս կ'երթայ կ'առնու, եւ իւր պահաւորած տեղն հանդարտ կ'ուտէ: Այս անփնաս, բայց շատերուն արտաքոյ կարգի ատելի կենդանին կը հալածուի, վասն զի իւր ուստայններով բնակարանները կ'աղտոնէ:

Առաջինին կը նմանի՝ բայց մեծ է խառնուրդը (Epeira Diadema):



Պտկ. 429. Խաչասարդ (Բ. մ.) եւ քերանը:

Ա. ձիւղէն կախուած. Բ. երկու կզակները. - կռթնաւոր աչքերը:

Ամենամեծ սարդն է Ամերիկայի Հարթլանդի կամ Թունսիէ սարդը (Mygale avicularia):



Պտկ. 430. Հաւորսակ(սարդ)ը մողէզ մը կ'որսայ (Բ. մ.):


Փղիթ կամ Դըրը (Lycosa Tarantula): Մարմնոյն վերի կողմը մոխրագոյն, փոքր վառվռուն դեղնագոյն կարմիր է, եւ հարաւային արեւելեան



Պտկ. 431. Փղիթ (Բ. մ.):

Իտալիայի ծայրը, հին Տարենտոն (ուստի առած է լատիներէն անունն ալ) քաղքին մօտերը, գետի տակ փապարներու մէջ կը գտնուի, եւ այս փապարներուն մուտքը տեսակ մը ծածկութիւն կը փակէ, եւ ներսի կողմը հիւսելով կը զարդարէ: Այս սարդը նշանաւոր եղաւ՝ շինծու առասպելով մը, իբր թէ խածուածքն այնպիսի հիւանդութիւն մը յառաջ կը բերէ, որ միայն չափազանց կաքաւելով կրնայ բժշկուիլ: Հարաւային եւ Միջին Եւրոպայի մէջ ալ շատ մը նման սարդեր կան, բայց մարդիկ ասոնցմէ ամենեւին չեն վախնար, վասն զի առանձին, չոր, աւազուտ տեղեր կը բնակին այս սարդերը, եւ երբ իրենց քովերը մէկն երթայ, իսկոյն ստորերկրեայ ճամբաներու մէջ կը պահուրան:

Ուրիշ բազմաթիւ սարդի տեսակներ կան, որոնց հիւսուածքը շատ անգամ օդի մէջ կը ծփայ: Ընդհանրապէս չոր եւ պարզ օդ եղած ժամանակ զանազան սարդի ոստայններ կը նշմարուին օդի մէջ: Ասոնց մէջ




Պտկ. 432. Զրասարդը (Բ. մ.):

շատ նշանաւոր է Զբոսարգր (Argyroneta aquatica)՝ ջրոյ մէջ շինած Տիւնաւածքովը, որուն մէջ կը նստի եւ ջրային մանր ձօններու դարանակալ կ'ըլլայ:

ԿԱՐԳ 3. ՓԱՂԱՆԳՆԵՐ (Opiliona)

Փաղանգները՝ բուն սարդերու կը նմանին, բայց թելահան պտիկ չունին, եւ ասոնց փորը թելով մը միացած չէ մարմնոյն առջեւի մասին հետ:

Ամենէն նշանաւորն է Դաշտաւոր (Phalangium Opilio): Դաշտաւորն վրայ շատ կը գտնուի: Միայն գիշերը գուրս կ'ելլէ, մանր միջատներ կ'որսայ:



Պտկ. 433. Փաղանգ (Ք. մ.):

ԿԱՐԳ 4. ԲԱՇԽԵՐ (Acarina)

Բոլոր Բաշխերը կատարեալ վեճակի մէջ 4 զոյգ ոտք, եւ գլխու ու կուրծքի հետ մէկտեղ աճած փոր մ'ունին: Ասոնց բերանը ծծելու յարմար է, ոմանք ալ տեսակ մը փոփոխութիւն կը կրեն:

275. Հասարակ Տիգը (Ixodes Ricinus) անօթի եղած ատեն պզտիկ եւ հակթաձեւ է եւ բարակ խաւաքարտի չափ հաստ: Գլուխը, կուրծքն ու փորն իրարու հետ մէկտեղ աճած են: Իւր ծծող կնճիթը՝ որ իրարու դարձած ճանկեր ունի, եւ չորս պզտիկ ոտուկները հազիւ կը տեսնուին: Կուշտ արիւն ծծելէն ետքը ոլոռի մը կամ լուբայի եւ կամ նաեւ մանր կաղնոյ չափ մեծ կ'ըլլայ եւ կապոյտ գոյն մը կ'առնու:


Այս տիգը մամուլ տակ, կամ տնկերու եւ թփերու վրայ կ'ապրի, եւ երբ մարդիկ կամ անասուններ՝ անտառներու եւ թփերու մէջ շրջագային կամ նստին, ասոնց վրայ ալ կ'ելլէ: Իւր կնճիթովն մարթի մէջ խորունկ կը մտնէ եւ արիւն կը ծծէ: Բռնութեամբ գուրս չ'ելլեր, գլուխը կը կտրի մորթին մէջ կը մնայ եւ չարակեղ վէրքեր կը բանայ: Կամ պէտք է փորելով գուրս հանել եւ կամ վրան ձեթ քսել, ասով կը սատկի եւ ինքն իրեն կ'իյնայ: Տաք երկիրներ՝ խոտ վտանգաւոր տղի եւ ուրիշ բաշխերու տեսակներ կան: Ախարներու տիգը Բոսնիայի կ'անուանուի:



Պտկ. 434. Հասարակ տիգ: անօթի. Բ. արիւն ծծած:

276. Ախար կամ Պանրաբաշխ (Acarus Siro) մանր կենդանի մըն է, պանրի կեղեւին ճեղքերուն եւ խողովներուն մէջ ճերմակ փայ-

լուն կէտի մը կը նմանի եւ շատ դժուարաւ կը նշմարուի: Մանրագէտի տակ՝ դեղնագոյն ճերմակ, հաւկթածեւ մարմնոյն վրայ խողանաձեւ մազեր, չորս զոյգ ոտք եւ ծծելու կնճիթ մը կը նշմարուի:



Պտկ. 435. Պանրաբաշխ (շատ մեծ):

Պտկ. 436. Ծետուկ (շատ մեծ):

Այս ակարը շատ անգամ հին պանրի մէջ ահագին բազմութեամբ կ'ըլլայ եւ վերջապէս այս պանիրը փոշի կը դարձնէ: Նոյնպէս հին թղբ-րու, չոր սալորներու, ալիւրի եւ ասոնց նման ուրիշ ուտելի բաներու մէջ ալ ասոր նման բաշխեր կը գտնուին: Նոյնպէս ջրոյ մէջ, ինչպէս նաեւ զանազան տնկոց եւ անասնոց, մինչեւ նաեւ մարդկան վրայ ալ զանազան մարմնոյ հիւանդութեան ատեն, բաշխեր կը գտնուին: Վերջէններուն կարգին տակ կ'երթայ Ծեփ-ի կամ Բռնիչ-ը (Sarcoptes scabici), որ մերթի մէջ բարակ ճամբաներ կը բանայ եւ զազերի ուռէցքներ եւ քոս կը պատճառէ եւ կը տարածէ:



ԳԼՍ Գ. ՀԱԶԱՐՈՏԵԱՆՆԵՐ (Myriapoda)

Հազարաթեաններն՝ իրենց բազմաթիւ ոտուրներէն առած են իրենց անունը, ըստ որում մարմնոյն ամէն մէկ օղակին վըայ մէկ կամ երկու զոյգ ոտք ունին: Երկու բողկուկ, խածնելու յարմար բերնի մասունք ունին, եւ միջատներու պէս շնչահան խողովակներով շունչ կ'առնուն: Բայց ոչ թեւ ունին եւ ոչ ալ փոփոխութիւն կը կրեն եւ իրենց բազմաթիւ օղակներուն համար միջատաց թրթուրներու կամ կարկիւնոսներու կը նմանին: Մինչեւ հիմայ 3000 տեսակ ճանչցուած է. 2 գլխաւոր կարգի կը բաժնուին:

ԿՍՐԳ 1. ՕՉԱՍԱՆԴՐՆԵՐ (Chilognatha)

277. Հասարակ օյաասանդրը կամ ցողկը (Scolopendra forcicata) երկայնաձեւ բարակ եւ տափակ մարմին մ'ունի, որ 17 օղակներէ կը կազմուի, եւ 15 զոյգ ոտք ունի: Գլխուն վըայ ըստ բաւականի երկայն բողկուկներ՝ շատ մանր աչուրներ եւ խածնելու ամուր պքցաններ




Պտկ. 437. Հասարակ Օճասանդր (1/2) եւ քերանը (քիչ մը մեծց.):

ունի: Ոտքերուն առջեւի մէկ զոյգն պքցանի փոխուած է, իսկ երկրորդ զոյգը՝ որ առաջինէն աւելի մեծ է, սնամէջ է եւ թոյնի փամփշտի մը հետ հաղորդակցութիւն ունի: Կոնակի կողմը կարմրագոյն մուրթ գորշ, իսկ տակը՝ աւելի բաց գունով է:

Շատ արագաշարժ կենդանի մըն է, մուրթ եւ խոնաւ տեղեր, տերեւներու տակ, ծառերու կեղեւներու եւ փտտած փայտի մէջ կը պահուրտի եւ պզտիկ միջատներու գարանամուտ կ'ըլլայ: Բռնուած առեն խածնելու կը ջանայ, բայց իւր խածուածքը միայն պզտիկ անասնոց վնասակար է: Շատ անգամ տներու մէջ պատերու վըայ գիշերը կը տեսնուի. այս զաղէր կենդանիէն շատ կը վախնայ ռամիկը:

Տաք երկիրներ այնպիսի օձառանգրի մեծ տեսակներ կան, որ իրենց խայ-
թուածքովը կրնան կարիճի մը պէս վտանգաւոր ըլլալ: Այսպիսի վտան-
գաւոր տեսակներէն մէկն է՝ հոս նկարուած Միտ օյսանդրը (Scolopendra



Պտկ. 438. Միտ օձառանդր (Ք. մ.):

morsitans) որ 20 զոյգ ոտք ունի: Արեւելեան Հնդկաստան մինչեւ 0-25 հրժ.
երկայն կ'ըլլայ: Կ. Պոլսոյ կողմերը մանաւանդ գեղերը շատ կը գանաւի այս
տեսակէն:

ԿԱՐԳ 2. ՀԱԶԱՐՈՏՈՒԻՆԵՐ (Chilopoda)

278. Անմեղ հազարոտուին (Julus terrestris) գորշ գունով կ'ըլ-
լայ. կոնակին վրայ երկու հաս գեղին երկայն շերտեր ունի եւ գլա-
նաձեւ է: Մարմնոյն ամէն մէկ
օղակին վրայ երկու զոյգ կարճ
ոտուրներ կան, ընդհանրապէս
շատ անգամ 90 զոյգ ոտքէն
աւելի կ'ունենայ:



Պտկ. 439. Անմեղ հազարոտուի (Ք. մ.):

Անմեղ հազարոտուին քարերու տակ սատկած միջատներով կ'ապրի:
Դպչելուդ պէս կը կլորի եւ գեղին գունով ժանտահոտ հիւթ մը գուր-
կու տայ: Բուրբուրին անվնաս կենդանի մըն է:



ԴԸՍ Դ. ԽԵՅԵՄՈՐԹՆԵՐ (Crustacea)


Խեղեմորթները կամ Կարկնոսները ողորմաբար, անթեւ, յազաւոր կենդանիներ են, առնց մարմինը կրային, եղջերեայ պատենով՝ իսկ ոմանցը թաղանթով ծածկաւած է, երկու մինչեւ չորս բաղկուկ եւ առաւ կամ ասելի ոտք ունին: Խաւկներով շունչ կ'առնան, եւ մարմնոյն ժանձկ օդակին վրայ՝ նոյն իսկ փորին եւ պոչին վրայ, անդամներ ունին: Խեղեմորթներն արաւոքայ կարգի բաղմաւածակ են (ցարգ 20.000 ճանչցուած է), այլեւայլ կարգերու կը բաժնուին:

ԿԱՐԳ 1. ՏԱՄՈՏԵԱՆՆԵՐ (Decapoda)

Աձնէն կատարեալ խեղեմորթներն են, 3 ցեղի կը բաժնուին:

ՏԵՂ Ա. ՄԻԿՐՈՍԿՈՍԿՈՍԿԱՆԵՐ (Macrura)

279. Գետալիս իւնգվէտիւնը (*Astacus fluviatilis*) պատած է կարծր պատենով մը, որ անասնոյն կենդանի եղած տանը թխագոյն կանաչ՝ իսկ եթէ տաք ջրով խաշուի պայծառ կարմիր գոյն մը կ'առնու: Գլուխն ու կուրծքը միայար թաւած են, եւ միմիայն պատենով մը պատած: Գլուխն՝ երեքանկիւնի փշով մը կը վերջանայ: Աչուրները՝ շարժական, մեծ, բաղադրեալ եւ կոթոռի մը վրայ հաստատուած են: Խոզանի նման արտաքին բողկուկները՝ պարզ եւ շատ երկայն են, իսկ ընդհանրապէս երկու ներքիններն՝ որ բարակ դերձանի ձեւն ունին, շատ կարճ են: Գլուխու եւ կուրծքին վարի կողման վրայ 6 զոյգ կզակաձեւ ոտք (կզակոտն եւ ոչ՝ ոտնաթնոտ), եւ 5 զոյգ բուն ոտք ունի, որոնց առաջինին ծայրը մեծ մկրտաներ կան եւ կ'անուանուին կզակոտն: Փորը




Պտկ. 440. Գետալիս իւնգվէտիւն (փոքր կողմանէ նկատուած) (1/2):

կամ պոչին մասը՝ երկայնաձիգ է, յայտնի յօգերով յօգաւորուած եւ տակի կողմը կարճ ոտուկներ կան, իսկ ծայրը հողմահարի պէս տարածուած լողարան ունի:

Գետային խեցգետինը գետերու, առուակներու, փոսերու եւ աւազաններու մէջ կ'ապրի, ցրեկը՝ եղերքի մօտ ծակերու մէջ, քարերու տակ, կամ ծառոց արմատներու մէջ կը պահուի: Գիշերը՝ դէպ ի ետեւ թիւալարելով ասդին անդին ազատ կը քայլէ կամ կը լողայ եւ ձուկ, գորտ, խղունջ, որդ եւ ուրիշ նման կենդանի կամ սատկած մանր անասնիկներ կ'որսայ: Յուլիսին եւ Օգոստոսին հին պատեանին տակ ուրիշ նոր մը կը կազմուի. նոր պատեան փոխած խեցգետինները շատ փափուկ կ'ըլլան:

Անմիջապէս բերնին տակն է ստամոքսը, որուն մէջ կրային շեղ շերտեր կան. պատեանը փոխուելէն յառաջ կէս ոլուի մեծութեամբ կիր կը բովանդակէ. այս կիրը՝ «խեցգետնի քար», կամ աչք կ'անուանուի. պատենափոխութեան ատեն՝ այս անասնոյն ստամոքսն ու աղիքներն ալ կը փոխուին: Նաեւ եթէ բողկուկներն ու մկրատները կտարին, քիչ ժամանակուան մէջ անոնց տեղ նոր կը բուսնի: Խեցգետինները կ'որսացուին թէ՛ ձեռքով, եւ թէ՛ մանաւանդ ցանցերով, որոնց մէջը իբր խայծ սատկած ձուկ կը գրուի եւ այսպէսով կը հրապուրուին: Բէ չունեցող ամիսներուն մէջ (Մայիս, Յունիս, Յուլիս, Օգոստոս) ամէնէն աւելի համեղ կ'ըլլան: Խեցգետինները մառաններու մէջ դալար եւ կանանչ եղիճներու մէջ երկայն ատեն կրնան պահուիլ: Յայտնի է թէ Եւրոպայ շատ տեղ գետերու մէջ մասնաւոր կը բուծանեն այս գետային խեցգետինը:


Նշանաւոր խեցգետիններէն է՝ ծանօթ Ա֊գոլո֊ը կամ Ծոլո֊ իեց֊ փեթի (Homarus vulgaris), որ շատ անգամ 5—6 քիլոգրամ ծանր



Պտկ. 441. Աստակոս (1/2):

կը կշռէ: Պատեանը՝ մութ գորշ գունով խայտախարիւ է, նոյնպէս խաշելէն ետքը կարմիր գոյն մը կ'առնուի:

Շատ անուանի են Բոսփորի աստակոսները: Ագրիական ծովն ուրիշ պղտիկ տեսակ մը աստակոս կայ, որ (իտ. Scampo լատ. Nephrops norvegicus) կ'ըսուի եւ բուն աստակոսէն աւելի շատ կ'ըլլայ: Միջերկրական ծովուն մէջ՝ մանաւանդ Չմիւռնիոյ ծոցը, նոյնչափ մեծութեամբ



Պտկ. 442. Ժովախաունիծ (1/2):


Եւ նոյնչափ յաճախութեամբ կը գտնուի Ծովոյ խորի (Ծովախաունիծ) կամ Կարգ-ը (Palinurus vulgaris), որ այս ծովուն ամենամեծ համով խեցգետիններէն մէկն է, բաց մկրատներ չունի:

ՑԵՂ Բ. ԿԻՍՏԳԻՆՆԵՐ (Anomura)

280. Փագուր-ը (տձ. փառ-ուր-էա ըսուածը) (Pagurus Bernhardus) կակուղ եւ թերաճ փոր մ'ունի, անոր համար խղունջի սնամէջ պատեաններու մէջ կը մտնէ: Ոտուքներուն առջեւի զոյգը մկրատներ ունի. աջ կողման մկրատը ձախակողմեանէն միշտ աւելի մեծ է, չորրորդ եւ հինգերորդ ոտքի զոյգը կարճ է:

Փագուրները խղունջներու եւ խեցիներու նետուած կամ սնամէջ պատեաններուն մէջ պինդ կը կպչին, միշտ մէկտեղ կը կրեն, միայն երբ

մեծնան եւ պատեանն իրենց պզտիկ գայ, այն ատեն կը փոխեն եւ ուրիշ աւելի մեծ ամաններ կը փնտռեն: Այնպէս խորունկ կը մտնեն այս




Պտկ. 443. Փագուր (Բ. մ.):

Վերին բոլորովին պատեանէն դուրս ելած է, վարը աջակողմը՝ կենդանին բայտովին պատենին մէջ քաշուած է, իսկ ձախ կողմը՝ պատեանով կը սողայ կենդանին:

պատեաններու մէջ, որ միայն բողկուկներն եւ աւջեւի ոտուկները դուրս կը մնան, եւ բռնութեամբ դուրս չեն կրնար հանուիլ, վասն զի իրենց պոչովը պատեանին կը փաթթուին:

ՅԵՂ Գ. ԿՐՈՃԱԳԻՆԵՐ (Brachyura)

281. Հասարակ խաչափառ կամ Բոռն կարկինսոր (Carcinus Maenas). լայնութիւնն ու երկայնութիւնը նոյն է: Գլխուն եւ կուրծքին հաւկթաձեւ պատեանը՝ տափակ եւ կանանչ մոխրագոյն է եւ վրան մանր մանր հատիկներ կան: Փորը կարծ եւ վարի կողմը դէպ ի ներս գարձած է: Բողկուկները կարծ են, հինգ զոյգ ոտուկներուն վերջինը՝ տափակ եւ քիչ մը մազոտ է:




Այս խաչափառը շատ լաւ կը լողայ եւ Եւրոպայի ծովեզերքը՝ բայց ի մասնաւորի Ազրիական ծովու մէջ ահագին բազմու-

Պտկ. 444. Պարկածեւ խաչափառ (Բ. մ.):


Թեամբ կ'ըլլայ: Գլխաւորաբար Վենետիկ քաղքին համար կարեւոր վաճառք մըն է. կէս մը կ'ուտեն կէս մըն ալ հրձուկ բռնելու համար իբրեւ խայծ կը գործածեն: — Հիւսիսային ծովուն Պարկայե- խաչ-տա-րը (Cancer pagurus) ալ վերինին կը նմանի, բայց երբեմն մինչեւ 1 ոտք լայն կ'ըլլայ:

282. Հասարակ ծովասարդը (Maja squinado) միայն արտաքին տեսքովը կը տարբերի առաջին տեսակէն:



Պտկ. 445. Հասարակ ծովասարդը (1/2):

Գետերու եւ լճերու մէջ ալ քանի մը տեսակներ կ'ապրին, ինչպէս հարաւային Եւրոպայի Գեփային խաչ-տա-րը (Thelephusa fluviatilis), իսկ ոմանք ալ ցամաքի վրայ խոնաւ անտառները կ'ապրին, եւ ամէն




Պտկ. 446. Տուրլուրու:

տարի խմբովին շիտակ ուղղութեամբ ու կարգով ծով կ'երթան իրենց ձուերն ածելու, ինչպէս օր. աղ. Անդիլեան խաչ-տա-րը կամ Տուրլու-րուն (Gecarcinus ruricola):

ԿԱՐԳ 2. ՍՐԱԳԻՆԵՐ (Xiphura)

283. Նեփաֆին կամ Մոլո-կիեան խեցգետինը (*Limulus mollicanus*). Կոնակին վրայէն՝ երկմասնեայ վահան մը մարմնէն դուրս երկն-



ցած է: Վահանին մահիկաձեւ առջեւի մասին վրայ երկայնութեան՝ 3 սրածայր անկիւններ կան. ամէն մէկ անկեան վրայ մեծ ու բաղադրեալ աչք մ'ունի, իսկ միջին անկեան վերի կողմը 2 հատ կիտաձեւ աչքեր կան: Վահանին ետեւի կողման վրայ դաշտին ձեւով երկայն շարժական փուշ մը ունի: Բուն մարմինը զգալի կերպով փոքր է, 6 զոյգ մկրատաձեւ անդամներ ունի, 5 զոյգ ալ տեբեւակերպ խռիկներ:

Մոլուկիեան խեցգետինը դանդաղաշարժ կենդանի մըն է, եւ արեւադարձի ծովերուն՝ եւ գլխաւորաբար Հնդկաց Ովկիանոսին տղմերու մէջ լողալով կը սողայ: Շատ տեսակներ ունի: Իւր պոչին փուշը կ'առնուն սեւամորթներն եւ իրենց նետերուն ծայրը կ'անցընեն (ուստի ա-

Պտկ. 447. Նետազի (1/4):

ռեալ Նեփաֆի կամ Երֆի կ'անուանուի): Տեղացի բնակիչները թէ կենդանին եւ թէ ձուերը կ'ուտեն:

ԿԱՐԳ 3. ՕՂԱԿԱՆՈՐՆԵՐ (Arthrostraca)

284. Հասարակ Նեպո-կը (Գլորո-կ ճճի, Գիլաճճի) (*Oniscus asellus*) երկայն հաւկթաձեւ մարմին մ'ունի, գոյնը սեւ մոխրագոյն է եւ վրան



երկու կարգ բաց գունով կէտեր կան: Մարմինը՝ վերի կողմը գոգաւոր է, իսկ տակը՝ տափակ. 2 բողկուկ եւ 14 հատ կարճ, եւ հաւասարակազմ ոտուղներ ունի:

Գիշերային անասնիկ մըն է, անկային նիւթերով կը սնանի եւ խոնաւ տեղեր քարերու, փայտերու, ծաղիկ թաղարներու եւ ասոնց նման բաներու տակ կը բնակի եւ բոլորովին անմնաց կենդանի մըն է: Նեպուկներէն ոմանք բոլորովին կտր կ'ըլլան ուստի առեալ աւաթիկը Գլորո-կ ճճի անունը տուած է: Զբոյ եւ նոյն իսկ ծովու մէջ բազմաթիւ ջրային նեպուկներ կան: Նեպուկներէն ոմանք եւ ուրիշ քանի մը խեցեմորթ անասուններ՝ ձկերու եւ կէտազգիներու վրայ կպած կ'ապրին, Չիւ-շիւ (*Caligus*) անուամբ ծանօթ են:


Պտկ. 448. Նեպուկ (2 անգամ մեծ):

նեպուկներէն ոմանք եւ ուրիշ քանի մը խեցեմորթ անասուններ՝ ձկերու եւ կէտազգիներու վրայ կպած կ'ապրին, Չիւ-շիւ (*Caligus*) անուամբ ծանօթ են:


ԿԱՐԳ 4. ԱՆՈՑԵԱՆՆԵՐ (Apoda)

285. Խափկո՞ւր (Apus cancriformis) տափակ եւ թաղանթաւոր վահանակ մ'ունի կռնակին վրայ՝ իբր պատեան: Փորին վարի ծայրը 2 հատ երկայն խողաններ ունի, իսկ բազմաթիւ ոտուքներն ալ՝ տափակ ու լողալու յարմար մազմզոտ յօդուածներ ունին:

Անձնաս կենդանի մըն է, ծովերու մէջ բազմաթեամբ կը գտնուի. երբեմն իւր այս բազմաթիւնը շատ նշանաւոր է: Չուերը կրնան տա-



Պտկ. 449. Խոփկոտն (Ք. մ.):



Պտկ. 450. Նոխազակն (Կ/հ):

րիներով չոր տղմի մէջ մնալ, մինչեւ որ յարմար պարագայով դուրս ելնեն:

ԿԱՐԳ 5. ՓՆՋՈՑԵԱՆՆԵՐ (Cirripedia)

286. Նոխազակն (Lepas anatifera) բուն խեցւոյն պէս կրային պատեանով մը պատած է: Սակայն պատեանը՝ հասարակ խեցիներու նման երկու կտորէ բաղկացած չէ, այլ հինգ անհաւասար կտորներէ, եւ մսեղէն կոթունով մը յենարանի մը վրայ կպած կ'ըլլայ: Կենդանին անգլուխ եւ առանց աչքի է, պատեանին մէկ ճեղքուածքէն վեց զոյգ ոտք կ'երկնան, որոնց ծայրը եղջերեայ, յօդաւոր եւ մազոտ եզրներ կան (ասկէ առեալ կ'անուանուին ֆնջոպէան):


Այս զարմանալի կենդանին ամէն ծովերու մէջ խումբ խումբ ժայռերու, ցցերու եւ նաւերու վրայ կը գտնուի: Բայց միշտ հաստատուն կպած չ'ըլլար: Մահը եղած ատեն ազատ ասդին անդին կը լողայ եւ

պզտիկ խեցեւորներու կը նմանի: Ամենէն վերջը բանի մը վրայ կը կպչի եւ խեցւոյ տեսակ կենդանիներու կը փոխուի: Եւլանիդէ (Balaniidae) ըսուածներն ալ ճիշդ վերոյիշեալ կենդանւոյն կը նմանին. ասոնց գնդաձեւ պատեանը՝ ծովու առարկայից՝ նաեւ երբեմն կենդանի կէտերու վրայ կը կպչի կը մնայ:


ՎԱՐԳ 6. ՀԵՐՁՈՑՈՒԿՆԵՐ (Copepoda)

Ամենամանր խեցեմորթներու խումբը կը կազմեն, հազիւ կրնան ճշգիւ ստորագրուիլ, եւ սակայն խեցեմորթներու ամէն յատկութիւններն ունին: Ասոնց տակը կ'երթայ:

287. Միակահին (Cyclops quadricornis) որ ամէն հասարակ գետերու մէջ կը գտնուի. նշանաւոր է իւր մարմնոյն զարմանալի շէնքովը, ապրելու եղանակաւն եւ թուովը:



Պտկ. 451. Միակահին, ծախ կողմը՝ (Ք. մ.) նրկորորդը՝ (շատ մեծցուած) իսկ աջակողմանը (2 անգ. մեծց.):



Պտկ. 452. Զրալու (մեծց.): վերը (Ք. մ.):

Նոյնպէս Զրալու (Daphnia pulex)՝ որուն սխալմամբ Գրանձ անունը տուած են, զարդարուն խայտաբղէտ Կիւրիս (Cypris ornata) եւն, այս կարգին տակ կ'երթան:



Տ Ի Պ Ա Ր 4. Ո Ր Դ Ե Ր (Vermes)


Կենդանաբանութեան Դ. Կէպարը կը կազմեն որդերը, որոնցմէ 6150 տեսակ կը ճանչնանք. 4 գլխաւոր դասերու կը բաժնուին. այսինքն 1. Օղակաւոր որդեր (Annulata). 2. Բոլորակ որդեր (Nematelmia). 3. Տափակ որդեր (Platyelminthes) եւ 4. Մանրաշէն որդեր (Bryozoa):

Դ Ա Ս Ա. Օ Ղ Ա Կ Ա Խ Ո Ր Ո Ր Դ Ե Ր (Annulata)

Առաջին դասը կը բաժնուի 2 կարգի:

ԿԱՐԳ 1. ԽՈՋԱՆԱՒՈՐ ՈՐԴԵՐ (Chaetopoda)

288. Բոսոր կամ Երկրամայրը (*Lumbricus terrester*) գրչակալի հաստութեամբ, առջևի կողմը՝ սուր, գլանաձեւ, կարմրագոյն մարմին մ'ունի, որ 80—120 հաւասարաչափ օղակներէ կազմուած է: Մար-



Պատկ. 453. Բոսոր:

ա. Բոսոր (Բ. մ.). Բ. գլուխ՝ առջևի կողմանէ. Բ. գլուխը՝ կողմնակի. Դ. քանի մը օղակներ՝ որոնց վրայ 4—4 ական մազեր կան. Ե. խոզանաստեւ մը. Զ. Բ. Դ. Դ. (մեծց.) Ե. շատ մեծցուած:

մեջն առջևի կնճթաձեւ անդամին (գլխուն) տակն է՝ բերանը, աչք չունի, սակայն լուսոյ շատ զգայուն է: Մանրացուցով՝ ամէն մէկ օղակին վրայ ութ մազ (ոտք) կը նշմարուի: Մարմնին առջևի երրորդ մասին


օղակներէն ոմանք աւելի հաստ եւ աւելի լայն են, եւ Կօտի մը կը կազմեն:

Այս շատ ծանօթ որդը՝ խոնաւ տեղեր հողի տակ կ'ապրի, եւ գիշերը կամ կարճատեւ տեղատարափէն ետքը հողին երեսը կ'ելլէ:

Ջարմանալի կերպով հող կ'ուտէ, որուն հետ անկային եւ կենդանական ապականեալ նիւթեր խառն կ'ըլլան, շատ անգամ իւր ծակին մէջ յարգ, թղթի շերտեր, տերեւներ, փետուրներ եւ այլն եւ այլն կը տանի, որպէս զի հոն փոստին եւ իրեն կերակուր ըլլան: Իւր բազմաթիւ բնական թշնամիներն են. խլուրդ, ողնի եւ սրնայակ, յափշտակիչ, ճախնային եւ լողացող թռչուններ, գետնագորտ, սալամանար, ձուկ, գնայուն բզէզներ եւ օձառանդներ: Մարդիկ ալ շատ անգամ ի ղուր կը հալածեն զիսքը: Բոտոտները՝ ձմեռը հողին մէջ 1 մէտր խորունկ կը թաղուին:

ԿԱՐԳ 2. ՏՋՐՈՒԿՆԵՐ (Hirudinoidea)

289. Բժշկական ԿԿՐՈՒՄ (Sanguisuga medicinalis): Մարմինը տափակ կըրը է, առջեւի կողմը նեղ, դէպ ի ետեւն աւելի լայն, նշմարելի օղակներ ունի, բայց օղակներուն վրայ խողաններ չունի: Մարմնոյն



երկու ծայրերը տկաձեւ տափակ խողոցներ կան: Առջեւի մանր խողոցին մէջտեղն է՝ երեքանկիւնի բերանը, որ ծծելու յարմար է եւ ամուր ու ատամնաւոր կղակներ ունի: Մարմնոյն ետեւի կողման վրայ գտնուած խողոցը՝ տեղ մը կպած ատեն իբր յենարան կը գործածէ: Առնակը՝ ձիթապտղոյ կանանչ է, եւ վրան 6 հատ ժանկագոյն, սեւ բծերով երկայն շերտեր կան, փորը տափակ եւ կանանչագոյն դեղին է եւ սեւ բծերով:

Պտկ. 454. Բժշկական տղրուկ:


— Ամբող կենդանին (Բ. մ.). Բ. գլուխը՝ վերի կողմանէ (դիտուած) եւ աչուրները. Է. գլուխը տակի կողմանէ (դիտուած)՝ մտտ չըթաւններով. Դ. կոկորդը՝ մէջէն կտրուած եւ 3 ժանկուր կղակները (Բ—Դ. մեծց.):

Մնայուն ջրերու, խիկ երբեմն նաեւ վազող ջրերու մէջ կը գտնուի, եւ ձկանց, գորտերու եւ ուրիշ մեծամեծ կենդանեաց վրայ կպչելով անոնց արիւնը կը

ծծէ: Բայց Եւրոպա զգալապէս նուազած է թիւը, վասն զի արիւն առնելու համար արտաբոյ կարգի շատ կը գործածուի, եւ անոր համար շատ որսացած են: Եւրոպա ուրիշ տեսակ մըն ալ կը գտնուի Հասսերալի որդուկ (Sanguisuga officinalis) անուամբ, թէպէտ վերինին չափ գործածական է, բայց կը զանազանի առաջինէն իւր թխագոյն կանանչ կռնակովը, փորին վրայ ալ բիծ

շունի: Երկուքն ալ յատուկ աւազաններուն մէջ (տղկանոց) կը բուծանեն: Չուերով կ'աճին, այս ձուերը սպնդանման պատեանի մէջ փակուած կ'ըլլան, որ բոժոժի կը նմանի:

290. Փողորդաւոր (Serpula norwegica) կը բնակի գլանաձեւ, բոլորակ կրային խողովակի մը մէջ, որ նշանաւոր է իւր ոլոր մոլոր դարձուածքներով: Որդը՝ մարմնոյն առջեւի մասին վրայ ծիրանեգոյն կար-



Պտկ. 455. Փողորդուկ:

ա. Դուրս ելած կենդանին (Բ. մ.). բ. խռիկին ծայրը՝ առջեւէն նկատուած. գ. կողմնակի (մեծց.). դ. գլաններու խումբ, որոնց մէկուն մէջէն կենդանին դուրս կ'ելլէ (պզտիկց.):

միւր գունով խռիկի թելերէ կազմուած զարդարուն պսակ մ'ունի եւ ձագարի ձեւով բուն մը, որով խողովակի մէջ մտած ատեն այս խողովակը կը պատէ:

Եւրոպայի ամէն ծովերու մէջ կը գտնուի, եւ քարերու, խեցիներու եւ ուրիշ առարկաներու վրայ կպած կը մեծնայ:



ՊԸՍ Բ. ԲՈԼՈՐԱԿ ՈՐԴԵՐ (Nematelmia)

ԿԱՐԳ 1. ԹԵԼՈՐԴՈՒԿՆԵՐ (Nematodes)


291. Փորի որդը (*Ascaris lumbricoides*) փեարի մը կոթին չափ
Հաստութիւն ունի, գլանաձեւ է եւ երկու ծայրերը երթալով հաւա-



Պտկ. 456. Փորի որդ (Բ. մ.):

սարապէս կը բարակնայ, երբեմն բաց՝ եւ երբեմն մոլթ կարմիր գու-
նով կ'ըլայ: Քայլելու խողաններ չունի:

Ամէնէն շատ գտնուող փորոտեաց որդերէն մէկն է, եւ թէ մարդկան
եւ թէ բնական անասնոց բարակ աղիքներու մէջ կը գտնուի, բայց սովո-
րաբար մեծ փնաս մը չի պատճառեր, եւ շատ
գիւրաւ ալ գուրս կը թափուի: Մանկանց որդն
(*Oxyuris vermicularis*) ալ ասորնման՝ բայց շատ
մանր մէկ տեսակն է, շատ անգամ աղոց փորն
ահագին բազմութեամբ կ'ըլայ, եւ անախորժ
գրգռութիւն մը, եւ ուրիշ ցաւեր կը պատճառէ,
բայց հասարակօրէն ինքն իրմէ դարձեալ կ'ան-
հետանայ:



Ոչ թէ միայն աղեաց մէջ, այլ նաեւ մարդկան
եւ անասնոց մարմնոյն ուրիշ կողմերն ալ շատ մը
գլանաձեւ կամ թեյակերպ սրղերու բազմութիւն մը
կը գտնուի եւ վտանգաւոր հիւանդութեանց պատճառ կ'ըլայ: Օրինակի աղագու-
տաք երկիրներ չարանուն՝ Մեքսիկայի Բիւրոսի (Ֆիլարիա) (*Filaria medinensis*), չոր-
ցած աղիքի մը կը նմանի եւ մարդուն բազկի եւ սրունից մարմին տակ կ'ըլայ, եւ
երբեմն մահ կը պատճառէ: Զոր ատենները քանի մ'անգամ մարդու մարմնոյն
վրայ մանր որդ մը գտնուած է եւ Թրիչինի (*Trichina spiralis*) կը կոչուի: Ի սկզբան
անդ աղեաց խողովակներու մէջ ազատ կը շարժի այս որդը. բայց իւր ձագերը ա-
հագին մեծ բազմութեամբ փորոտիքը կը ծակեն, եւ իրենց բազմութեամբ շատ ան-
գամ վտանգաւոր հիւանդութիւններ՝ նաեւ մահ ալ, կը պատճառեն: Խոզի մեծ
մէջ կ'ըլայ սկզբնաբար:

Պտկ. 457. Մանկանց որդ:


... արու. ք. էգ. է. գլուխ
(շատ մեծց.):



ԳԼՍ Գ. ՏԱՓԱԿ ՈՐԴԵՐ (Platyelminthes)

ԿԱՐԳ 1. ԵՐԻՉՈՐԴԵՐ (Cestodes)

292. Նոսր բերելը կամ երեկոցի (Taenia Solium) երբեմն զարմանալի կերպով մինչև 6 մետր երկայն կ'ըլլայ: Իւր անունն առած է՝ տափակ, յօդաւոր մարմնէն, որ նեղ եւ միայն 0.004—6 հզմ. լայն



Պատկ. 458. Նուրբ երիզ:

— Կատարեալ աճած կենդանին, որուն պլակազմ յօդերէն միայն քանի մը հատը նկարուած է. բ. գլուխը. կրկին ճանկի պսակով եւ ծծակով (շատ մեծցուած). գ. գլուխ ելած սլորուն գլուխը. դ. քանի մը նեարդ որոնց մէջ 2 գլուխ կայ (բ—դ մեծց.):

երիզն կամ շղթայի կը նմանի: Ամէն մէկ յօդուածքը լայնութեան կըրկին երկայնութիւնն ունի: Այս յօդուածքներն դէպ ի գլուխն երթալով կարճ եւ նեղ են, եւ վերջապէս առանց յօդի վիղ մը կը ձեւանան, եւ ասոր վրայ կը հանգչի բոլորակ մանր գլուխը, որուն վրայ չորս հատ

ծծարան եւ 2 կարգ ճանկերէ կազմուած պսակ մը կայ: Գոյնը ճերմակի կը զարնէ:

Նուրբ երիզը մարդուս նրբաղէքներուն մէջ կ'ըլլայ, երբեմն ամենեւին ծանրութիւն չի տար, բայց շատ անգամ արտաքոյ կարգի ցաւ կը պատճառէ: Մասնաւոր գեղերով այս ալ ուրիշ փորոտեաց որդերուն պէս կը թափուի, սակայն հարկ է որ գլուխն ալ մեկտեղ ելլէ, ապա թէ ոչ միւս անդամները դարձեալ կը կազմուին ու կը բազմանան:

Նուրբ երիզը նախնաբար խողին ճարպին եւ մին մէջ կ'ապրի, եւ Փիկի- (Cysticercus cellulosae) կ'անուանուի, մանրուած հտաի մը մեծութեամբ է եւ ջրոյ սեւ պղպշակի կը նմանի, եւ ապագայ կազմուելու նուրբ երիզին գլուխն ասոր վրայ կը նշմարուի: Այսպիսի փինէս ունեցող խողին կարծր ապուխտն եւ ճարպն ուտուելով՝ այս որդը մարդուս աղիքին կ'անցնի եւ հմն ետքէն բուն նուրբ երիզը կը կազմուի: — Ռուսաստան, Լեհաստան եւ Հելլենասիա՝ մարդուն ընդերաց մէջ աւելի շատ կը գտնուի՝ Լատի երիզ (Bothriocephalus latius): Գլխուն վրայ ծծարան չունի եւ յօգերն ալ շատ կարճ ու լայն են: Կը կարծուի, որ գետին ջուրը խմելով եւ ձկանց փորոտեաց որդերն ուտելով ասոր մարդուս մարմնոյն ալ անցնին:

Ոչխարներու ըղեղին մէջն ալ՝ տեսակ մը որդ կայ որ Ընկերոյ (Coenurus cerebralis) անուամբ ծանօթ է, եւ այս կենդանեաց վրայ շրջմոյկի հիւանդութիւն յառաջ կը բերէ: Շան մարմնոյն մէջն ալ ուրիշ տեսակ մը կը գտնուի: Ընդհանրապէս փորոտեաց որդերը՝ զանազան կենդանեաց մէջ ապրելով իրենց մարմնոյն կազմածքն այնպէս կը փոխուի, որ չեն կրնար գրեթէ ճանչցուիլ:

ԳԼՍ Գ. ՄԱՄՈՒԱԶԵՆԻ ՈՐԴԵՐ (Bryozoa)

Այս որդերէն մինչեւ 1800 տեսակ ծանօթ է, շատ մանր եւ պարզ աչքը գրեթէ անտեսանելի որդեր են, ամէնէն մեծը 0.002 մինչեւ 4 հազարամկար մեծ կ'ըլլայ. ծովերու մէջ կը բնակին. գլխաւոր տեսակներն են Տերե-ակերպ Ժովակերպ (Flustra foliacea) եւ Փեպրայե-մադ-որդը (Alcyonella stagnorum) ըստածները:

ՈՐԴԵՆՑ ՎՐԱՅ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԻՏԵԼԻՔ

Որդերէն ոմանք ոպերակ, իսկ ոմանք ալ կարելի ցո-րոյ արեւն ունին, ոտք չունին. ջրոյ, տղմի կամ խոնաւութեան մէջ կ'ապրին, իսկ ոմանք կենդանեաց եւ մարդու աղեաց մէջ:



ՏԻՊԱՐ 5. ՓՇԱՄՈՐԹՆԵՐ (Echinodermata)

Կենդանաբանութեան հինգերորդ պի-
պարը կը կազմեն փշամորթները: Մինչեւ հի-
մայ 3000 տեսակ ճաչցուած է: Չորս դասի
կը բաժնուին:

ԴԱՍ Ա. ԺՈՎԱԳԼԱՆՆԵՐ (Holothurioidea)

293. Ուրեղե Ծովագլանը (Holothuria
edulis) եւ ասոր նման 200 տեսակները որդի
կը նմանին, իրենց կողերու վրայ ճառագայթի
բուներ ունին, ամէն տեղ ծովերու մէջ կը
գտնուին: Հնդկաց Ովկիանոսին մէջէն բազմու-
թեամբ կը ժողվեն կը չորցընեն եւ Տըւէյանգ
անուամբ աննդարար կերակուր կ'եփեն:

ԴԱՍ Բ. ԺՈՎՈԶՆԻՆԵՐ (Echinoidea)


294. Ուրեղե Եփնոսը կամ Ծովուշ-
նին (Echinus esculentus) գրեթէ բոլորեցի
մը չափ մեծ կ'ըլլայ, եւ մէկ կողմը տափակ-
ցած՝ կապուտակագոյն փշոտ գնդակի մը կը
նմանի: Մարմնոյն տակի տափակ կողման վրայ
իբրեւ բերան լայն ծակ մ'ունի, որուն մէջ կայ բրգաձեւ կրային 5 ա-
կոաներով շատ կատարեալ ծամելու գործարան մը, որ «Արիստոտելի
լապտեր», կ'անուանուի: Բերնին հակառակ կողմը՝ գագաթին վրայ,
5 մանր ծակեր կան եւ ասիկա է՝ սրբանը: Ամբողջ մարմինը կրային



Պտկ. 459. Ծովագլան (Բ. մ.):

ամուր պատեանով մը պատած է, որուն վրայ կան բազմաթիւ կանոնաւոր, քառակուսի դրուագներ եւ 10 կարգ բարակ ծակեր, որոնցմէ դուրս կը ցցուին տարածական խողովակիկները (թթալ կ'անուանուին): Այս ծակերուն քովերը՝ պատեանին մանր ուռէցքներուն վրայ կանոնաւոր շարքով նոյնչափ թուով՝ շարժական փշեր կան, որոնք սովորաբար 0.02—3 հրժ. երկայն կ'ըլլան:

Այս եքինոսն (եւասոր բազմաթիւ տեսակները)՝ Եւրոպայի բոլորտիքն եղած ամէն ծովերու մէջ կը գտնուի: Իւր բազմաթիւ ոտից եւ շարժական փշերուն օգնութեամբ ծովուն յատակը կամաց կամաց կը սողայ: Գարունը կարմրագոյն ձուարանին համար այս կենդանին շատ կ'որսան եւ կ'ուտեն: Այս ձուերէն նախ եւ յառաջ թրթուրներ կ'ելլեն, որոնք երկայն ժամանակէ ետքը հազիւ եքինոսի կերպարանք կ'առնուն:



Պտկ. 460. Ծովագնի:

(ձախ՝ փշերով եւ ոտուքներով ծածկուած, մէջտեղը՝ բերանը):


(կողմնակի կերպարանքը Բ. մ.) (մէկ կողման փշերը վերցուած են):

Ստուգուած է թէ եքինոսին վրայ քսան կարգի բաժնուած 440 քառակուսի դրուագներ կան, 2385 ուռէցքներ եւ նոյնչափ փուշ 2400 ծակ եւ 1200 ոտը: Քարա-աղաջի ձկնարաններուն մէջ ալ շատ կը գրտնուի այս կենդանին:



ԳԼՍ Գ. ԺՈՎԱՍՏՂՆԵՐ (Asteroidea)

295. Կարմրագոյն ծովաօդը (*Asterias rubens*) տափակ՝ հինգ ճառագայթի բաժնուած աստղաձեւ մարմին մ'ունի: Կոնակը՝ հաւասարաչափ կարծ, կոծիծի նման պտկունքներով ծածկուած է: Մարմնոյն բոլորափքն երկու կարգ շարժական փշեր կան: Փորի կողման մէջտեղն



Պտկ. 461. Կարմրագոյն ծովաօդը:
Կոնակի կողմանէ. տակի կողմանէ ($1/2$):


է բերանը, որմէ ելած խորունկ ափսիկները նիզակաձեւ ճառագայթներով կը վերջանան: Այս ափսիկներուն մէջ 2 կարգ շարժական ոտքեր կան, որոնք գուրս կ'երկննան, բայց ծծակ չունին: Կենդանի անասնոյն գոյնը՝ կարմրագոյն է, իսկ չորացած վիճակի մէջ մութ սպիտակ է:

Այս եւ ասոր նման Նորլանդոյն ծովաօդը (*Asterias aurantiaca*)՝ Եւրոպայի ափէն ծովերը կը գտնուին: Այս կենդանիները՝ որչափ ալ գոլորտաբաժնեք եւ անճարակ երեւան, սակայն եւ այնպէս ճառագայթաձեւ թեւերով ծովու յատակի քարերուն մէջէն ըստ բաւականի դիւրաւ կը քալեն, որովհետեւ իրենց պատեանին վրայի կրային քառակուսի դրուագներն իրարու մէջ շարժական են: Ծովաստղին կրային քառակուսի դրուագները 11.000ի չափ համրուած են:



ԴԱՍ Գ. ՁԱՐԱՍՏՂՆԵՐ ԿԱՄ ԺՈՎԱՇՈՒՇԱՆՆԵՐ (Crinoidea)

Այս դասու կենդանիներու տեսակներն (600ի չափ) հին աշխարհի կենդանիներ են. իսկ հիմայ հազիւ 40 տեսակ կ'ապրի: Բաժակաձեւ կամ գնդաձեւ կենդանիներ են. միշտ կրային կոթունով մը տեղ մը կ'ապրին: Գլխաւորներն են:



Պտկ. 462. Գլուխ Մեդուսայ:

Միջբերանի Ձառանգ (Comatula mediterranea) եւ «Գլուխ Մեդուսայ», (Caput Medusae) ըստաճները:

ՓՈՎՏՈՐԹՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ ԸՆԳՀԱՆՈՒՐ ԳԻՏԵԼԻՔ

Փլաճայնիկն իրենց մարմնոյն վրայ բազմաթիւ կրային դրուագներ ունին, որոնք կամաց կամաց անշարժ պատեանի կը փոխուին: Կզակաձեւ ոտքեր (ձգալիկ) ունին, զորոնք կրնան դուրս երկնցընել: Այս կենդանիները պզտիկ եղած ատեն փոփոխութիւն մը կը կրեն:




ՏԻՊԱՐ 6. ՏԿԸՆԴԵՐՔ ԿԱՄ ԱՆԱՂԻՔ (Coelenterata)

Վեցերորդ Կիսաբնակը կը պարունակէ այնպիսի կենդանիներ, որոնք թէ ստամոքսի, թէ աղիքի, եւ թէ արեան անօթներու տեղ՝ մի միակ տկանման խողով մ'ունին: 8000 տեսակ ճանչցուած է ցարդ: Երեք Կասի կը բաժնուին:

ԴԱՍ Ա. ԺՈՎԱՄԱՅՐԵՐ (Medusae)

296. Բոն թովամայրը կամ Աւրելա-որ (Aurelia aurita)
խորունկ սկաւառակի կամ սունկի նման մաղասային նիւթէ մարմին մ'ունի:




Պտկ. 463. Բոն թովամայր (Դ):

Ցակի կողման մէջտեղն է բերանը, որուն բոլորտիքը չորս հատ բռնելու երկայն բազուկներ ունի, իսկ մարմնոյն չորս կողմը բազմաթիւ, վար կախուած՝ բայց միայն կտրճ թելեր կան: Կենդանւոյն գոյնը՝ կարմիր:

կը զարնէ, թափանցիկ է, եւ շատ մը ճերմակ կէտեր ունի, իսկ ներքին կողմը մանուշակի պէս կը շողայ:

Այս ծովամայրն Եւրոպայի բոլորտիքն եղած ծովերն՝ եւ ի մասնաւորի Հիւսիսային եւ Արեւելեան ծովերը շատ կը գտնուի: Մտադրութեան արժանի է ոչ թէ միայն իւր մարմնոյն զարմանալի կազմութեանը համար, այլ նաեւ իւր արտաքոյ կարգի նշանաւոր փոփոխութեամբը:


Առօր նման ծովամայրի բազմաթիւ տեսակներ կան, օրինակի աղաքաւ Գիլերլուսի թուր (Pelagia noctiluca) եւ Հասարակ Տակիթուր



Պտկ. 464. Տակքերան (ալգոսիկց.):

(Rhizostoma Cuvieri). մղոններով ծովուն երեսը կը ծածկեն եւ նաւագնաց ուղղորդներուն շքեղ տեսիլ մը կը ներկայացընեն. վասն զի ցերեկը գեղեցիկ գոյներով կը փայլին, իսկ գիշերը պայծառ լուսաւորութիւն մը կը տարածեն: Զմիւռնիայի ծովախորշը շատ կը գտնուին այս երկու տեսակներն ալ: — Երբեմն ծովախորշի մը մէջ հազարներով՝ նաեւ միլիոններով կը գտնուին, այնպէս որ նոյն իսկ նաւակ մը շատ դժուարաւ կրնայ յաւաքանալ: Երբեմն ծովու ջրէն ծովեզերք՝ աւազի

վրայ կը մղուին եւ հոն կը մնան: Մեծամեծ ծովերու մէջ երբեմն անհաւատալի մեծութիւն կ'ունենան. օր. աղ. 2 մէտր տրամագծով ծովամայր մը տեսած է Ճանապահորդ մը Ովկիանոսի մէջ, այս կենդանւոյն վարսը 33 մէտրի չափ երկայն էր եւ թափանցիկ մազերու փունջի մը պէս հանդարտ ջրոյ մէջ կը տեսնուէր: Աւելի զարմանալի է այն յատ-



Պտկ. 465. Գիշերլուսիկ թոքը կը լողայ (պզտիկց.):


կութիւնն՝ որ այս վարսերուն մէջ եւ անասնոյն ձեռաց մէջ մանր ձկերու ձուեր կը մնան եւ կ'աճին, եւ անասունը չ'ուտեր այս ձկերը. կան ձկնակեր քանի մը տեսակներ, բայց ընդհանրապէս բնապատումներէն ոմանց ըսածը՝ թէ ձկով կ'ապրին ծովամայրերը, հաստատուած չէ: Մինչեւ հիմայ 6000 տեսակ ճանչցուած է:

Ծովմայրերէն ոմանք յատկութիւն մ'ունին, որ մէկը զիրենք շոշափելուն պէս, եղիճի պէս ուռեցքներ եւ վերջի աստիճանի բորբոքում կը պատճառեն: Լողացողները գիտեն կենդանւոյն այս յատկութիւնը եւ մեծապէս կը զգուշանան ձեռքով աչքերը շոշափելէ: Միայն որոշ ատեններ՝ սովորաբար ամառուան ամիսները ծովու երեսին վրայ կ'երեւան եւ շատ անգամ անմիջապէս անհետ կ'ըլլան:

Սակայն ծովային այս զարմանալի եւ գեղեցիկ կենդանիները չեն կրնար պահուիլ, վասն զի իրենց կակուղ եւ ապակիի նման փայլուն մաղասէ մարմինը՝ օդի մէջ շուտ մը հեղուկ կ'ըլլայ եւ գինւոյ ոգիին մէջ ալ այնպէս կը փոխուի որ չի կրնար ճանչցուիլ: 10 քիլոգրամ կշռող ծովամայր մը՝ չորնալէն ետքը հազեւ քանի մը տեքագրամ կը կշռէ:

297. Մոխրագոյն Հիդրան (Hydra grisea) տկանման գլանաձեւ փափուկ մարմին եւ մէկ բերան ունի: Այս բերնին բոլորտիքը 4—10 երկայն բազուկներ կան, որոնք եղիճի պէս փուշերով ծածկուած են, հիդրան ասոնցմով ջրային մանր կենդանիներ կ'որսայ, կը սատկեցընէ եւ

բերանը կը տանի: Այս հիդրան կատարեալ մեծնալէն ետքն ալ հազիւ 0.008—24 հզմ. երկայն կ'ըլլայ, բազուկները քիչ մ'աւելի երկայն են, եւ ըստ կամի կրնան դուրս երկննալ կամ ներս քաշուիլ:



Պատկ. 466. Մոխրագոյն հիդրա եւ Գորշ հիդրա:


(Աջ կողմը՝ բնական մեծութեամբ, ձախ քիչ մը մեծց.):

Հիդրան՝ մնայուն ջրերու մէջ՝ սովորաբար ջրային տնկոց, իսկ ի մասնաւորի ջրային ուղ ըստւածներուն վրայ կպած կ'ըլլայ եւ բազուկները տարածած՝ իւր որսին դարանակալ կ'ըլլայ: Աէս մը ձուերով կ'ածի, կէս մըն ալ իրեն յատուկ եղանակաւ, այսինքն՝ մարմնոյն երկու կողմը կոկոններ կ'ելլեն, որոնք կամաց կամաց նոր անասուններ կ'ըլլան եւ ամէնէն վերջը կը բաժնուին: Հիդրաները շատ սովուն կեանք ունին. մարդ կրնայ զանոնք ուզածին պէս կտոր կտոր ընել, բայց դարձեալ չեն սատկիր. ընդհակառակն այն կտորներէն նոյնչափ բազմաթիւ կատարեալ կենդանիներ կ'ելլեն: Հիդրաներն արտաքոյ կարգի շատակեր են, մանր միջատներու թրթուր, խեցեմորթ եւ այլն եւ այլն կ'ուտեն, զորոնք նախ իրենց եղիծի պէս գործարաններով կը սատկեցընեն եւ կը կլլեն: — Մէկ տեսակն է Գորշ հիդրան (Hydra fusca):



ԴԱՍ Բ. ՊՈՂԻՊՆԵՐ ԿԱՄ ԺԱՂԿԱԿԵՆԴԱՆԻՔ (Polypi կամ Anthozoa)

298. Գորշ Ժովապուտ (Actinia mesembrianthemum) գլանա-
ձեւ կակուղ մարմին մ'ունի, բերնին չորս կողմը շատ մը՝ պարզ, սնա-
մեջ, ներս քաշելու բազուկներ կան: Կենդանին իւր տակի սկաւառա-
կաձեւ կողմովը քարերու կամ ուրիշ առարկաներու վրայ կը կպչի եւ






Պտկ. 467. Ժովապուտ (Դ/):

ա. Հաստեղջիւր ծովալարդ (Tealia crassicornis). բ. Սագարա պրի (Sagartia vi-
duata). գ. Ամփոփուած ծովալարդ. դ. Մակաբոյծ Սագարա (Sagartia parasitica)
ձկնականջի վրայ. ե. Վարդակարմիր Սագարա (S. rosea). Ղ. Դովամեխակ (Acti-
nobola dianthus). ի. Կանանչ ծովալարդ (Anthea cereus). լ. Ծովապուտեր (Ac-
tinia effoeca):

ուղածին պէս կրնայ ամփոփուիլ կամ տարածուիլ: Եթէ տարածուի՝
վերի մասը շատ անգամ 0.07 — 10 հրժ. լայնութիւն կ'ունենայ եւ
բազմաթերթ բացուած ծաղկի մը կը նմանի:

Ծովապուտան ամեն ծովերու մէջ կ'ապրի եւ կրնայ սողալ եւ ուզած տեղը հաստատուն կ'աշիւ: Մանր ծովային կենդանիներով կը սնանի, շատ անգամ գեղեցիկ գոյներով կը փայլի եւ շատ նշանաւոր է իւր կենաց տեւողութեամբ: Ծովապուտերէն ոմանք՝ ծովային թռչերու եւ հիգրաներու պէս եղիճի այրիչ գործարաններ ունին:

Ուրիշ նշանաւոր պողիպներն են. կարֆի Ծովագարիկը (*Pennatula rubra*), եւ Սկիագղը (*Fungia agariciformis*):



Պտկ. 468. Ծովափետուր ($\frac{1}{2}$):

Ամբողջ մէկ կտորը:

Պտկ. 469. Մակասող (P. մ.):


... վերէն՝ Բ. կողմնակի՝ Գ. տակէն նկատուած:

299. կարֆի Բոսպոր կամ Ազնի-կորաղէտը (*Corallium rubrum*) ճիւղաւոր բուներ ունի, որոնք ներքուստ քարի պէս կարծր, խիստ կարմիր են, իսկ արտաքուստ սպիտակ թանձր կեղեւով մը պատած են: Կեղեւին վրայ շատ մը սնամէջ բշտիկներ կան, որոնց մէջ կենդանիները՝ այսինքն մանր պողիպները, կը բնակին: Կենդանին կաթի պէս սպիտակ է, ութ հատ տերեւի նման, բարակ ակուններով բռնելու ձեռքեր ունի, եւ բացուած ատենը ճերմակ ծաղկի կը նմանի: Ոչ թէ միայն արտաքին մաստ կեղեւը՝ որ չորնալէն ետքը դիւրաւ կրնայ վրայէն քերուիլ, այլ


Մադրեպորա կամ
Մադրեպորա (Madrepora
prolifera) ծառի պէս ճիւղա-
ղաւորեալ բուն մ'ունի:

Ուրիշ կորաղինի քանի
մը տեսակներ՝ ծովու
քարուտ յատակին վրայ
խեցիի նման դրուագներ՝
եւ կամ կլորցած անկանոն
քարերու՝ զանգուածներ
կը կազմեն. ասոնց կար-
գէն է արեւմտեան Հընդ-
կաստանի Աստղակերպ
կորաղինի (Astraea puncti-
fera):

Կենդանիները միշտ աճե-
լով ու բազմանալով՝ կամաց
կամաց ծովու մէջ ընդար-
ձակ խութեր եւ աւազա-
կոյտներ կ'ելլեն: Սակայն
այսպիսի կորաղինի աւա-
զակոյտները միայն պողպի
մէջ տեսակէն չեն շինուիր, այլ զանազան տեսակներէն, որոնք գոյնզգոյն կ'երեւան
եւ ուրիշ ծովային կենդանեաց հետ կը բնակին: Սակայն միշտ ծանծաղ տեղեր կը
գտնուին, հասարակօրէն եղբայր մօտ կամ եղբրէն քիչ մը հեռու. երբեմն նաեւ
ծովուն խորունկ տեղերն
ալ կ'ըլլան: Հատ ան-
գամ ամբողջ ծովուն
յատակը վեր բարձրանա-
լով՝ կորաղինի այսպիսի
բոլորակ բնակարանները
ջրէն դուրս կ'երկնան
եւ ցած կլոր կղզիներ
կամ կղզեխումբեր կը
ձեւացնեն: — Կորագի-
նի խութերն շինող եւ
անոնց մէջ բնակող կեն-
դանիները սովորաբար
մանր են, սակայն ոմանք
շատ կենդանի գոյներ ու-
նին եւ ծաղկի նման ար-
տաքոյ կարգի գեղեցիկ
ձեւեր ունին: Այսպիսի
կորաղինի ժայռ մը՝ դա-
լարագեղ մարդի կը նմա-
նի: Այնչափ աւելի կը խաբուի մարդ, որչափ կորաղինի ծաղկանց վրայ ծովային
որդեր կը գտնուին, եւ ձկեր ասոնց բոլորտիքը կը թափառին: — Հարաւային Ովկիա-
նոս՝ կորաղինի կողմանէ շատ հարուստ է: Կորաղինի խումբեր՝ նոյն իսկ նաեւ
բու ընթացքը կ'արգելեն, սակայն միայն ծանծաղուտ տեղեր:



Պտկ. 472. Մատրէպոր (Ք. մ.):



Պտկ. 473. Աստղակերպ կորաղին (Ք. մ.):



ԳԼՍ Գ. ՍՊՆԳԻԱԶԳԻԻԶ (Spongiae)

300. Հասարակ սպոնգի (Spongia officinalis) գնդակաձեւ, արտաքոյ կարգի ծակոտկէն, հաւասար հաստ եղջերեայ թելերէ բաղա-



դրեալ զանգուածներ կ'ըլլայ, որոնք տակի կողմով հաստատուն կը կենան եւ ջուր կը ծծեն: Վերի երեսը փնջոտ է եւ վրան լայն ծակեր կան, իսկ գոյնը՝ գորշ:

Հասարակ սպունգը Միջերկրական եւ Կարմիր ծովերը քարերու վրայ կ'աճէ կը մեծնայ, ձկնորսները կը փրցընեն, կը լուան, կը չորցընեն եւ վաճառականութիւն կ'ընեն: Այս վիճակի մէջ կեն-

Պտկ. 474. Սպունգ (1/6):

դանաղն միայն եղջերեայ թելերէ առաձգական կազմաճքը կը մնայ: Կենդանին՝ ծակերու վերի երեսը եւ ներսի կողմը լորձուքի նման բարակ նիւթով կը պատէ, որ երբեմն կը բացուի եւ դարձեալ կը գոցուի: Ծակերուն ներսի կողմը արտեւանունքի նման յատուկ գործարան մը կայ, որուն միջնորդութեամբը նեղ ծակերէն ջրոյ հեղեղ մը ներս կը մտնէ, ասոր հետ նաեւ սնունդն ալ, եւ դարձեալ լայն ծակերէն դուրս կ'ելլէ:

Ուրիշ սպունգները՝ եղջերեայ թելերէն զատ իրենց ներսի կողմը անթիւ ու անհամար խճային կամ կրային ասեղներ ունին: Նաեւ անուշ ջրոյ մէջ գործելու առիթն ալ կան, եւ այս վերջինները պատենաւոր կենդանեաց պատեանները կամ կրային ապառաժները ծակելով ներս կը մտնեն:

ՏԿԸՆԳԵՐՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ ԸՆԳՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Տիւնդերնէրն առանց փուշի, ճառագայթաւոր կենդանիներ են: Ասոնց բերնին բոլորափր՝ որ իրենց մարմնոյն մի միայն ծակն է, անամէջ եւ ըստ մեծի մասին ձգական բազուկներու կարգ մը կայ: Իրենց մորթին վրայ կրային քառակուսի դրուագներ չեն նշմարուիր, սակայն եւ այնպէս շատերը դէպ ի ներս կամ դէպ ի դուրս հաստատուն պինդ զանգուած մը կը շինեն եւ ընկերաբար ապրողները՝ շատ անգամ «կութուն» կամ «բուն» ըսուածին վրայ կ'աճէ կը մեծնան:



ՏԻՊԱՐ 7. ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՔ (Protozoa)


Նախակենդանիք (Protozoa) անուամբ կ'ըմբռնուին այն ամեն ստորին կենդանիները, որոնք ոչ որոշ սեպհական ձեւ ունին, եւ ոչ ալ առանձին առանձին գործարաններէ կազմուած բաղադրութիւն մը կը տեսնուի ասոնց վրայ: Նախակենդանի կ'ըսուին, որովհետեւ կը գըտնուին կենդանական եւ բուսական Նախանիւթն (Protoplasma) մէջ՝ որ մաղասային, հաւկթի սպիտակուցի նման գոյացութիւն մըն է: Ամեն ալ միայն մանրադէտով կրնան նշմարուիլ: Մինչեւ հիմայ 6100 տեսակ ճանչցուած է: Երկու գլխաւոր դասի կը բաժնուին. Հեղականներ ու Արհապոսթեաններ:

ԴԱՍ Ա. ՀԵՂԱԿԱՆՆԵՐ ԿԱՄ ԶՐԱԾԻՆՆԵՐ (Infusoria)

Հեղականներու կամ Զբաթիներու մարմնոյն կազմութիւնը շատ պարզ է, եւ մազերու կամ առանձինն երկայն թելերու օգնութեամբ կը շարժին ու կը սողան: Հեղական կ'անուանուին այս կենդանիները, վասն զի անկող վրայ ջուր թափելով եւ կամ որեւիցէ տունկ մը երկայն ատեն ջրոյ մէջ պահելով (թրջոց դնելով՝ Infusion) ճանչցուեցան: — Զբաթի անունը՝ թէպէտ շատ գործածական, բայց անյատուկ գործածութիւն է, ջրէն չեն ծնանիր այս կենդանիները, այլ իրենց մանրութեան մէջ իսկ՝ կը հետեւին բնութեան: Նոյնպէս շատ անյարմար անուն է Գլաճի (Hydrozoa) բառը: Բոլորովին վճիտ յստակ ջրերու մէջ՝ ինչպէս աղբւրի, ջրհորի եւ ցայտող ջրերու մէջ, ամենեւին հեղական չի գտնուիր, այլ միայն մնայուն ջրերու մէջ: — Իրենց անհամար բազմութիւնն ու արագ աճումը ստուգիւ զարմանալի ու հիանալի է: Սակայն ասոնց համար ըսուած շատ մը իրողութիւններ (այսպիսի իրողութիւններէն մէկն է այն՝ իբր թէ ջրածինները մերթ տունկ ըլլան եւ մերթ անասուն), այս կենդանեաց նկատմամբ չեն արժեր, վասն զի մինչեւ նոր ատեններս ամեն մանր կենդանի գոյակ “ջրածին” անուամբ կ'ըմբռնուէր, ընդհակառակն հիմայ ճանչցուած է որ անոնցմէ շատերը անկային մա-


սունք են եւ կամ բարձրագոյն գործարան ունեցող ուրիշ կենդանիներ, եւ կամ դարձեալ ուրիշ կենդանեաց նախնական վիճակներն են: — Մանրէիկները (Bacteriae) եւ Բակիլլէրը (Bacillus) բնապատումներէն ոմանի հոս կը դասուորեն, իսկ ոմանք բուսաբանութեան ստորին դասակարգներուն (ժանգերուն) տակ. վերջիններուն կը հետեւինք:

301. Լօեւնիկը (Vorticella nebulifera) պարզ աչք՝ ջրային տնկոց վրայ ձերմակ մշուշի պէս բան մը կ'երեւայ: Հազիւ 0.001 հղմ. մեծ կ'ըլլայ եւ ընկերաբար կ'ապրի: Եթէ մանրադէտով մեծցընենք, կը տեսնենք որ կենդանին զանգակի ձեւ ունի եւ անձիւղ, թելի նման կոթունի մը վրայէն կախուած է. կենդանին ուղածին պէս այս կոթունը երբեմն պտուտակաձեւ կ'ամփոփէ եւ երբեմն կը տարածէ: Կենդանւոյն վերի ծայրը արտեւանունքի պէս մաղոտ պսակ մը կայ:



Պտկ. 475. Լսեւնիկ (շատ մեծց.):

302. Բադուսիկը (Trachelius anas)՝ որուն ամբողջ մարմինը թանձր եւ հաւասարաչափ բարակ մազերով ծածկուած է, երկայն նուրբ վեղմ'ունի, եւ բերանը ասոր տակն է: Կենդանին 0.002 հղմ. երկայն, թափանցիկ եւ անգոյն է:



Պտկ. 476. Մագոտ ջրածիններ (շատ մեծց.):

Ջրերու մէջ շատ կը գտնուի բայց հազիւ մանրադէտով կրնայ իւր ձեւն որոշ զանազանուիլ. հոս նկարուած պատկերին մէջ կը տեսնուին որոշ բազմաթիւ ջրածիններու այլեւայլ ձեւերը:

303. Մեկնակը կամ Մոնասթըր (Monas Termo) ամէնէն աւելի կա-

տարեալ մանրադէտով հազիւ կը նշմարուի որ մանր, տփգոյն, բուրբակ պղպջակիկ մըն է եւ թելի մը օգնութեամբն ասդին անդին կը շարժի: Հաշիւ եղած է, որ եթէ այս կենդանիներէն 1000 հատը քովէ քով դրուին՝ հազիւ 1 միլիմէտր երկայնութիւն կ'ունենան, եւ թէ ասոնցմէ 500 միլիոն ջրոյ մէկ կաթիլի մէջ կրնան ապրիլ:

— Ուլականջիկ (Hylonichia mytilus).
Բ. Կկուիկ (Colpoda cuculus). Գ. Գլանիկ (Enchelis farcimen). Դ. Բադուսիկ (Trachelius anas). Ե. մեկնակը (Paramecium aurelia):

Մնայուն ջրերուն մէջ՝ շատ մը փոտած տնկերու վրայ, շատ կը գտնուի այս մանրիկ, անտեսանելի կենդանին, — Կանաչ ափսուկը (*Euglena viridis*) աւազաններու եւ ճահճներու մէջ կ'ապրի եւ շատցած տեսնը



Պպկ. 477. Թնւաւոր ջրածիններ:

— Կանաչ ափսուկ (մէկ հատը շատ մեծց.). բ. Երբերուկ. գ. Մեկնակ (ամէն ալ շատ մեծց.):

Ջուրը կանանչ կը ներկէ: Երբեմնեւրը (գծորդն) (*Vibrionidae*) ապականեալ ծորելի կամ խոնաւ մարմիններու՝ մանաւանդ թթուած քաջախի մէջ միշտ կ'երեւան: Ամէնէն պզտիկ ծանօթ գործարանաւոր կենդանիներն են:


ՌԻՍ Բ. ԱՐՄԱՅՈՒՆՆԻՔ (Rhizopoda)

Արջադարձանները՝ արտաքին կարգի պարզ գործարանաւոր մանր կենդանիներ են, որոնք յատուկ՝ կէս մը ծորելի շարժական կենդանային մաղասէ (*Sarcode*) կազմուած են: «Արջադարձան», ըսուած են՝ իրենց արմատի նման մաղասի թելերէն, զորոնք կամ մէկ կողմանէ եւ կամ ամէն կողմանէ դուրս կ'երկնցընեն: Ոմանք լերկ են, իսկ ոմանք ալ փակուած կ'ըլլան գեղեցիկ կրային պատեաններու մէջ՝ որ ըստ մեծի մասին շատ խորշկներ կ'ունենայ: Այս վերջինները (որ կաճաբէր կենդանի, *Foraminifera* ալ կ'անուանուին) իրենց անհամար բազմութեամբը շատ անգամ ծովու մէջ աւազի եւ տղմի ըստ բաւականի ընդարձակ կոյտեր կը կազմեն, եւ այս մանր անասնոց գրեթէ միայն պատենին մնացորդներէն՝ ապառաժներ եւ կրային քարեր ու կաւիճ կը կազմուին: Գրւխաւոր տեսակներն են:


304. Ամիբը կամ Յեղյեղուկ կենդանին (*Amoeba porrecta*) մանր եւ պարզ աչօք հազիւ տեսանելի՝ լորձուների կծիկ.մըն է, ամէն կողմանէ (ճառագայթաձեւ) մաստնքներ (սուտ ոտքեր) դուրս երկնցած են: Այս ոտքերը միշտ կը փոխուին (ասկէ առեալ յեղյեղուկ անունը տուինք) եւ կրնան դուրս երկնցալ ու ներս ամփոփուիլ: Այս ոտքերը՝ կէս մը հեղուկ մաղասի թելերու կը նմանին եւ կէս մը տեղէ տեղ շարժելու եւ ուրիշ մարմնոց վրայ կպչելու եւ կամ սնունդ առնելու կը ծառայեն:

Թէ այս եւ թէ ասոր ուրիշ տեսակները Արդիական ծովը կ'ապրին եւ միշտ իրենց ձեւը փոխելով եւ իրենց մարմնոյն պարզութեամբ շատ նշանաւոր են:

Նման մէկ տեսակն է՝ Վէնետական Ջրամուշը (Rotalia veneta):



Պտկ. 478. Մտքը կամ յնդյնողով կենդանի (շատ մեծ):



Պտկ. 479. Վենետական Ջրամուշ (շատ մեծ):

Այս դասին տակ իբրեւ յատուկ՝ յիշենք Սփորոզոան (Sporozoa) խումբը, որ նշանաւոր են իբրեւ յակաճող կենդանիներ եւ ուրիշ բարձրագոյն կենդանեաց աղիքներու մէջ կ'ապրին:

Ինժ բանակաւ յուզուած է՝ 1865ին գտնուած Կանադական Եօզոն (Eozoon canadense)՝ եւ Իտալիոյ Նոթոպիլի (Bathybium Haeckelii) նկատմամբ. վասն զի ըստ դարձիկականութեան՝ կը կարծուէր թէ բոլոր կենդանեաց նախակիքն այս վերջին երկու մանրիկներն են. բայց վերջին ստորգ ըննութիւններէն հաստատուեցաւ թէ Իտալիոյ ըսուածը պարզապէս հետաքննող Նոթոպիլի մըն է. իսկ Նոթոպիլի՝ դարձեալ ըստ նորագոյն հաստատեալ ըննութեանց, ծովու մակերեւութէն յառաջ կու գայ եւ Coccothraux ու Rhabdosphaera ըսուած մանրիկներու խառնուրդն է, եւ զարմանալի ապացոյց՝ Հարտլինգ (Hartling) բնագոյնումը արտադրական ճաշիկ (այսինքն՝ այլեւս լատինական եւ իտալիական ճաշիկներով) յառաջ բերուած այս նոթոպիլի...

Կենդանաբանութեան վըայ մինչեւ հիմայ ըսուածներուն վերջապէտը թող ըլլայ՝ երեւելի բնախոյզի մը՝ Linnéին խօսքը. „In minimis natura maxima“

“Ի մանուսն՝ մեծ է ընտելութիւնն:”



ԿԵՆՏԱՆԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱՅ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԵՍՈՒԹԻՒՆ

Բոլոր կենդանիները՝ որոնցմէ 366.000 տեսակ ճանչցուած է, 7 գլխաւոր ճեւերու կամ տիպարներու կը վերածուին:

1. Ողնայարաւորներ (Vertebrata), 2. Կալիւսաճորիներ (Mollusca), 3. Յարդաթորոտներ (Arthropoda), 4. Որրեր (Vermes), 5. Փշաճորիներ (Echinodermata), 6. Տէլէրէրներ (Coelenterata), 7. Նախակենդանիներ (Protozoa):

1. Ողնայարաւորներ (27—30.000 տեսակ): Ամենակատարեալ կենդանիներ են: Ասոնց անդամները համալափ են, այսինքն աջ ու ձախ կողմը հաւասարաչափ կազմուած է. ոսկորեայ կախիճ մ'ունին, որ բոլոր միւս անդամներուն նեցուկ կ'ըլլայ: Կմախքը կազմուած է օղակայէն ոսկիւններէ կամ կոնքիներէ, շատ մը մկանդներ ու ջլեր ունի, առջեւի կողմը կմախքը՝ Գանգիլն հետ միացած է, իսկ կողմնակի՝ կողերով եւ անդամներով: Գանգիլն մէջ կայ ըղէղը, իսկ կողերը խոռոչ մը կը կազմեն, որուն մէջ կայ շնչառութեան, արեան շրջանի եւ ճարտարութեան գործարանները: Սովորաբար այս կենդանիները 4 անդամ ունին, քիչերը՝ միայն 2 հատ, իսկ ոմանք ամենեւին չունին: Ողնայարաւորները կարծիք եւ արտաքին ունին, այս արեան ջրհոսքի-նն է՝ ամէն օգի եւ կլիմայի տակ, 36—44° Կելսիոս: Ողնայարաւորներո՝ համեմատութեամբ բոլոր միւս կենդանիներն՝ Անողնայար կը կոչուին:

2. Կակղամորթներ (50.000 տեսակ): Ո՛չ ներքին կախիճ եւ ո՛չ ալ ամբողջ մարմինը պատող բազմանդամ արտաքին հաստատուն պարէան մ'ունին: Ասոնց մարմինը կալիւս է, միայր, քսակաձեւ ճորիով մը պատած է, որուն տակ կենդանին կրնայ ամփոփուիլ: Այս մորթը (Թաղանթն) արտաքուստ

կարծր, հաճախ կամ երկփեղկ խեցի մը կը կազմէ: Կակղա-
մորթներէն ոմանք զգալի գլուխ եւ քերան ունին, իսկ
ոմանք՝ չունին: Սովորաբար խոնկներով շունչ կ'առնուն, շատ
քիչերը լսող ունին: Կամ գլխով կը փայլեն եւ կամ փորով
(լանջով):

3. *Յօդուածոտունը* (230.000 պէսակ): Ներքին հմարտ չունին, բայց
արտաքուստ հաստատուն եւ կարծր եղջերեայ կազմած
մ'ունին, որ երբեմն կրային խաւ՝ մը կամ կարծր պապեան
կը կազմէ: Սովորաբար երեք մասի բաժնուած կ'ըլլայ ար-
տաքին կազմածքը, գլուխ, կոնքի եւ փոր: Յօդուածո-
տունի կ'ըստին, վասն զի 6, 8, 10 կամ աւելի մասերէ
(յօդերէ) կազմուած են այս կենդանեաց ոտքերը: Փորին
կողմը ջրէրոս գոյն ունին, իսկ կոնակի կողմը՝ թուշու-
լարմար մանր գործարաններ: Կամ շնչահանով եւ կամ
խոնկներով շունչ կ'առնուն:

4. *Որդեր* (6150 պէսակ): Որդերը կակուղ մարմին մ'ունին, որուն
վրայ՝ վերոյիշեալ կենդանեաց վրայ տեսնուած համապատ-
կազմութիւնը կրնայ զանազանուիլ: Նախորդ տիպարին պէս՝
այս կենդանեաց մարմինն ալ բազմաոգ է, բայց յօդուած-
ոտի փայլուն, եւ ասով կը տարբերին յօդուածոտաններէ:

5. *Փշամորթներ* (3000 պէսակ): Այս տիպարը մինչեւ հիմայ յի-
շուածներէն կը տարբերի իւր կազմութեամբը: Ասոնց մար-
մինն երկու հաւասարաչափ մասի բաժնուած չէ, այլ իրենց
բերնէն՝ իւր կենդանեաց մը սկսեալ, սովորաբար հինգ մասի
բաժնուած է: Այս հինգ ճառագայթաձեւ կամ աստղաձեւ
շարուած մասերէն՝ զարմանալի երեւոյթ մը կ'առնու մար-
մինը: Արտաքին փշոտ, կրային պապեանն ամբողջ մարմինը
կը պատէ, եւ այս պատեանէն ծծակներ կ'երկնան իւր
ոտի: Յատուկ մարտողական գործարան մը, արեան անօթ-
ներ եւ ջրերու դուրսի մ'ունին:

6. *Տկրնդերներ* (8000 պէսակ): Տկրնդերներոս մարմինը 4, 6 կամ
9 ուղղութեամբ բաժնուած ճառագայթաձեւ կազմութիւն
մ'ունի: Փոխանակ մարտողական գործարանի եւ արեան ա-
նօթներու՝ ի իսկ տկանման միջոց մ'ունին իրենց մարմինը
մէջ եւ ի իսկ ծակ մը, որ թէ իբրեւ բերան եւ թէ իբրեւ
սրբան կը ծառայէ:

7. *Նախակենդանիներ* (6100 պէսակ): Շատ մանր եւ պարզ կազ-
մութիւն մ'ունին այս տիպարին տակ գաղղ կենդանիները:

իբրեւ գործարան՝ մաղասայն, շաբթական նիւթ մ'ունին, իսկ բաղադրեալ գործարաններ չունին: Ամբ բոլորովին լէրի են եւ կամ կրային եւ խճային մանր պատեան մ'ունին: Այս տիպարին որոշ թիւը նշանակել անկարելի է, վասն զի ցարգ ճանչցուած 6100 տեսակէն զատ, ահագին բազմութեամբ նախակենդանիներ կան, որոնք միշտ իրենց արտաքին ձեւը փոխելով՝ հաստատուն ծանուցիչներ չունին: Ամենէն անկատար կենդանիներն են. բայց անասուն են ըստ որում ազատ շաբթամբ ունին եւ զգալի, երկու յատկութիւն՝ որ ոսկունեակի տակ ակն յայտնի յերեւան կու գան, եւ այս կենդանիներն իբր Կոնկ նկատելու գլխաւոր արգելքներն են:

(Համեմատեալ հետեւեալ տախտակը:)

ԱՄՈՂԱՅԵԱՆՈՒՄ ԿԵՆՏՐԱԼԻՏԵՐ
(Evertebrata)

♂. 1971-2-20-21 5. 24hr (Pisces).

11. $nerb_r$ (Vermes):

zoa):

ՅԱՆԿ ԱՆՈՒԱՆՑ

(Աստղանիշները (*) գիտնական բառեր են :)

Ա.

Ագեփաղ 101
 *Ագուռ 27
 Ագաւ 116
 — մերթադոյն 117
 — սերմանաբաղ 117
 Ագաւանք 116
 *Աղդր 27
 Ալերփփաղ 242
 Ալերթօշ 301
 Ալիզատոր 169
 Ալի 81
 Ալպակա 89
 *Ականաժամ 252
 *Ականջ 12, 23
 *Ականջակոնք 12
 Ականջամուռ 269
 *Ականջափող 12
 Ակար 310
 Ակնուկ (կանաչ) 343
 *Ակուայ 23
 *— անկեան 23
 *— առջևի 23
 *— ծամաղ 23
 *— կարող 23
 *— շնական 23
 Ակաւանք 6
 Աղանեւտուռն 278
 Աղանի (գաղթող) 138
 Աղանիներ 137
 Աղեղնաթիթեռ 276
 Աղիկոն 125
 Աղիկներ 125
 Աղիկ 202
 Աղուեսակապիկներ 41
 Աղուեսաշուն 48
 *Աղուեսենի 52
 Աղուեսուկ (մեծ) 275
 Աղուես 51
 — գեղին 52
 — մերթադոյն 52
 — սպիտակ 52
 Աղօրեպան 242
 *Աղօրեք 23
 *Անուժ 26
 Ամար 156
 Ամբուտածղբիդ 266

Ամբր 343
 Ամիկ 81
 Ամպեղ 120
 Այդաճի 344
 Այդեհ 244
 Այդերուկ 152
 Այլամարակներ 90
 Այծ 81
 — Անգիւրիայի 81
 — զաշփրի 81
 Այծամարդ (կապիկ) 35
 Այծգիւղ 122
 Այծեամ մեծ 85
 — մշկապորտ 87
 — փղբրիկ 85
 Այծեղջիւր 248
 Այծեմիկ 85
 Այծկիթներ 122
 Այծբաղ 82
 Անալուծ 89
 Անակոնդ 174
 Անաղիք 332
 Անասուններ 1
 Անգղ մորուանի 134
 — սպիտակազլուխ 133
 Անգղարծիւ 133
 Անգղներ 132
 *Անգամ 23
 Անգրուար 91
 Անգուգամառ ոմբակաւոր-
 ներ 90
 Անթառուկ 294
 Անթեւեայ (հարաւային) 162
 Անթեւուկներ 159
 Անիծ 304
 Անծեղ 118
 Անկաշաւ 118
 Անիքուկ 202
 Անտեաններ 320
 — (Ակեր) 202
 Անտառագեւ 40
 Անտառակով 80
 Անտառահատեր 144
 *Անրակ 4, 27
 *Անթիներ (լմփային) 28
 *Անթիք արեան 13
 Անխարհական 263
 *Անք 12, 23

*Առաւուշա 17
 *Առերող մկունք 7
 Առիւծ 59
 — լուծակեր 261
 Առիւծակապիկ 41
 Առիւծաշիկ 49
 *Առու արիւնարուխ 14
 Ասպ 91
 *Ասպատան 12
 Ասպուճակ 112
 Աստակոս 315
 *Աստղ 23
 Աստուծոյ եղնակ 243
 Ատաճակաւուց 119
 Ատաճակուկ 191
 Ատաճառ (կենդանիներ) 95
 Աւառ (թիթեռ) 285
 Արա (գեղեցիկ) 129
 Արագիւլ արծաթազոյն 148
 — մերթադոյն 147
 — սպիտակ 146
 Արագիւններ 145
 *Արգելք 32
 Արգոնաւորք 214
 Արգոն 274
 Արգուկ 248
 *Արեան անթիներ 13, 28
 *— երակներ 28
 *— չրջան 28
 Արիւձուկ 193
 *Արիւնարուխ (առու) 14
 *Արիւնեբակ թղթի 14
 Արծաթաշիկ 275
 — մեծ 275
 — փղբ 275
 Արծիւ կայսերական 136
 — սպիտակ 135
 Արիւնաւք 130
 Արմատոտանիք 343
 *Արմոսկր 4
 *Արմուկ 27
 Արշալոյս (թիթեռ) 272
 Արջ աշաւոր 64
 — բեւեռային 63
 — լուսաղջ 64
 — խորտեալ 63
 — հասարակ 63
 — սեւ 64

Արջ սպիտակ 63
Արջաթիթեռ (Հասարակ) 284
Արջակապիկներ 41
Արջամուկ 67
Արջառ (շնաններ) 78
Արջեր 62
Արջնագորտ 182
Արջնագորտեր 182
Արջնագուռ 117
Արադյո կառարաւոր 110
— մարդաց 110
Արադյաներ 110
Արքայաձուկ 189
— գետի 198
Արքայաթիւ 136
Արօս (մեծ) 162
Արօսներ 162
Արօրակ 129
*Աւագերակ 14
Աւագաբղէշ 242
*Ափ 4, 27
Ափիս վարդի 301
— պարկաւրակ 301
Ափիւնի 301
Աքաղաղ 139
— Վարդի 139
Աքար 145
*Աքեաց 4, 27
Աքիս (Հասարակ) 52
Աքլոր 139
*Աքցան 23

Բ .

Բագ վայրենի 152
— փափկափեռաւոր 152
Բագեր 151
Բագուկ 342
Բագէ ազնիւ 135
— շրջիկ 135
— որսական 135
— պանդուխտ 134
Բագէներ 134
*Բագիւոր 4
Բագմաթերթ բողկուկաւոր-
ներ 234
*Բագուկ 25, 27
Բալէնա 98
Բալէնաներ 98
Բալդիւրիկ 253
Բակեղներ 342
Բաշիւրաւ 64
Բամբիշ 275
ԲաշաՀատ 91
Բաշիւր 310
Բասիլիկոս 177
Բարակ 48
*Բարձ 4, 27
Բարձրասորուններ 145
Բարամուշկա 188
*Բարդը 224
*Բաւիշ 12
*Բաուկ 23
*Բերան 23
Բզէշ արջնաթիւր 241
— Հերակղի 236
— մարերի 235
— ամբաձիգ 241

Բզէշներ գնայուն 241
Բէշկ մշկներ 62
*Բիւր 13, 14
Բիսնի 80
— Ամբիկէի 80
*Բլիթիկ 79
*Բնախօսութիւն 1
Բնդեւներ 234
Բշիկներ բրտանց 11
*Բոժոժ 233
*Բոզիւկ 23
Բոզիւկաւորներ (բաղմա-
թերթ) 234
Բոմբիւզոս 280
Բոննոս 80
Բոռ կապլա 291
Բոռեի 293
Բոսոս 322
Բորեան բժաւոր 62
— շերտաւոր 61
Բորեաններ 61
Բոցգիտուր 131
Բու 131
— Եղիւրաւոր 131
— մարգարտագորդ 131
Բուաթիթեռ խոտակեր 285
— կաղամբակեր 286
— սերմանեաց 285
— ստեկեր 286
Բուաթիթեռներ 285
Բուեր 130
Բուէճ 131
Բուծ 80
*Բուռ-իւրան 23
*Բուսարանութիւն 1
Բուստ կարմիր 337
Բրաձուկ 195
Բրամիկ 198
Բրէա 254
— աւաղի 254

Գ .

*Գագաթնոկ 4
Գագաններ 47
*Գալարադիք 16
*Գալարատուտան 41
Գալարիշ կոնի 288
Գալարոշներ 287
Գաղտակուր բուն 223
— մարգարտաբեր 223
Գամփա 48
Գայլ 50
Գայլաձուկ 200
*Գանդ 5, 6
Գանդ(աթիթեռ) 276
*Գանդուկ 26
Գանդիւրիկ 48
*Գանձակ 77
Գառն 80
Գառնանդի 133
Գառնաթիւր 310
Գաւիւր 169
Գեկոներ 177
*Գեղանի 15
Գետակղունի 218
Գետակիւն (Ամբիկէի) 93

Գետակիւններ 93
Գետակրայ (Եւրոպայի 166)
Գետանարեկ 115
Գետանարի (կայր) 185
Գետնագորտ (Հասարակ) 183
Գետնալուծ 249
Գետնալուծ (Ափրիկէի) 178
Գիրբոններ 37
Գիշառաղ թռչուններ 130
Գիշառալիկ 238
Գիշառի 319
Գլանիկ 342
Գլխոտաններ 212
*Գլուխ 23
Գլխոտաբեր պիժակ 256
— վարդենի 257
— տերեւակեր 257
Գլխոտաբերներ 256
Գծորդ 343
Գնդուկ մանուշակագոյն 241
— պղնձագոյն 241
Գնայուն բզէշներ 241
*Գնդակ մեղրաց 250
Գնդաձուկ 204
Գոճան 303
— խիժակի 304
Գոմէշ 79
Գոռու 141
Գորեի 293
Գորիւլ 37
*Գործարան զգացողութ. 26
— մարդու թեւ 16, 28
— շնառութեան 28
Գորշկոր 48
Գորշուկ 55
— Ամբիկայի 55
— լարագործան 55
Գորտ ծառասեր 181
Գորտազգիներ 180
Գորտան գդէլ 181
Գորտանուկ 194
*Գուն 27
Գունակո 89
*Գունի մեղրաց 250
Գոտերէ (?) 96
Գոտեւորներ 96

Դ .

Դահուճ 145
Դանակարուն 230
Դաշտամուկ 70
Դաշտասարդ 310
*Դաս 2
Դասասակ 4, 27
Դարամբակներ 74
— չորսոց 75
Դեղձանիկ 107
Դեղձուկ 272
Դեղփիւն (բուն) 99
Դեղփիւններ 99
*Դեմք 26
Դիակիրներ 237
*Դիմոսկիր 26
Դիմոսկ 157
Դիմոսոս 204
Դիւրագարձ 237

Դիւրագործներ 237
Դշխոյաճա 145
Դոգ 49
Դոգոշ (Պարտառեան) 183
Դոգոշներ 183
Դուգոնդ 101
Դուգար ամաղոնեան 129
— գորշ 129
*Դուսակ 16
Դրախտաճա 116
Դրախտաճաւեր 115
Դրախտապան սակեղոյն 109
Դրակոն 193
*Դրոշ 25, 141

Ե.

Եգրեփիններ 195
Եգրաբնակներ 148
Եղն 78
Եղնագորտ 181
Եղնակ 109
— Աստուծոյ 243
— ոսկի 235
Եղնանձ 292
Եղբայրակ 105
Եղեւնակեր 283
Եղնանձի 236
*Եղեղախաւ 11
Եղնիկ 85
Եղջերաճաւ 127
Եղջերաւորներ (անամէլ) 78
Եղջերբէզ 236
*Եղջերբայ 13, 24
Եղջերու 84
Եղջերուկ 117
Եղջերուններ 84
*Եղջիւր 23
Եղջիւրիկ 171
Եղջիւրիկ 148
Եղջեղէս Թմբրեցուցիչ 202
Եղինէս 228
— աղին 228
*Երախբ 15
*Երակամաղ 13
Երաշտաճաւ երկայնագի 111
— մեծ 110
— փոքր 111
Երաշտաճաւեր 110
Երգեցիկ Թալաններ 105
Երգեցիկներ (բուն) 112
*Երես 26
Երերուկ 343
Երեսիւ 244
Երերգօտեան (անասուն) 96
Երիւ լայն 327
— հուր 326
Երիւրդ 326
Երիւրդներ 326
*Երկամուկ 17
Երինջ 78
Երիվար 91
Երկակենցաղներ 180
— անուն 185
— պոչաւ 180
— պոչաւոր 184
Երկայնաբողկու կներ 261

Երկայնագիններ 314
Երկայնաթեւեր 157
Երկայնաբողկու կներ 294
Երկգնդերներ 227
Երկթեւեաններ 290
Երկխաթիկեաններ 212
*Երկվեցաղի 163
Երկրամայր 322
Երկրամուկներ 297
Երկրալպ մանր 286
— մեծ 287
Երկրալպներ 286
*Երկրեղկեան 231
*Եւստաքեան փող 12
Եբինէի 192
Եբինոս ուսեւի 328

Զ.

Զամբիկ 91
Զամբուկ 200
*Զարկ 14
*Զարկերակ 14, 28
*Զագողութեան գործա-
րաններ 26
*Զգացում 11, 26
Զեռուներ 165
Զերու 79
Զերբե (") 293
Զերեթներ 62
Զիւ 208
*Զիստ 27
Զուարակ 78
Զուգամատ (սմբակաւոր-
ներ) 74
*Զասուկ 4

Է.

Էմու 161
Էշ 92
— մատակ 92
Էշայծեամ 86
Էօզոն 344

Ը.

*Ըղեղ 9, 10
*Ըղեղաման 180
Ըղեղորդ 327
Ընձառիւծ 60
Ընձուղտ 89
Ընձուղտներ 89
Ընձուղ 78

Թ.

*Թագաւորութիւն 2
Թաթագնաց անասուններ 47
*Թաթաճեր 76
Թաղանթաթեւեր 250
Թաղանթակեր շունչ 247
Թանձրալեզուներ 176

Թանձրաճաւ հեւտային 159
— հսկայ 159
Թանձրաճաւեր 159
Թանձրամորթներ 74
Թառափ (Եւքսինեան) 205
*Թափան 16
Թափառառուկ 69
Թելորդուկ Մեղինի 325
Թելորդուկներ 325
Թերթախակներ 223
*Թեւ 25
Թեւատ փայլուն 159
Թեւոտուկ 42
*Թեփ 25
Թեփաթեւեր 270
Թեփամորթ կարճագի 97
— մեծաթեփ 97
*Թեփ 251
Թիթեւ առաքատաւոր 273
— Ատլա 285
— արշաղոյս 272
— դօտեւոր 285
— Թափառական 282
— կաղաթակեր 272
— կանաչերակ 272
— կիտրոնի 272
— Հաղարի 287
— մանեկահիւս 282
— մեղրակերպ 280
— լաղափ 272
— սնկաբեր 284
— սպիտակախոյտ 280
Թիթեւանակ բաղաւորի 275
Թիթեւներ 270
— կաղաղ 275
— ոտայնանի 280
— սեպարողուկ 270
— ցերեկուան 270
— փայտաբո 279
Թիկնաղ 299
*Թիկունք 27
Թիւնիկ 191
Թիւնիկներ 191
Թիւնոս 192
*Թմբկաթաղանթ 12
*Թմբկաթորշ 12
Թմբրաձուկ 209
Թմբրեցուցիչ եղբեղէս 202
Թմբրեցուցիչներ 202
Թոն 155
Թուլատարներ 212
Թուլկատար 112
*Թուք 300
*Թուք 15, 16, 28
Թոք ակնջաւոր 332
— գիշերլուսիկ 333
Թուլուն սողաւորաւոր 127
Թուլուններ 105
— երգեցիկ 105
— լողացող 150
— Հաւազգի 138
— ճահնային 145
— մաղլոց 126
— վաղող 160
Թրաձուկ 193
Թրթուր 233
Թրթռաձանձ 294
Թրթրինէ 253

ժ.

ձանեւոր Հասարակ 131
 ձամաղղոյ մահուան 239
 ձանաճում անասուն 56
 ձանաքիտ 53

Ժ.

Ժգուան Հասարակ 177
 ԺԺ եղբորաւոր 171
 — Հասարակ 170
 Ժնձ 60
 Ժննդօտեան անասուն 96
 Ժշակէն 93
 Ժշամեղու 253
 Ժշամբուկ 92
 Ժշավայրի 93
 Ժշգր 55
 Ժշուկ 92
 Ժրան 23, 26
 Ժւղաճճի 243

Լ.

Լարրակ 189
 Լարիակ 222
 Լակոս 48
 Լամա 89
 Լապանբուր 300
 *Լեարդ 16
 *Լեզու 15, 23
 Լեզուանուկ 195
 *Լեզուակեր 15
 *Լեզուաւոր 17
 *Լեզի 17
 Լեմինդ 70
 Լեռնայծ (Պիւռնեան) 83
 *Լմիպին անթներ 28
 *Լոգանեւ 211
 Լոդակ (գեղին) 174
 Լոդականներ 151
 *Լոդարան 25
 Լոդարանաւորներ 104
 Լոդացոյ թռչուններ 151
 *Լոդափամփուշ 211
 Լոդի 199
 Լոդիներ 198
 Լոր 143
 Լորամարդի 143
 Լորիս 4
 *Լորնաթաղանթ 3
 Լորշուն 49
 Լորանուկ 217
 Լորտու 173
 Լու 296
 Լուեր 296
 Լուեմաներ առիւծ 261
 Լուղակներ 240
 Լուսաթիթեւ 275
 Լուսանանձ 238
 Լուսան 58
 *Լուսն սպիտակ 13
 Լուստունիկ 238
 Լըր 212
 Լսեանիկ 342

Խ.

*Խախտաց 7
 *Խաճի 163
 Խաճիակ 109
 Խաղանակ կարմարաւուն 149
 — կուռուղ 149
 Խաղաղեփեաց 239
 Խաղաղ ծովային 213
 *Խաղաղիկ 15
 Խաչաւորդ 308
 Խաչափաւ 317
 — Անտիքան 318
 — գետային 318
 — պարկաձեւ 318
 Խաչկուռ 108
 Խարաւուղ 85
 Խարակաձկներ 198
 Խարամանի 171
 — աշաւոր 172
 Խարանաճճի 243
 Խաւարաւոր Աւերիկէի 270
 — առիական 269
 — Գերմանիայի 270
 Խեցգետին գետային 314
 — ծովու 315
 — Մուլկիկեան 319
 Խեցեմարթներ 314
 Խեցի աւաղանի 228
 — Հսկայաձեւ 228
 — Կարալաց 228
 — սորակեաց 230
 Խեցիներ 223
 — փողաձեւ 230
 Խիթ 168
 Խլէղ 175
 Խլուրդ 45
 Խլուրդներ 45
 Խլրդածդիդ 266
 Խղունջ աշաւարկաձեւ 222
 — բուն 216
 — ծիրանաբեր 220
 — Հեռատեւ 222
 — ճահային 219
 — ճենական 219
 Խղունջներ 216
 — թռչաւոր 216
 — յաւաթախիկ 218
 Խմորուիկ 235
 Խնձորաթիթեւ 285
 Խոզ ընտանի 75
 — վայրենի 76
 Խոզեր 75
 *Խողան 25
 Խողանաւորներ 246
 Խողակ 70
 Խողակներ (փշուր) 70
 *Խողովակ ողնաձուծի 27
 Խոնկոր 76
 Խոյ 80
 — մալեւ 80
 *Խոտուց 27
 Խորաւոյց կատարաւոր 158
 Խորաւոյցներ 158
 Խորդ Հասարակ 150
 *Խորիս 252
 *Խուիկ 28, 188
 Խուիկուտ 320

*Խուիւրդն 130
 Խուռական գեղին 261
 *Խուշակ 15
 *Խուշակուր 27
 *Խուշափող 15

Ճ.

Ճածան գետային 197
 — Հսկայ 198
 — անաւայ 198
 Ճածաններ 197
 — անթեփ 198
 *Ճակոտէն Հեռակէն 3
 Ճաղկակեղանիք 336
 *Ճամբներ 26
 Ճաւաղորտ 181
 Ճաւամբիկ (Թաւի) 260
 Ճաւապիծակներ 258
 Ճաւակոտիկ 128
 Ճեռուկ 311
 *Ճիւղան 13, 23, 24
 Ճիւղան մեծ (Թիթեւ) 276
 Ճիւղաւ ընտանի 121
 — չինական 120
 Ճիւղաններ 120
 Ճիւղանուկ 112
 Ճիւղաւորներ 273
 Ճիւղեանաւուկ 190
 Ճիւղանաբեր խղունջ 220
 — պարիկ 221
 Ճիւղանի մանր 285
 — մեծ 285
 *Ճծակ (անթներ) 28
 *Ճղիք 27
 Ճղին 125
 *Ճղնիկ 27
 Ճղիդդ դաշտի 265
 — ընտանի 265
 Ճոժաւուտ 339
 Ճոժաղլան ուսելի 328
 Ճոժաղլաններ 328
 Ճոժախաւանիճ 316
 Ճոժախաւանիկ 73
 Ճոժածիծաւ 157
 Ճոժածիծաւներ 157
 Ճոժակալ 274
 Ճոժականջ 221
 Ճոժակեղեւ 327
 Ճոժակով (Սաւեղներեան) 101
 Ճոժակովներ 101
 Ճոժակուղ 35
 Ճոժակուրայ 166
 Ճոժակուրաներ 166
 Ճոժակի 204
 Ճոժամայր (բուն) 332
 Ճոժամայրեր 332
 Ճոժամախակ 336
 Ճոժաւուն 64
 Ճոժաւուններ 331
 Ճոժաւուն գորշ 336
 Ճոժաւուններ 336
 Ճոժաւուիճ 65
 Ճոժաւարդ 318
 Ճոժաւուրակ 158
 Ճոժաւատը կարմրագոյն 330
 — Կարմրագոյն 330

Ծովառաղներ 303
 Ծովափարգ կանանչ 336
 — Հաստաղիւր 336
 Ծովարմու 230
 Ծովաբլ 65
 Ծովացիք 65
 Ծովացու 65
 Ծովափեռուր (կարմիր) 337
 Ծովափիշ 65
 Ծովաղի 328
 Ծովաղիներ 328
 *Ծորեորուկ 4
 *Ծուէն 281
 *Ծուծ 10
 *Ծունի 27
 *Ծուիլ մկունք 7
 Ծրարդէլ 240

Կ.

կաթնասուններ 35
 *կապիտան-ստիստ 6
 * — փոսփաթ 6
 կալան 42
 կակալ ծովու 321
 կակալաթեւեր 194
 կակալամորթներ 212
 կահացեց 289
 կաղամակներ (թիթեւ) 272
 կաղնեթիթեւ 288
 կաղնեքաղ 248
 կայծակի 238
 կայման 169
 կանաչներ (թիթեւ) 272
 կանգուրու 101
 *կաշի 11
 կաշաղակ 118
 կապիկ այծամարդ 35
 — լալան 41
 — հասարակ 39
 — սորաբանի 39
 — տանկալան 39
 կապիկներ 35
 — Ամբիկայի 40
 — երկայնարաղուկ 37
 — Հին աշխարհի 35
 — Նոր աշխարհի 40
 — Նրաբիթ 35
 — տափաբիթ 40
 կապուտ 191
 կասուար 161
 կասուարներ 161
 կատու 56
 — վայրենի 57
 կասուաղիներ 56
 կասուառուկ 209
 կասուառուկ Ամբիկայի 60
 կարապ գեղեցկաձայն 154
 — հասարակ 153
 *կարգ 2
 կարիգու 316
 կարիճ գործ 306
 — մեծ 305
 *կարծրամաշկ աչաց 13
 կարկաշտներ 122
 կարկինսու բուռ 317
 կարկինսուներ 314

կարճարողակներ 290
 կարճադիներ 317
 կարճաթեւեր 239
 կարճալեզուներ 178
 կարմիրթեւ շառագոյն 154
 կարմիրկատար 105
 կարմրաբիծ 280
 *կարմրագեղ 304
 կարմրաթիթեւ 275
 կարմրակի 272
 կարմրաձուկ 198
 կարմրամորթիւն պարսեղ 260
 կարմրիկ բաղմակաեան 250
 — երկկիւտան 250
 — եօթնկիւտան 250
 — հինգկիւտան 250
 *կարմրուկ 52
 կարմրուկ 199
 — ալպեան 200
 կարմրուկներ 250
 կաւճարեր կենդանիք 343
 կաթու հասարակ 142
 — միւրաղայն 142
 կաթաններ 142
 *կենդանաբանութիւն 1
 կենսուկ կանադեան 344
 կենսեթի 114
 — ջրային 115
 — սոսնձակեր 114
 կենսեթաղիթեւաւներ 114
 կերբաղէ (?) 135
 կերկեր 151
 *կերպարանափոխութիւն
 186, 233
 *կղզակ 23
 * — վարի 4
 * — վերի 4
 կղզակային կանանչ 40
 կղզակայիններ 40
 *կղզակոտ 314
 *կղզեթու բուն 54
 — սպիտակ 53
 կղզեթուներ 52
 կէտ (Գրօէնլանդայի) 98
 կէտեր 98
 *կիթ 211
 կիթ 76
 կիսակապիկներ 41
 կիպսեղ 122
 կիպսեղներ 122
 կիտագիներ 316
 կիտաթեւեր 297
 կիտաղիներ 97
 կիտառի թիթեւ 272
 կիւր 162
 կիւր 148
 կիւրէ (գիւր) 114
 կիւրէիկ 114
 կիւր 233
 կիւր հասարակ 126
 կիւրներ 126
 կիւրիկ 342
 կիւրաղիներ 68
 *կիւրաձու 68
 *կիւրաթ 3, 4, 26
 *կիւրմանի 53
 կիւրու 53
 կիւրթաւոր արմաեաց 244

կիւթաւոր կաղնոյ 245
 — պղնձաղայն 245
 կիւթաւորներ 244
 կիւթեղ 93
 կոզն 87
 կոյրբի (շղջափեռուր) 123
 կոյրաններ 216
 *կոյրագոյն 15
 *կոյրդիւս 168
 *կոյր 4, 27
 *կոյր 217
 — կարմրագոյն 218
 կոյրաղիներ 40
 *կոյրագոյն 4, 27
 *կոյր 4
 կոյրագոյն 235
 կոյն (հիւսկէն) 220
 — մարմարապատ 220
 *կոյն 6, 27
 կոյնակ 48
 կոյ 78
 կոյնակէլ շքեղ 238
 կոյնուծ 175
 կոյրի 220
 կոր 305
 կորագոյն աղիւ 337
 — առաղակերպ 339
 — փողաձեւ 338
 կորեկաթիթեւ 288
 կորճ 132
 կուրագոյն 93
 կուրագոյն 60
 կուր աղիւ 54
 — հասարակ 54
 կուր 68
 կուր 56
 կուրակի 321
 *կուրակ 87
 *կուրաղի 16
 կուրիկներ 185
 *կուր 6
 կուր 178
 կուրուր (Սեբիկէի) 183
 կուրաթեղ 227
 կուրակի 200
 կուրակուկ 200
 կուրակ 150
 կուրակային կարմիր 41
 կուր 226
 — ունանձեւ 227
 *կուր 23
 կուր (վայրի) 149
 կուրաթներ 149
 կուրաւոր անասուններ 103
 կուրան (կաշկապատ) 168
 *կուր 167
 կուրայ յունական 167
 — ցամաքի 164
 կուրաներ 165
 — ճահայի 166
 — ցամաքի 167
 *կուրից տախակ 27
 կուրդներ 66
 կուրդներ (ցանցաթեւեր) 263
 *կուր 4, 27
 կուրանուր 187
 *կուր 4
 կուր 167

3.

*Հագագ 15
 *Հագարթերթիկ 77
 Հագարտոտաններ 312
 Հագարտուի անձը 313
 Հագարտուիներ 313
 Հագրովտի 221
 Համագրիտ շնագլուխ 40
 Համատեր 70
 Հայկաձուկ 193
 *Հանքաբանութիւն 1
 *Հանքեր 1
 Հարթիկի 108
 Հարիկ 200
 Հարցուկ 268
 — Հարաւ. Եւրոպայի 268
 Հաւ 139
 Հաւագդի թռչուններ 138
 Հաւալուն 155
 Հուեր 139
 *Հուկիթ 29
 Հուկուտ 103
 Հոււնագ 139
 Հոււնու արեւեղան 190
 — Եւրոպայի 190
 Հաւորակ 48
 Հաւալու վայրատու 137
 Հեղականներ 341
 Հեղգներէ (?) 95
 Հեռահան 62
 — պիծակ 255
 Հետահանուկ բոժոժաբեր 256
 — սեւ 255
 Հետահանուկներ 255
 Հերակդի բղէղ 236
 *Հերիւնակաւ 112
 Հերձայեղուններ 175
 *Հերձակուտ 120
 Հերձառուկներ 321
 Հիզրա գորշ 334
 — մոխրագոյն 335
 Հինգթեւան 290
 Հիւսող թռչուն 108
 *Հիւսուածաբանութիւն 1
 Հնգաւ անթիւ 299
 — դարգարուն 299
 — մոխրագոյն 299
 Հնդկահաւ 141
 Հողամաղ 158
 Հորթ 78
 Հոբ 199
 Հոկայահաւեր 163
 Հոկայանեւ խեղի 228
 Հոպաուկ 287
 Հրադոդոշ 182
 Հրադուէս 52
 Հրիդեր 86
 Հրձուկ 202

2.

*Չոյնամու 15
 Չարատաղ 331
 Չարատաղներ 311
 *Չգիւ միւնք 7
 Չեանհաւ 145

*Չեւք 25
 *Չեւաբանութիւն 1
 Չի 91
 — մասակ 91
 — մասակախաղ 91
 — Նեղոսի 77
 Չիպեթի 76
 Չիպեթի թռչուն 149
 Չիպեթի 204
 Չիպեթի 292
 Չիպեթի 254
 Չիպեթի 254
 Չիեր 90
 Չիւնեճի (գորշագոյն) 238
 Չիեր 187
 — անհաւաւ 206
 — բոլորաբան 210
 — թանձրափուշ 206
 — Եւրոպայի 205
 — սուրուն 188
 Չիպեթի 229
 — աւաղ 230
 Չիկու 157
 Չիկուի 319
 Չիկու 153
 *Չու 29
 Չուկ երեքդեան 193
 — թռչող 193

Պ.

Չագար 72
 Չագարամուկ 72
 Չախուկ 135
 Չակ 91
 *Չակառուկ 4
 Չահային թռչուններ 145
 *Չանաշուկ 27
 Չայ 118
 Չայեակ 117
 Չայիկ 91
 Չան 290
 Չանեներ (բուն) 290
 — ծակող 294
 — հասարակ 292
 — յափշտակիչ 294
 Չանեիկ թռչուններ 124
 Չանեիկներ 120
 *Չապու 130
 Չարեի 114
 — ալպեան 114
 — բաղամալի 114
 Չարպութեի կռիւաւոր 205
 — սուրուն 205
 *Չարպահիւն 11
 Չեղագու 125
 Չեկական խոյն 219
 Չեկանուկ 198
 Չեւ 139
 Չղակ 155
 *Չղուկ 103
 Չեկերներ 44
 Չեի գլորուկ 319
 — զատիկ 250
 — թանձրաբան 239
 — հաղի 239
 — սլուան 244

Չեի սալորի 245
 Չեիներ 232
 — չեի 238
 Չեիլուկ 106
 Չեիլ 141
 Չեւաւ 136
 — մորական 137
 — միւս 137
 Չու 139
 Չու 299
 Չուա հասարակ 299
 — փրփրաբեր 300
 Չուաւներ 299
 Չուի 299
 Չոճհաւ 111

Մ.

Մագլոյ թռչուններ 126
 *Մագլեիկութիւն փոփոխութիւն 6
 *Մաղ 25
 Մակաբայ կենդանիներ 344
 Մակի 42
 Մահալ 108
 Մահալուկ 242
 Մահիկ (բուն) 174
 *Մաղ 252
 *Մաղաւ 343
 *Մաղի 17
 *Մաղահաւ 16
 *Մաղուկ 15
 Մամակոյ 35
 *Մամաղ 28
 Մամուկ 307
 Մամուրդ փեարանեւ 327
 Մայիկ ուրդ 243
 *Մայ 14
 Մայրահաւեր 144
 Մայրահաւ 144
 Մանդիլ շնագլուխ 40
 Մանիկահաւ (թիթեւ) 282
 Մանիկաւոր 133
 Մանիկներ 280
 Մանիկներ 342
 Մաշ 25, 145
 Մաշտահաւներ 154
 *Մաւ 6
 Մասակաւի 91
 Մասնաշնայ անասուններ 47
 Մարեակոր 339
 Մարաւ 147
 Մարաւ թափառական 266
 — կանաչ 287
 — կանաչ 287
 — ծովու 316
 — ուրուական 269
 Մարգարուէս 52
 Մարգարաբեր գաղապակուր 223
 — սուր 227
 Մարդ 3
 Մարդկային ցեղեր 18
 Մարերի բղէղ 235
 Մարի 139
 *Մարտաղութեան գործաւոր 16, 28
 Մարահաւ 149

Մաքառուկ 122
 Մաքի 80
 Մաքառան 273
 Մեղուսայի գլուխ 331
 Մեծածեեր 260
 Մեկնակ 342
 Մեղրածուծ զարմանալի 124
 — չբեղ 124
 Մեղրածուծներ 123
 *Մեղրացող 301
 Մեղու ճղրագործ 250
 *Մեղուարդն 251
 Մեղուածիթեա 280
 *Մեղուանոց 251
 *Մեղուանց գունդ, գնդակ 250
 Մեղուներ 250
 *Մեղուաց 251
 *Մեղրախորիսի 252
 Մեռնաթաղ 237
 Մեռնաձի 242
 Մետաքսաբեր Ալանթեան
 282
 — Ռիկինեան 282
 Մետաքսապի 120
 Մետաքսագործ (որդ) 280
 Մերինոս 80
 Մեց 289
 Մժեղ 294
 Մժղուկ 294
 — զիտորաբեր 296
 — մարգի 296
 — սունկի 296
 Մժղուկներ 294
 Միագնդերներ 223
 Միաժանի 99
 Միականի 321
 Միամարկներ 90
 Միափեղկեան 231
 Միջառ կաղամանեաց 249
 — նիզակակի 248
 — շնչոյ 245
 Միջատակներ 44
 Միջատներ 232
 Միւսեան 204
 Միտեայ (երկայնատ.) 263
 — Հասարակ 263
 Մլուկ Հասարակ 297
 Մլուկներ 297
 — վահանաւոր 303
 *Մկանուներ 26
 Մկներ 69
 Մկնհարսնուկ 52
 *Մկուներ 3, 7
 * — աւերորդ 7
 * — ծռիւ 7
 * — ծղիւ 7
 * — շրմանակիւ 7
 * — պրկիւ 7
 * — վանիւ 7
 * — տարածիւ 7
 * — փանիւ 8
 *Մղուկ 270
 Մշկաձի 241
 Մշկամուկ 72
 Մշկայծեամ 87
 Մշկապորտ սյծեամ 87
 Մշկաբաղ 247
 Մոդի 78

Մուս 48
 Մոծակ (գոլումբաշեան) 295
 Մոդէլ կանանչ 175
 — Հասարակ 175
 — ձուակեր 176
 Մոզէշներ 175
 Մոդիւկ 130
 Մոյա 163
 Մոնագ 342
 Մոպս 48
 Մոսթաու 294
 Մոր 309
 Մորեկ պղտիկ 144
 Մորեկան դորշ 112
 — թիւահեր 112
 Մորե 206
 *Մորթ 11, 25
 Մորթակեր Հասարակ 239
 Մորու 206
 Մորպետ 147
 Մուգաւոր 342
 Մուկ ալպեան 67
 — գերմանիկ 70
 — եղեակեան 103
 — մեծ ընտանի 69
 — Նորուեղեան 70
 — նրբաթիթ 46
 — տան 69
 — ցաւորդ 72
 — Փարաւանի 62
 Մուկ 294
 Մուշտակներ 289
 *Մուրճ 12
 Մուկերներ 47
 Մոսճանք բուն 292
 *Մոսն 26
 *Մոսնք 3, 7
 Մորուկ 91
 Մորիւն անտառի 259
 — թափառական 260
 — խոտի 260
 — սպիտակ 264
 Մորիւներ 259
 *Մորիւթիթու 259
 Մորիւաւիւծ 260
 Մորիւարջ 97
 Մորիւարջ 97
 Մորիւահաւ 158
 — Հիւսիսային 158
 Մորիւահաւեր 157
 Մորիւան թաղուներ 145
 Մորսամայր 54
 Մորուածնոս 40
 Մորուանուկ 189

3.

Յագուար 60
 Յամայր 84
 Յամրաղեաց 95
 Յամրուկ 95
 Յամրուկներ 95
 Յարգատուան 155
 Յաւանակ 92
 Յաւերթահարս 261
 Յափշտակողներ 47
 Յեղյեղուկ կենդանի 343

Յոպոպ Հասարակ 124
 Յոպոպներ 124
 Յոպալ 60
 — Ամրիկեան 60
 — սեւ 60
 Յոպաղաւիւծ 60
 Յոթատակ 92
 Յոթիկ 42
 Յոգուածնոսներ 232
 *Յորինուածնութիւն 1

Ն.

Նախ 174
 *Նախախորշ սրտի 14
 *Նախակենդանիք 341
 *Նախանիթ 341
 *Նախատամբոս 163
 Նախատիղճ խորակեաց 344
 Նայայ 172
 Նանդու 161
 Նապաստակ ալպեան 72
 — Հասարակ 72
 Նապաստակներ 71
 Նաւախեցի 215
 Նաւախեղուծ ակօսաւոր 221
 Նարվալ 99
 Նաւակալ 192
 Նեպուկ 319
 Նետագի 319
 Ներկէս թմբեցուցիչ 209
 — փշոտ 209
 Ներց 54
 Նժդդ 91
 ՆՀանդներ 168
 Նշարաձուկ 210
 Նոխալ 81
 Նոխաղակն 320
 Նորաբեղուներ 97
 — մոզէշներ 178
 *Նորաղիւ 16
 Նորաստաւ 210

Շ.

Շարուծ 196
 — թմբեցուցիչ 194
 Շարուծներ 196
 Շաղափուկ 231
 Շամբահաւ 150
 Շամբուրուկ կարմիր 119
 Շամբուրուկներ 119
 Շանանկեր 207
 Շանանկ անարի 207
 Շատուկ (Հիւսիսային) 56
 *Շարուծ 26
 Շերամ 280
 — շնչոյ 282
 Շերեփակութ (թանձրամար-
 մին) 262
 *Շերեփիկ 186
 Շերտուկ կապոյտ 286
 — կարմիր 286
 Շիկահաւ 112
 Շիկամուկ 69
 Շիկեր 84

Հիդանուկ 189
 Հիմպուն 39
 Հղարուկ (կանան) 261
 Հնագույն համադրիտ 40
 Հնագիտներ 47
 Հնակապիկներ 40
 Հնիկ 48
 *Հնահան 29
 *Հնանթ 29
 *Հնառութեան գործար. 28
 *Հնաբող 28
 *Հնաբակ 15, 16, 28
 Հնիկ 68
 Հողաթիթեռ 275
 Հողճի 246
 Հողառ 217
 Հոնոյ թաղանթակեր 247
 Հուն բնաւարտեան 49
 — գանգրիկ 48
 — գորշկոր 48
 — էսկիմոսի 48
 — ընտանի 48
 — կանադական սեւ 48
 — կարճարուն 49
 — հատարակ 49, 143
 — հետախոյզ 49
 — հոլանդական 49
 — պահապան 49
 — քրտեր 49
 Հրթնարջ 64
 *Հրթնակիւ մկուռ 7
 Հրթնակներ 208

Ո.

Ոգնեանուկ 204
 Ողնի 45
 — կաղաւոր 104
 Ողնիներ 45
 *Ուշ 4, 27
 *Ողն 27
 *Ողնածուծ 9, 10
 *Ողնայր 6
 *—ի ոսկրներ 26, 27
 Ողնայրաւորներ 35
 *Ողնաշար 6, 27
 *Ողնոշ 27
 Ուշար 80
 — գմակաւոր 81
 — կորդուաց 81
 — սպորտիական 80
 Ուշարանան 293
 Ուշիւ գլխու 304
 — գլխատի 304
 — մուշակի 304
 — լան 304
 Ուշիներ 304
 Ուշանան 296
 Ուշանաններ 296
 Ուշեան 191
 — ճենական 198
 Ուշեանան 292
 Ուշեփորիկ 284
 Ուշեբղէշ 241
 Ուշի բղէշ 235
 *Ուշրանիւթ 5

Ուշրիւ 133
 *Ուշրներ 3, 5, 26
 Ուտրէ ուտիլ 224
 Ուտանծիւտ (?) 314
 *Ուտամուս 4
 *Ուտամիջ 4, 27
 *Ուտամուս 27
 *Ուտ 25
 Որդ կերպասագործ 280
 — հնդիկ 280
 — մայրիկ 243
 — մանկան 325
 — մատաքագործ 280
 — ցորենի 288
 — փորի 325
 Որդան կարմիր 303
 Որդեր 322
 — բուրակ 325
 — խոզանաւոր 322
 — մամաւան 327
 — տափակ 326
 — օղակաւոր 322
 Որդիդուշ 221
 Որդիկեր (դիւղի) 255
 *Որթ 251
 Որթ 78
 Որթաւորիւ 302
 Որի 117
 Որդակեր 244
 *Որկեր 15
 Որմիգեղի 86
 Որմոզիներ 77
 Որմի 80
 Որոր արծաթագլխ 157
 — երազաթափ 155
 — զուարթ 156
 Որորներ 156
 Ութտանիներ 214
 Ուշ 81
 Ուշականի 229
 Ուշականիկ 342
 Ուշգաթեւեր 264
 Ուշ արուսայիկ 87
 — բակարիական 89
 — երկկուտակեւ 89
 — ճանիկ 89
 Ուշապի 892
 — փայրենի 89
 Ուշաներ 87
 Ուշնիւմուս 269
 Ուշնիւմուկ 208
 *Ուս 27
 *Ուսուկ 4, 27
 Ուսիւ 238
 Ուրուր 138

Չ.

Չղիկ երկայնականի 43
 — լանքիթ 45
 — հասարակ 43
 Չղիկներ 42
 — միջատակեր 43
 — պողակեր 42
 Չորոնոշ (գարամբակներ) 75

Պ.

Պալարածիններ 243
 Պանարաշի 310
 Պաշտօնաւոր 268
 Պաշտոյ ամաղունեան 129
 — գորշ 129
 Պաշակներ 128
 *Պաւակ 27
 Պաւակ (— բարակ) 48
 Պաւակաւոր 196
 Պաւակաւ 136
 Պատառոց կենդանիներ 47
 Պատենածեւեր 234
 Պատիճաւոր կենդանիներ 73
 Պարկամուկ 103
 Պարկաւոր կենդանիներ 101
 *Պարկուր 101
 *Պարս 259
 Պարամայր 250
 *Պետութիւն 2
 Պերկէս 188
 Պերկեաներ 188
 Պերկակ 253
 — հեռահան 255
 — փայտակեր 258
 Պիճակներ 253
 Պին 228
 Պինգուին (փայլուն) 159
 Պինգուիններ 159
 Պիրու 116
 Պիւթի երկերտեան 175
 — շերտաւոր 175
 Պիւթիներ 175
 Պլանդակեր մեծ 127
 — սղոցկոտուց 127
 Պոդիպներ 336
 Պոդիպուր 214
 Պոդիպուրներ (ծովային) 214
 Պոր 153
 Պուս 60
 *Պուկիկներ 11
 Պրիւնէ 210
 *Պրիլի մկուռ 7
 Պրիւմուս 274
 Պրոսուս 185

Ջ.

Ջայլամ Եփրիկեր 160
 — Հնդիկ 161
 Ջայլամներ երեքմասն. 161
 — երկմասնեան 160
 — կացաւոր 162
 *Ջղազաւ 9
 *Ջղեր 9
 Ջրեակ 234
 Ջրի 93
 Ջրագործ թխագլխ 181
 — կանան 180
 Ջրագուս 155
 Ջրագործիկներ 240
 Ջրաթաւալուկ Վենետաւ-
 կան 344
 Ջրալու 321
 Ջրածիններ 341
 Ջրակարիւ 299

Զբաղակցարներ 149
 Զբաղակցար 149
 Զբաղակց 54
 Զբաղակցի 341
 Զբաղակց արագընթաց 299
 Զբաղակցներ 299
 Զբաղակց 70
 Զբաղակցի 240
 Զբաղակց 310
 Զբաղակց (ծրով) 240
 — սեւաթուղթ 240
 Զբաղակցներ 240
 Զբաղակց 157
 Զբաղակց 54

Ռ.

Ռմբակցի բաղն 241
 Ռմբակցիներ 127
 Ռմբակցիներ (Հնդկ) 94
 Ռմբակցիներ 94

Ս.

Սագ ժողովրդի 153
 Սագարո պարի 336
 — մակարայի 336
 — վարդապարտի 336
 *Սալ 12
 Սալամանգր խաղաղագետ 184
 — սանգրուար 184
 Սալամանգրներ 184
 Սալամ 145
 Սակա 136
 Սաղանգան 122
 Սաղանգարուար թուղթ 127
 Սաղան 199
 — կարմրախաղաղ 199
 Սամյո (Սամբիկայի) 54
 — առնակայի 54
 — Սերբիկայի 54
 Սանգրակայ 167
 Սանգրակայի 236
 Սանգրակայ 52
 Սարգ ընտանի 307
 — հաւորակ 308
 — թանակի 308
 Սարգակցիներ 305
 Սարգեր 306
 Սարեակ 106
 Սարեակի 106
 Սեպարակցիներ 237
 *Սեպակ 15
 *Սեա 2
 Սերինոս 106
 — կանարեան 107
 Սերինոսներ 105
 Սերմանաքաղ ագուա 117
 Սերմանաքիներ 344
 Սեւազգեաք 275
 Սեւամարմիններ 242
 *Սեւակ 52
 Սիւր 196
 Սիւր 212
 Սիւրմարգ 141
 *Սիւր 14, 16

Սիւրմանցի սուսի 230
 Սիւրմա հասարակ 67
 — միւրմանցի 67
 *Սիւրմանի 67
 Սիւրմանի 66
 Սիւրմա (Սամբիկայի) 56
 Սիւրմակ 178
 Սիւրմակա շուղ 258
 Սիւրմակա 210
 Սիւրմակա անգուգա-
 մաա 90
 — զուգամաա 74
 Սիւրմակ 337
 *Սիւրմակ 26
 *Սիւրմակ Հիւթ 28
 Սիւրմակ 112
 Սիւրմակ 230
 Սիւրմակ 185
 Սիւրմակ բուսմանի 286
 Սիւրմակ կանանի 114
 *Սիւր 16
 Սիւրմակ խեցի 320
 Սիւրմակ (փորձ 340)
 Սիւրմակ հասարակ 212
 — մեծ 212
 *Սիւրմակ 213
 Սիւրմակախաղաղ 280
 Սիւրմակախաղաղ 198
 Սիւրմակաքի 340
 Սիւրմակ 340
 Սիւրմակ 206
 Սիւրմակ կանանիներ 104
 *Սիւրմակ 16
 *Սիւրմակ 16
 *Սիւրմակ 15
 Սիւրմակ կարմրաքերան 219
 Սիւրմակ 319
 Սիւրմակ 319
 *Սիւրմակ 27
 Սիւրմակ 46
 — միւրմակ 47
 — միւրմակ 47
 — զուղի 47
 Սիւրմակ 46
 *Սիւրմակ 14
 *Սիւրմակ 14
 Սիւրմակ (կաղա շառան) 279
 — Նիւրմակ 278
 — շուղ 277
 Սիւրմակ 276

Վ.

Վագերմի 93
 Վագեր (բնագրան) 59
 Վագեր թուղթներ 160
 Վագերներ 269
 Վագեր 272
 *Վագերակ 25
 Վագերակ 196
 *Վագերակի 15
 Վագեր 44
 *Վագերակ 7
 Վագերակ 139
 Վագերակ 86
 Վագերակի 301
 Վագերակ 290

Վագերակ 257
 Վագեր 76
 *Վագերակ 16
 Վագերակներ 76
 Վագեր 176
 Վագերակներ 90
 Վագերակներ 290
 Վագեր 83
 Վագեր 89
 Վագերակ 230
 Վագերակ ագուար 174
 — թուղթ 176
 — զուղի 174
 Վագերակ 325
 Վագերակ 166
 Վագերակ կերակրակալ 100
 *Վագերակ 23

Տ.

*Տագերակ կերակր 27
 Տագերակ 333
 Տագերակ ծովային 200
 Տագերակ 200
 Տագերակ 146
 Տագերակներ 314
 Տագերակ 138
 *Տագերակ միւրմակ 7
 Տագերակ 146
 Տագերակ 106
 Տագերակ 115
 Տագերակներ 115
 Տագերակներ 195
 Տագերակ հասարակ 196
 — հաղաղ 196
 *Տագերակ 87
 Տագերակակ 40
 *Տագերակ 2
 Տագերակ (թիւթակ) 272
 Տագերակակ զուղի 269
 Տագերակակներ 248
 Տագերակակներ 301
 Տագերակակ 44
 Տագերակ 263
 Տագերակ 323
 — բուղիակ 323
 Տագերակ 323
 *Տագերակ 4, 27
 Տագերակ 310
 Տագերակ 198
 *Տագերակ 2
 Տագերակ 168
 Տագերակ 332
 Տագերակակ 218
 Տագերակակ 205
 *Տագերակ 1
 *Տագերակ 306
 Տագերակ 114
 Տագերակ 127
 Տագերակ 318
 Տագերակ 64
 Տագերակ (խղուղ) 221
 Տագերակ (սալամանգր) 184
 Տագերակ 124

8.

Յախարըր 144
 Յախարեկ 113
 Յանկաթիթեա 271
 *Յանց 77
 Յանցաթեւեր 260
 *Յանցամաշկ 13
 *Յանցիկ 77
 Յասկաշներ 265
 *Յեզ 2
 Յեզեր (մարդկային) 18-22
 Յեց ալիւրի 289
 — կարասեաց 289
 — հանգերձից 289
 — ցորենի 288
 Յեցեր 146, 288
 Յին 137
 Յեւ 93
 Յլաշու 48
 Յլափայրի 80
 Յնորք 269
 Յողկ 312
 Յուլ 78
 Յուկեզ 103
 Յուկեշներ 103

Պ.

Պազուր 316
 *Պակիւն մուշք 8
 Պաղանդ 310
 Պաղանդներ 310
 Պաղիժ 309
 *Պայծաղն 16
 Պայտակեր պիծակ 258
 Պայտակերներ 238
 Պայտի ճճի 238
 Պայամրեկ մեծ 143
 Պայամրիլ 297
 Պայափոր կանաչ 128
 — սեւ 128
 Պայափոր կանկենւոյ (թի-
 թեա) 279
 — ուսենւոյ 280
 Պայափորներ 127
 — պիտակ 128
 Պառակրծիկ 247
 Պասիան հասարակ 136

Պասիան ոսկի 140
 — սպիտակ 140
 Պարեզ 199
 Պարփար սեւ 151
 Պափկամարմիններ 238
 *Պեթակ 251
 *Պետուր 25
 Պետարուրներ 290
 Պիշ Ափրիկէի 74
 — հեգիկ 73
 Պիճեկեր 245
 Պինէս 327
 Պիւնիկ հաւ 140
 Պշեր 73
 Պնջլանաններ 320
 Պշաթեւեր 188
 Պշամորթներ 328
 Պշառաղիկ 193
 Պշափոր 204
 Պոկ բաշեւոր 64
 — հասարակ 64
 Պոկեր 64
 *Պող 25
 Պողոշ 204
 Պողղղղուկ 324
 *Պոռ 16
 Պոսուռ 238
 Պոր կարմրաղոյն 194
 Պորոսաններ 216
 Պուշ 25
 Պրփրուկ 195
 Պրփրուկներ 195

Ք.

Քալաշներ 268
 Քած 48
 Քաշ 81
 Քաղաճի սոսեաց 248
 Քաղիկ ալպեան 248
 — հասարակ 248
 — հիւսող
 Քաղիկներ 247
 Քանգակագործ 246
 Քաթահաւ մահանկան 146
 Քաղահաւեր 146
 Քառաթուիկներ 215
 Քարագիւղաց զեռի 210

Քարագիւղաց ծովու 210
 Քարաշէղ 210
 Քարաիղունջ նրբափուշ 222
 Քարամոր 187
 — Ափրիկէի 188
 Քարոյծ 83
 Քարր 173
 Քարկեր 230
 Քաւթարինէ 58
 Քերծէ 48
 *Քթուկ 5
 *Քիթ 23
 *Քիժք 15
 *Քող 131
 Քնարատուան 127
 Քոսեբաշի 311
 *Քուլքոսկ 4
 Քուռակ 91
 Քսիփիէ 193
 *Քրտանց բշակներ 11
 Քօշ 81

Օ.

Օձ ակնոցաւոր 175
 — բոժոժաւոր 171
 — Եսկուլապեան 174
 — լողակ 173
 — հեգիկ մոլի 172
 — սղորկամորթ 174
 Օձաձկեր 203
 Օձաձուկ հասարակ 203
 Օձասանդր հասարակ 312
 — մեծ 312
 Օձասանդրներ 312
 Օձեր 169
 — անթոյն 173
 — թուռաւոր 170
 *Օղակաճիկ 15
 *Օղեր ձլթի 4
 *— փղի 4
 Օրանդ-Ուտան 35
 Օրօճ 219

Ֆ.

Ֆիլըքերա ապականիշ 302

ՅԱՆԿ ԼԱՏԻՆԵՐԷՆ ԱՆՈՒԱՆՑ

Առաջադիշերը (*) գիտական բառեր են:

A.

Acanthia lectularia 297
Acanthopteri 188
Acarina 310
Acarus Siro 310
Acherontia Atropos 276
Acipenser huso 205
— ruthenus 206
— Sturio 206
Acridium migratorium 266
— stridulum 267
Actinia effoeta 336
— mesembrianthemum 336
Actinobola dianthus 336
Aculeata 70
Agrotis segetum 285
Agrotistira brassicae 286
*Aire (†) 130
Alauda arvensis 110
— cristata 110
Alaudidae 110
Alca torda 159
Alcedidae 125
Alcedo ispida 125
Aleidae 157
Alcyonella stagnorum 327
Alcyonidae 125
Alnus glutinosa 299
Alucita hexadactyla 290
Amia calva 205
Ammophila sabulosa 254
Amoeba porrecta 343
Amphibia 180
Amphioxus lanceolatus 210
Anacanthini 194
Anas boschas 152
Anatidae 151
Anguilla vulgaris 203
Anquis fragilis 178
Animalia 1
Annulata 322
Anobium paniceum 239
— pertinax 238
Anodonta cygnea 228
Anomura 316
Anser cinereus 153
Anthea cereus 336

Anthozoa 336
Anthrenus museorum 239
Antilope Dorcas 83
— rupicapra 83
Apatura iris 276
Aphaniptera 296
Aphidida 301
Aphis rosae 301
Aphrophora spumaria 300
Apida 250
Apis mellifica 250
Apoda 185
— 202
— 320
Apterygidae 162
Apteryx australis 162
Apus caneriformis 320
Aquila fulva 135
— imperialis 136
Arachnoidea 305
Araneida 306
Arctia caja 284
Ardea cinerea 147
— egretta 148
Ardeidae 145
Arctomys marmotta 67
Argonauta Argo 214
Argynnis Aglaja 275
— Latonia 275
— Paphia 275
Argyroneta aquatica 310
Aromia moschata 247
Arthropoda 232
Arthrostraca 319
Artiodactyla 74
— non ruminantia 77
— ruminantia 77
*Artus 24
Arvicola arvalis 70
Ascaris lumbricoides 325
Asilidae 294
Astacus fluvialis 314
Asterias aurantiaca 330
— rubens 330
Asteroidea 330
Astraea punctifera 339
Astur nesus 136
— palumbarius 136

Atta cephalotes 260
Attacus Atlas 285
Auchenia huanaco 89
— lama 89
— paco 89
— vikuna 89
Aurelia aurita 332
Aves 105

B.

Bacillus 342
Bacillus Rossii 268
Bacteriae 342
Balaena Mysticetus 98
Balaenida 98
Balanidae 321
Balaninus nucum 245
*Baroque (†) 224
Basiliscus mitratus 177
Bathybius Haeckeli 344
Batrachia 180
Blaps mortisaga 242
Blatta americana 270
— germanica 270
Boa constrictor 174
— scytale 174
Bombinator igneus 182
Bombinatorida 182
Bombus terrestris 253
Bombycida 280
Bombycilla garrula 120
Bombylida 294
Bombyx Arryndia 282
— Cynthia 282
— mori 280
Bonasus 80
Bos americanus 80
— bison 80
— bubalus 79
— taurus 78
— urus 80
Bostrychidae 246
Bostrychus typographus 246
*Botanique (†) 1
Botricephalus latus 327

Cypraea Tigris 219
 Cyprinoidei 197
 Cyprinus alburnus 198
 — auratus 198
 — barbatus 198
 — Carpio 197
 — tinca 198
 Cypris ornata 321
 Cypselidae 122
 Cypselus apus 122
 Cyclostomi 210
 Cysticercus cellulosae 327
 Cystophora elephantina 65

D.

Dactylopterus europaeus 190
 — orientalis 190
 Daphnia pulex 321
 Dasypoda 96
 Dasypus novemcinctus 96
 — tricinatus 96
 Decapoda 314
 Delphinida 99
 Delphinus delphis 99
 Dentex vulgaris 191
 Dermestes lardarius 239
 Dibranchiata 212
 Didelphys dorsigera 103
 *Digiti pedis 4
 Digitigrada 47
 Dimya 227
 Dinastes Hercules 236
 Dinornis 163
 Diodon tigrinus 204
 Diomedea exulans 157
 Dipnoi 187
 Diptera 290
 Dipus aegyptius 72
 Diurna 270
 Doryphora decemlineata 248
 Draco volans 176
 Dromaeus Novae Hollandiae 161
 Dycticida 240
 Dytiscus marginalis 240

E.

Echeneis remora 192
 Echidna hystrix 103
 Echinodermata 328
 Echinoidea 328
 Echinus esculentus 328
 Edentata 95
 Elater segetum 237
 Elaterida 237
 Elephas africanus 74
 — indicus 73
 Elephantina 73
 Emberiza citrinella 109
 Emyda 166
 Enchelis farcimen 342

Engraulis encrasicolus 202
 Entimus imperialis 246
 Entomophaga 43
 Eozoon canadense 344
 Ephemera vulgata 263
 Epeira Diadema 308
 Equida 90
 Equus asinus 92
 — caballus 91
 — mulus 93
 — Quagga 93
 — Zebra 93
 Erinaceida 45
 Erinaceus europaeus 45
 Esoeces 200
 Euglena viridis 343
 Exocoetus volans 196

F.

Falco candidans 135
 — gyrofalco 135
 — milvus 137
 — peregrinus 134
 Falconidae 134
 *Familia 2
 Felida 56
 Felis catus 57
 — concolor 60
 — domestica 56
 — leo 59
 — leopardus 60
 — lynx 58
 — melas 60
 — onza 60
 — pardus 60
 — tigris 59
 *Femur 4
 Fiber Zibethicus 72
 *Fibula 4
 Filaria medinensis 325
 Fissilinguia 175
 Flustra foliacea 327
 Foraminifera 343
 Forficula auricularia 269
 Formica ligniperda 260
 Formicida 259
 Fringilla canaria 107
 — carduelis 105
 — coelebs 106
 — domestica 106
 — spinus 106
 Fringillidae 105
 Fulgora laternaria 300
 Fulica atra 151
 Fungia agariciformis 337

G.

Gadoidei 195
 Gadus morrhua 195
 Gallinae 138
 Gallinula chloropus 150
 Gallus bankiva 139
 — domesticus 139
 Gannoidei 205
 Garrulus glandarius 118

Gasteropoda 216
 Gasterosteus aculeatus 193
 Gastropacha neustria 282
 — pini 282
 — processionea 282
 Gecarcinus rusticola 318
 *Genus 2
 Geocorida 297
 Geometridae 286
 Geotrupes stercorarius 235
 Gibbon 37
 Glires 66
 Grallatores 145
 Gressoria 288
 Gryllus campestris 265
 — domesticus 265
 — Gryllotalpa 266
 Gulo borealis 56
 Gymnotini 202
 Gymnotus electricus 202
 Gypaetos barbatus 133
 Gyrida 240
 Gyrynus mergus 240

H.

Halicore cetacea 101
 Halotis tuberculata 221
 Halmaturus giganteus 101
 Haltica oleracea 249
 Helix pomatia 216
 Hemiptera 297
 Herpestes ichneumon 62
 Hibernia defoliaria 287
 Himantopus rufipes 149
 Hippobosca equina 296
 Hippocampus brevirostris 204
 Hippopotama 76
 Hippopotamus amphibius 76
 Hirudinoidea 323
 Hirundinidae 120
 Hirundo rustica 120
 — urbana 121
 *Histologie (†?) 1
 Holothuria edulis 328
 Holothurioidea 328
 Homarus vulgaris 315
 Horloge de la mort (†?) 239
 *Humerus 4
 Hyaena crocuta 62
 — striata 61
 Hyaena 61
 Hydra fusca 335
 — grisea 334
 Hydrocorida 299
 Hydrometra lacustri 299
 Hydrophilida 240
 Hydrophilus piceus 240
 Hydrozoa 341
 Hyla arborea 181
 Hylesinus piniperda 247
 Hylobates Lar 37
 Hylobius pini 245
 Hylonicchia mytilus 342
 Hymenoptera 250

Hypoderma bovis 292
 Hypoglossus maximus 196
 Hypudaesus amphibius 70
 — lemnius 70
 Hystrix cristata 70

I.

Ibis religiosa 146
 Ichneumon persuatorius 255
 Ichneumonida 255
 Iguana tuberculata 177
 Impennes 159
 Infusoria 341
 Innocua 173
 Insecta 232
 Insectivora 44
 *Iris 24
 Ixodes Ricinus 310
 Julus terrestris 313

L.

Lacerta agilis 175
 — viridis 175
 Lagopus alpinus 145
 Lamia aedilis 248
 — textor 248
 Lammellibranchiata 223
 Lammellicornia 234
 Lampyrus noctiluca 238
 Lanidae 119
 Lanius collurio 119
 Laprax lupus 189
 Laridae 156
 Larus argenteus 157
 — ridibundus 156
 Lemur Catta 42
 Lepas anatifera 320
 Lepidoptera 270
 Lepidosiren paradoxus 187
 Leporina 71
 Leptocardii 210
 Lepus cuniculus 72
 — timidus 72
 — variabilis 72
 Libellula depressa 262
 Limax agrestis 217
 — empiricorum 218
 Limnaeus stagnalis 218
 Limnophilus flavicornis 261
 Limulus mollucanus 319
 Liparis chrysorrhoea 284
 — dispar 284
 — monacha 283
 Lithodomus lithophagus 230
 Litorales 148
 Locusta viridissima 267
 Longicornia 247, 261
 Longipennes 157
 Lophirus Pinni 258
 Lophius piscatorius 194
 Loxia curvirostra 108
 Lucanus cervus 236
 Lucioperea sandra 189
 Lumbricus terrester 322

Lusciola luscinia 112
 — Philomela 112
 Lutra lutreola 54
 — vulgaris 54
 Lycaena Alexis 255
 — Virgaureae 275
 Lycosa Tarantula 309
 Lyctus 247

M.

Macacus Inuus ecaudatus 39
 Machetes pugnax 149
 Macroglossa stellarum 278
 Macrura 314
 Madrepora prolifera 339
 Maenura superba 127
 Maja squinado 318
 Malacodermata 238
 Malapterurus electricus 197
 Malleus vulgaris 227
 Mamaeus cynomologus 35
 Mammalia 35
 Manis brachyura 97
 — Temminckii 97
 Mantis religiosa 268
 Margaritana margaritifera 227
 Marsupialia 101
 *Maxilla inferior 4
 *— superior 4
 Medusae 332
 Megaloptera 260
 Melanosomata 242
 Meleagrina margaritifera 223
 Meleagris Gallopavo 141
 Meles Taxus 55
 Mellisuga magnifica 124
 — mirabilis 124
 Meloë proscarabaeus 243
 Melolontha vulgaris 234
 *Ménagerie (т.з.) 32
 Mephitis Chinga 56
 *Metacarpus 4
 *Métamorphose (т.з.) 186, 233
 *Metatarsus 4
 Microgaster glomeratus 255
 Midas rosalia 41
 *Mineralia 1
 *Minéralogie (т.з.) 1
 Mollusca 212
 Monas Termo 342
 Monodon monoceros 99
 Monomya 223
 Monotremata 103
 *Morphologie (т.з.) 1
 Moschus moschiferus 87
 Mulus barbatus 190
 Muraena helena 204
 Murenoidei 203
 Murex brandaris 222
 — tenuispina 222
 Murina 69
 Mus armenius 53
 — decumanus 69
 — musculus 69

Mus rattus 69
 Musca Caesar 292
 — domestica 290
 — vomitoria 291
 Muscidae 120
 Muscida 290
 Muscidae 292
 Mustela ermineus 53
 — foinea 54
 — martes 54
 — putorius 53
 — vulgaris 52
 — zibelina 54
 Mustelina 52
 Mya arenaria 230
 Mycetes seniculus 41
 Mygale avicularia 308
 Myriapoda 312
 Myogale moschata 47
 Myrmecoleon formicarius 260
 Myrmecophaga jubata 97
 Myrmica caespitum 260
 — rubra 260
 Mytilus edulis 229

N.

Naja Haje 173
 — tripudians 172
 Natatores 151
 Nautilus Pompilius 215
 Necrophorus Vespillo 237
 Nematelmia 325
 Nematodes 325
 Nemocera 294
 Nepa cinerea 299
 Nephrops norvegicus 315
 Neuroptera 260
 Notonecta glauca 299

O.

Ocetopus 214
 Oestrus hoemorrhoidalis 292
 — ovis 293
 Oniscus asellus 319
 Ophidia 169
 Opilionida 310
 *Ordo 2
 Oriolus galbula 116
 Orthoptera 264
 Ornithorhynchus paradoxus 103
 Oryctes nasicornis 236
 *Os 3, 5
 *— frontale 4
 *— furculaire (т.з.) 103
 *— occipitis 4
 *— parietale 4
 *— temporale 4
 Oscines 105
 Ostrea edulis 224
 Otaria jubata 65
 — ursina 65

Otidæ 162
Otis tarda 162
Ovis aries 80
Oxyuris vermicularis 325

P.

Pachydermata 74
Pagurus Bernhardus 316
Palicida 296
Palingenia longicauda 263
Palinurus vulgaris 316
Palpicornia 240
Paludina vivipara 219
Papilio Machaon 273
— *Podalirius* 273
— *Priamus* 274
Paradisea apoda 116
Paradiseida 115
Paramecium aurelia 342
Paridae 110
Parnassius Apollo 272
Parus caudatus 111
— *coeruleus* 105
— *major* 110
— *pendulinus* 111
**Patella* 4
Pavo cristatus 141
Pecten Jacobaeus 226
Pectinicornia 236
Pediculida 304
Pediculus capitis 304
— *vestimenti* 304
Pelagia noctiluca 333
Pelecopus onocrotalus 155
Pelias berus 170
Pennatula rubra 337
Pentatoma grisea 299
Perca fluviatilis 183
Percoidei 188
Perdidae 142
Perdix cinerea 142
Periplaneta orientalis 269
Perissodactyla 90
Petromyzon fluviatilis 210
— *marinus* 210
**Petalanges* 4
Phalangium Opilio 310
Phaëton aethereus 155
Phasianus colchicus 139
— *nythemerus* 140
— *pictus* 140
Phoca vitulina 64
Phocina 64
Phoenicopterus roseus 154
Pholas dactylus 230
Phthirus pubis 304
Phyllium sicifolium 269
Phyllostoma Spectrum 47
Phylloxera vastatrix 302
Phytosphaera 258
**Physiologie* (†) 1
Pica caudata 118
Picidae 127
Picus Martius 128
— *viridis* 128

Pieris Brassicae 227
— *cardamines* 272
— *crataegi* 271
— *napi* 272
— *rapae* 272
Pieuvre (†) 214
Pinna nobilis 228
— *squamosa* 228
Pinnipedia 64
Pipa americana 183
Pisces 187
Pithecius Satyrus 35
Planorbis corneus 218
Pleuronectae 195
**Plantae* 1
Plantigrada 47
Platalea leucorodia 146
Platessa vulgaris 196
Platyelminthes 326
Platyrrhinida 40
Ploceus Mahali 108
— *soceus* 108
Polypi 336
Polystes galica 254
Pristis antiquorum 210
Proboscidea 73
Procellaria glacialis 158
Procellaridae 158
Procyon lator 64
**Propolis* 252
Prosimii 41
Prosimiida 41
Prosobranchia 218
Proteus anguineus 185
Protopterus americanus 188
**Protoplasma* 341
Protozoa 341
Psittacidae 128
Psittacus amazonicus 129
— *Erithacus* 129
Pteriporida 290
Pteromalus puparum 256
Pterophorus pentadactylus 290
— *rhododactylus* 290
Pteropus edulis 42
Pulex irritans 296
Pulmonata 216
Purpura patula 220
— *persica* 221
Pyrallis siliacealis 288
Pyrophorus noctilucus 238
Pyrrhocoris apterus 299
Pyrrhula europaea 109
Python bivittatus 175
— *tigris* 175

R.

**Radius* 4
Raja clavata 209
Rajae 208
Rallidae 149
Ramphastus Ariel 127
— *Toco* 127
Rana esculenta 180
— *mugiens* 181

— *temporaria* 181
Ranida 180
Rapaces 130
**Regnum* 2
Reptilia 165
**Rétine* (†) 13
Rhabdospaer 344
**Rhachitis* 6
Rhea americana 161
Rheidae 161
Rhinoceridae 94
Rhinoceros indicus 94
Rhinolophus ferrum equinum 44
Rhitina Stelleri 101
Rhizopoda 343
Rhizostoma Cuvieri 333
Rhizotrogus solstitialis 235
Rhodites rosae 257
Rhoplocera 270
Rhynchites betuleti 244
— *cupreus* 245
Rombus maximus 196
Rosalia alpina 248
Rotalia veneta 344

S.

Sagartia parasitica 336
— *rosea* 336
— *viduata* 336
Salamandra maculata 184
Salmo fario 199
— *hucho* 199
— *Salar* 199
— *thymallus* 200
Salmones 198
Saltatoria 265
Salvo salvellinus 200
Sanguisuga officinalis 323
— *medicinalis* 323
Saperda carcharias 248
**Sarcode* (†) 343
Sarcophaga carnaria 292
Sarcoptes scabiei 311
Sarcorampus Gryphus 132
Saturnia carpini 285
— *pyri* 285
Sauria 175
Scampo (†) 315
**Scapula* 4
Scansores 126
Seiurina 66
Seiurus leucotis 67
— *vulgaris* 67
Scolopacidae 149
Scolopax gallinago 149
— *rusticola* 149
Scolopendra forficata 312
— *morsitans* 313
Scomber scombrus 191
Scombroidei 191
Scorpio europaeus 305
Scorpionida 305
**Sensus* 11
Sepia officinalis 212
Serpula norvegica 324

Sesia apiformis 280
Silphida 237
Siluroidei 196
Silurus glanis 196
Simiae 35
Simulia maculata 295
Sirenida 101
Sirex gigas 258
Sittace macae 129
Solea vulgaris 195
Solen vagina 230
Somateria mollissima 152
Sorex fodiens 47
 — *pygmaeus* 46
 — *saaveolens* 47
Soriceida 46
 *Species 2
Sphargis coriacea 168
Sphingida 276
Sphinx euphorbiae 278
 — *ligustri* 278
 — *pinastri* 277
Sphongia officinalis 340
Spongiae 340
Sporozoa 344
Squalidi 207
Staphylinida 239
Staphylinus erithropterus 239
Steganopodes 134
Stenops tardigradus 42
Sterna hirundo 157
 *Sternum 4
Straetia ornata 298
Strigidae 130
Strix bubo 131
 — *flammea* 131
Strombus gigas 219
Strutheonida 160
Struthio Camelus 160
Sturnidae 115
Sturnus vulgaris 115
Suida 75
Sus aper 76
 — *serofa domestica* 75
Sylvia atricapilla 112
 — *hortensis* 112
Syntomis phegea 280
 *Systematik (q. r. d.) 1

T.

Tabanus bovinus 293
Tachinae 294
Tachypetes aquilus 155
Taenia Solium 326
Talpa europaea 45
Talpida 45
 *Talus 4
Tapiridae 93
Tapirus americanus 93
 *Tarsus 4

Tealia crassicornis 336
Tegenaria domestica 307
Teleostei 188
Telephorus fuscus 238
Tenebrio molitor 242
Teredo navalis 231
Termes bellicosus 263
Testudines 165
Testudo Graeca 167
Tetrabanchiata 215
Tetrao attagen 145
 — *bonasia* 145
 — *tetrix* 144
 — *urogallus* 144
Tetraodon hispidus 204
Tetraonidae 144
Thalassidroma pelagica 158
Thelephusa fluviatilis 318
Thynnus vulgaris 192
 *Tibia 4
Tinea biseliella 289
 — *granella* 288
 — *lacteella* 283
 — *pelionella* 283
 — *spretella* 289
Tineida 288
Torpedo marmorata 209
Tortricida 287
Tortrix buoliana 288
 — *viridana* 288
Trachea piniperda 286
Trachelius anas 342
Trachinus draco 193
Transmarinus 81
Trichechina 65
Tricheeus rosmarus 65
Trichina spiralis 325
Trichodectes canis 304
Tridaena gigas 228
Trigla hirundo 190
Tripidae 294
Triton cristatus 184
Tritonida 184
Tritonius nodiferum 221
Trochilidae 123
Trochilus colubris 124
 — *mosquitus* 123
Trochus perspectivus 222
Troglodites Gorilla 37
 — *niger* 39
 — *parvus* 113
Tropidonotus natrix 173
 *Truncus 24
Trutta lacustris 99
Tubicolae 230
Tubipora musica 338
Turdidae 114
Turdus musicus 114
 — *pilaris* 114
 — *polyglottus* 114
 — *saxatilis* 114
 — *viscivorus* 114
Turzitella terebra 222
 *Typus 2

U.

*Ulna 4
Unio pictorum 228
Upupa epops 124
Upupidae 124
Ursina 62
Ursus americanus 64
 — *arectus* 63
 — *ferox* 64
 — *labiatus* 64
 — *maritimus* 63
 *Uvae marinae 213

V.

Vanellus cristatus 148
Vanessa Antiopa 275
 — *Atalanta* 275
 — *Jo* 274
 — *polychloros* 275
 — *urticae* 275
Varanus niloticus 176
 *Vautour-aigle (q. r.) 134
 *Vegetabilia 1
Vermes 322
Vermetus lumbricalis 221
Vermilinguia (d. r. q.) 178
Vermilinguia (wwwithum) 97
 *Vertebrae collis 4
 — *lumborum* 4
Vertebrata 35
Vesicantia 243
Vespa crabro 254
 — *vulgaris* 253
Vespertilio auritus 63
Vespida 253
Vibrionidae 343
Vipera ammodytes 171
Viverrina 62
Vorticella nebulifera 342
Vultur cinereus 133
Vulturini 132

X.

Xiphura 319
Xiphias gladius 193
Xylophaga 238
Xylotropha 279

Z.

Zerene grossulariata 287
Zeus faber 193
 *Zoologie (q. r.) 1
Zygaena filipendulae 208
 — *malleus* 208

